



(M. med.)

826





~~505~~

989

PHARMACOPŒA

OLDENBURGICA

1801

1801

OLDENBURGI

ATQ. MEDICINAM I. A. SCHULZE

1801

~~505~~

984

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OLDBURGICA

—

—

—

—

OLDENBURGI

AND MICHAELAM I. A. SCHULZE

1801

Mat. med. 820.

~~985~~

(— 828.

~~Medi~~


~~Pharmac.~~

~~Ph~~

~~124~~

PHARMACOPŌEA

OLDENBURGICA.



R

Cum Gratia et Privilegio.

IPSUS IUSSU

ELABORATAM EDITAMQUE



OLDENBURGI

APUD BIBLIOPOLAM J. P. SCHULZE.

I S O I.

PHARMACOPŌEA

OLDENBURGICA



OLDENBURGI

ALUD BIBLIOPOLAM J. P. SCHULZE


1801

REVERENDISSIMO ET SERENISSIMO

EPISCOPO LUBECENSI DUCI HOLSATO-
OLDENBURGENSI

PETRO FRIDERICO
LUDOVICO

PATRI PATRIAE



HANC

IPSIUS IUSSU

ELABORATAM EDITAMQUE

PHARMACOPOEAM OLDENBURGICAM

PIA MENTE

D. D.


AUCTOR.

REVERENDISSIMO ET SERENISSIMO

EPISCOPO LUBECENSI DUCI HOLSTATO-
OLDENBURGENSI

PETRO FRIDERICO
LUDOVICO

PATRI PATRIAE



HANC

IPSUS IUSU


ELABORATAM EDITAMQUE

PHARMACOPŌEAM OLDENBURGICAM

PIA MENTE

D. D.

A U C T O R



PRAEFATIO.

Prima Pharmacorum Officina Oldenburgica, Anno 1598. sumtibus IOHANNIS XVI. COMITIS OLDENBURGICI, de salute civium optime meriti, in communem civitatis usum hac in urbe fundata, primis annis a pharmacopola jurato, qui annum accipiebat salarium, nomine COMITIS administrabatur.

Duae aliae urbis Officinae medicae, quarum altera aulica, Annis 1608 et 1640, ac plures deinde, alia post alias, in reliquis urbibus, locisque hujus terrae idoneis, constitutae sunt, ita, ut numerus

Pharmacopoliorum Ducatus Oldenburgici jam fit duodecim.

Dispensatorio primo, forsan Valerii Cordi, aut Pharmacopoeae Augustanae, successerunt saeculis superioribus Dispensatorium Brandenburgicum, et Pharmacopoea Wirtembergica, ab Anno 1772 autem Pharmacopoea Danica.

Taxam, ut vulgo dicunt, medicamentorum simplicium et compositorum pretium determinantem, Corpus Constitutionum Oldenburgicarum, dein Pharmacopoea Danica, exhibuerunt, subjunctis pharmacorum pretiis a S. R. I. libera civitate Brema, secundum syllabos pretiorum nundinales authenticos, constitutis.

Tandem, quum ex mandato DUCIS nostri, sapientissime et clementissime regnantis, CAMERAE DUCALIS COLLEGIUM negotium mihi demandasset, ut *Pharmacopoeam Oldenburgicam* elaborarem, typisque divulgarem: hanc, cum genio saeculi, tum hujus potissimum provinciae accommodatam, concinnare pro virili annisus sum.

Viam

Viam et rationem, quam in elaborando secutus sum, quae sequuntur, docebunt.

Primum igitur in *Delectu Simplicium*, quae *Parte prima*, in qua de *Materia pharmaceutica* agitur, continentur, hoc temperamento usus sum, ut eligerem pharmaca plurimorum auctorum consensu praestantiora, usuque et experientia maxime probata, ne officinae nostrae, illis instructae, vel ubertate nimia aggravari, vel inopia laborare viderentur. Pharmacorum tamen et in nostro ducatu indigentium rationem habui; quae causa est, cur Cortici Salicis laureae, praestantiori forsan, quae quidem rarius apud nos gignitur, frequentiore Corticem Salicis fragilis, nec non Absinthio vulgari Absinthium maritimum, in littoribus nostris frequentissimum, addere non dubitaverim.

Descriptiones breves, at distinctas, ut spero, *Notasque Bonitatis*, si descriptio non satisfecerit, corporibus naturalibus vel a me ipso exploratis, vel ex auctoribus probatae fidei, subjunxi.

In altera Parte, Praeparata et Composita complectente, *Pharmacopoeam Borussicam* (*Berol.* 1799. 4.) magnam partem secutus sum, adoptando plurimas ejus formulas, et ob exactam earum concinnitatem, et ob provinciarum vicinitatem, nobis perquam acceptas; e quibus tamen nonnullas mutandas duxi, e. c. Elixir pectorale, Oleum animale aethereum, Pilulas purgantes, Tartarum emeticum, Unguentum digestivum, cet. Quasdam substitui, e. g. Cuprum Ammoniacum Acoluthi methodo paratum, Elixir viscerale, loco Aurantiorum compositi, Tincturam Opii, s. Laudanum liquidum Eccardi, loco Sydenhami, Julapium e Camphora Pharmac. Wirtenb. novae, loco Mixturae camphoratae, Unguentum, s. Balsamum ophthalmicum Husfelandi, loco Unguenti Hydrargyri rubri, Olea per infusionem parata, loco Oleorum coctorum, cet. Alias addidi, v. c. ex *Praeparatis*: Argentum nitricum, Calcem Antimonii, Lapidem calaminarem praeparatum, Mercurium vivum depuratum, Oleum Vitrioli rectificatum, Stannum granulatum, Vitrum Antimonii, cet. Praeter ea *Compositorum* formulas nonnullas ex *Pharmacopoea Bremensi* (1792. 8.) aliisque Dispensatoriis novis, atque ex
scri

scriptis pharmaceuticis probatoribus, recepi, e. g. Electuarium mundificans Werlhofii, Liquiritiam coctam, Lapidem divinum, Moschum artificialem, Pilulas balsamicas, Pulverem analepticum, Pulverem refrigerantem et Syrupum scilliticum Pharm. Suec. Tincturam antispasticam Lentini, Tincturam Aconiti, Botryos Mexicanæ, Digitalis, Mari, et Rhabarbari amaram, Syrupum Chamomillæ, Unguentum de Arthanita, Vinum antimoniatum Huxhami, cet. Alias etiam, hisce locis acceptas valdeque usitatas, subjunxi, e. g. Emplastrum flavum, Pulverem infantum, Unguentum exsicicans, quas formulas D^{no} J. G. Heintze, Archiatro Oldenburgico, debemus; proprias denique, pari ratione commotus, addere non dubitavi, v. c. Pulverem eccopropticum, v. digestivum, et Pulverem Sennæ compositum.

Nomina antiqua semper fere, paucis exceptis usu jam notioribus, retinui, *Linnaeum* secutus, qui „*Pharmacopoeorum*, inquit, *nomina*, *saepius licet absurda*, *sancite servavi*, *utpote complurium saeculorum auctoritate*, *ratione legibusque exempta*.“ *Praef. ad Mater. med.* Etenim novae De-

nominations, licet felicissime saepius excogitatae, auctoritate ut plurimum destituuntur, ideoque diversae sunt apud auctores diversos; quae res et tirones, et in arte veteranos, haud raro confundere solet et turbare. Sic e. c. in quatuor novissimis Dispensatoriis *Sal mirabile* diversimodo vocatur: *Alcali minerale vitriolatum*, *Soda vitriolata*, *Sulfas Sodae*, *Natrum sulphuricum crystallisatum*.

Sperandum est, triumphantem hodie in Medicina Chemiam antiphlogisticam, loco denominationum obsoletarum et variantium, adaequatas tandem stabilesque allaturam atque sancituram esse. Interea consultius duxi, ad modum *Pharmacopoeae Amstelodamensis novae*, (1792. 4.) antiquitus receptas denominationes pharmacis descriptis praemittere, atque ex novis aptissimas optimasque literis minoribus, sic ut in *Indice*, expressas subungere, in textu autem antiquas, vel ex novis notissimas tantum, retinere.

Nomina inventorum religiose, ut solent, fervare nolui, sed prorsus omisi, excepto tamen *Arcaeo* et *Seignette*, quorum nomina Balsamo et Sali, usitatissimis, addens

addenda, nec non *Dowero* et *Mindere*
ro, quorum nomina subjungenda formu-
 lis putavi. Etenim formularum plurimae
 successu temporis adeo sunt mutatae, ut
 iis minime convenire denominationes pri-
 mae videantur. Sic e. g. Elixir pectorale
 jam non est *Ringelmanni*, Extractum
 panchymagogum, non *Crollii*, Syrupus
 Altheae, non *Fernelii*, Theriaca, non
Andromachi. Quae causa est, cur et ce-
 tera auctorum nomina, formulis licet
 non mutatis, ut inconstantiae crimen fu-
 gerem, prorsus omittenda duxerim.

Majoris momenti visum est, *Notas Bo-*
nitatis recensere, quas probatissimas phar-
 macis potioribus ut ex voto subjunge-
 rem, Chemiae hodiernae peritum, *A. W.*
Rosenthal, Officinae Kelpianae proviso-
 rem, adii, qui experimenta a me deside-
 rata officiose instituit, atque mecum
 communicavit.

Sic peractum, non sine molestia, opu-
 sculum PATRIAE, sub tutela optimi PRIN-
 CIPIS felicissimae, ut debitum, offero, et
 aequo artis peritorum judicio submitto.

Sic

Indicem Latinum, nomina antiqua et nova complectentem, ut et *Germanicum*, addidi.

Taxam, seu pretia medicamentorum simplicium et compositorum, Pharmacopoeae nostrae mox subjungam.

Scrib. Oldenburgi, 4. April. 1801.

Gerardus Antonius Gramberg, M. D.

Consil. Cancell. Med. Aul. et Mil. Phys. Urb.
et Ducat. Oldenburg. Acad. Imper.
Nat. Cur. Sodal.

PONDERA ET MENSURAE.

Libra medica *continet* Uncias XII.

Uncia - - Drachmas VIII.

Drachma - - Scrupulos III.

Scrupulus - - Grana XX.

Mensura Oldenburgica

respondet Aquae Unciis XXXXVIII.

to examine the nature of the animal, and to determine the nature of the disease, and to prescribe the proper treatment.

POWDERA ET MENSURAE.

Libra medica continet Uncias XII.

Uncia	-	Drachmas viii.
Drachma	-	Scruples iii.
Scrupulus	-	Grana x.

Mensura Aldenburghica
respondet vixime Uncis XXXVII.

MATERIA PHARMACEUTICA

MATERIA
PHARMACEUTICA

Acetum. Essig.

Acetum crudum ex quavis materie, fermentationem spirituosam subeunte, deinde fermentationi acetosae subiecta, obtineri potest. Praeferri solet *Acetum Vini*, ex acescentibus vinis, vel faecibus vini, cet. paratum. Sit limpidum, ex albo flavescent, odoris et saporis fortis grateque resicientis, et tantae aciditatis, ut Unciæ duæ sufficiant ad Alkali fixi Drachmam unam perfecte saturandam. Acetum Acido vitriolico adulteratum, affusis aliquot guttulis aquosæ solutionis Terræ ponderosæ salitæ præcipitatum exhibet, in Spiritu Nitri acido haud solubile; Acido Nitri vel Sale communi inquinatum, turbidum fit ab instillato Spiritu Nitri acido.

Agaricus albus, s. Agaricum.

Lärchenschwamm.

Boletus Laricis Jacquini. In Austria et Sarmatia frequens.

Fungus trunco Pini Laricis adhærens, magnitudine pugni ad capitis humani magnitudinem, figuræ variæ, tuberosus, spongiosus, levis, superne convexus, inferne planus, recens (*Agaricus crudus*) coloris subaurantiaci, odoris farinacei, ficcatus (*Agaricus præparatus*) foris e griseo fuscus, interne albus, in tenues laminas scissilis, odoris

netrantioris, saporis initio dulcis, deinde nauseosi, amaro - acris, adstringentis.

Agaricus quercinus, s. Fungus quernus, s. Agaricus Chirurgorum. Eiche schwamm, Zunderschwamm.

Boletus igniarius L. Per totam Germaniam frequentissimus.

Fungus truncis Quercus, Tiliæ, Betulæ et Fagi adhærens, convexo-planus, figuræ plurimum ungulæ equinæ, mollis, porosus, supra cinereus, margine et intus albescentis.

Aloe. Aloe.

Aloe spicata et Aloe perfoliata L. Frutex utriusque Indiae et Africa australis.

Succus gummoso - resinofus foliorum inspissatus, amarus.

Aloe Socoterina, s. Succotrina, Socoterische Aloe, ex insula Socotera in pericarpis cucurbitinis advecta, dura, fragilis, splendens, subpellucida, coloris ex rubro fusci, pulverata crocei, odoris myrrhini balsamici, saporis amaro - nauseosi.

Aloe hepatica, Leberaloe. Ex insula Barbados allata, priori compactior, ficcior, minus lucens, coloris obscurioris hepatici. odoris gravis, saporis nauseosi, peramari.

Alumen

Alumen crudum. Weisser Alaun.

Sal medium terreum, e schisto aluminari artefactum, in massis maioribus, cryсталlos octöedras sistentibus, ex metallifodinis Germanicis allatum, Romano et Brunsvicensi, partibus heterogeneis inquinatis, præferendum, constat Terra propria argillacea, seu aluminosa, Aleali fixo aut volatili, et Acido vitriolico, non penitus saturato, quapropter solutio Aluminis colorem chartæ, Lacca musica tinctæ, in rubrum mutat. Sit saporis dulcis, styptici, nauseosi, subpellucidum, album, Ferro non inquinatum.

Ambra grisea. Ambra. Grauer Amber.

Concrementum marinum; an *e regno animali*? an potius *bitumen*? Certe in ventriculo et intestinis *Phyfeteris macrocephali* satis copiose nonnunquam reperitur, plerumque et frustulis maioribus residua *Sepia octopodia* inhaerent; præsertim tamen ad oras Asiæ et Africæ australis prope insulas Moluccenses et insulam Madagascar mari innatans invenitur, globulosum, leve, coloris extus nigri, intus grisei, variegati, cereæ fragilitatis, sub digitis mollescens, acui candefactæ tamen non adhærens, in Spiritu Vini totum fere solubile, leni calore instar olei fluens, saporis fere nullius, accensum spumescens cum odore proprio, fragrante, gratissimo.

Ammoniacum, vulgo Gummi

Ammoniacum. Ammoniac - Gummi.

Planta Africana adhuc ignota, forsan umbellifera.

Gummi - resina, advecta ex Abyssinia, Lybia, et Aegypto, praesertim ex deserto Barca, tenax, digitis agitata mollescens, hieme in pulverem redigenda, odoris peculiaris fortis ingrati, saporis nauseoso-dulcis, subsequente amaritie. Advehitur vel in granis, seu lacrymis, angulatis variae magnitudinis, friabilibus, albis, aut flavescentibus, subnitentibus, plerumque invicem conglutinatis; vel in massis maioribus rotundis, extus fuscis, intus variegatis, quibus grana albida, ceu Amygdalæ, immixta sunt.

Amygdalæ. Mandeln.

Amygdalus communis L. Arbor Europæ meridionalis.

Nuclei ovati compressi, testa gilvo-cinnamomea instructi, bipartibiles, albi; vel in pericarpis fulcatis porosis, flavo-fuscis, vel iam enucleati, ex Italia, Gallia, cet. advehuntur.

Amygdalæ amaræ. Bittere Mandeln.

Amygdali communis varietatis fructu minori nucleis, saporis subamari grati. Amarities, partibus volatilibus acribus animalia enecans, et hominibus suspecta, non infidet oleo expresso, quod aequè dulce est, quam Amygdalarum dulcium, sed cuticulæ.

Amygdale dulces. Süße Mandeln.

Amygdali communis fructu maiori nuclei, saporis dulcis, lactei.

Amylum. Krafmehl. Stärkmehl. Amidan.

Triticum hybernum et Triticum turgidum L.

Gramen in Germania frequentissime cultum.

Pulvis subtilissimus seminum comminutorum, post elutionem principii glutinosi et saccharini per aquam frigidam subsidens, coloris albissimi, odoris et saporis expers.

Antimonium crudum.

(*Stibium sulphuratum nigrum.*)

Rohrer Spießglanz. Spießglas.

Minera Antimonii per eliquationem in vasis clausis a matrice purgata, tres circiter partes Antimonii et unam Sulphuris continens, crySTALLIS acicularibus, coloris cinereo-martiati, nitentibus, conspicua.

Argentum cupellatum. Reines Caspellsilber.

Metallum album, nitidum, sonorum, ponderosum, ductile, in igne fixum, in Acido Nitri solubile.

Arsenicum album. Weißer Arsenik.
Kazengift.

Minera Arsenici sublimando calcinata, compacta, ponderosa, recens subpellucida, aëri exposita supra farinacea et opaca, saporis primo exigui, mox cum

dulcedine acris, pungentis, corrosivi, in igne fumo albo, et odore gravi, alliaceo, suffocante, avorsans.

Afa foetida. Stinkender Asand.

Ferula Afa foetida L. *Planta perennis Persiae.*

Succus gummoso. resinofus ex radice vulnerata instar lactis efluens, sole sensim condensatus, adjectus in massis tenacibus variae magnitudinis et formæ, coloris ex flavo fusci, vel ex fusco rosei, commixtis nonnunquam granulis albis subpellucidis, odoris fortis alliacei, foetentis, saporis nauseosi, acris, amaricantis.

Asphaltum, s. Bitumen Judaicum.
Asphalt. Judenpech.

Bitumen solidum, friabile, leve, in fractura nitens, coloris ex fusco nigri, odoris, dum fricatur et accenditur, empyreumatici peculiaris, saporis ingrati, in Spiritu Vini et Alkali caustico, quocum saponem facit, ex parte solubile, ex toto autem, digestionem protracta, in Naphtha Vitrioli Oleisque aethereis, quibuscum vernicem nigram exhibet. In igne flamma alba carbonem relinquendo fluit. Optimum habetur mari mortuo et rubro innatans, vulgari e fodinis Europæis eruto præferendum.

Axungia Porci.

(*Adeps suilla.*) Schweinschmalz.

Sus Scrofa L.

Pinguedo abdominalis recens, mollis, alba, odoris expers.

Bac-

Baccae Berberum. Berberis: Beeren.
Berberizen.

Berberis vulgaris L. Frutex Germaniae,
nostri quoque ducatus.

Fructus maturi, parvi, ovato-oblongi, pulchre
rubri, succum rubrum peracidum, subadstringentem,
largientes.

Baccae Juniperi. Wacholderbeeren.

Juniperus communis L. Arbor aut frutex
Europæ borealis.

Fructus globosi, magnitudine Pisi, foris nigri, in-
tus rubelli, carnosi, resinosi, graveolentes, subas-
mari.

Baccae Lauri. Lorbeeren.

Laurus nobilis L. Arbor Europæ meridi-
onalis.

Drupæ ovales, recentes intense fusci, odoris fra-
grantis, saporis pinguis, amaro-aromatici.

Balsamus, s. Balsamum Copaivæ.
Copaiva: Balsam.

Copaifera officinalis L. Arbor Americae
meridionalis, praesertim Brasilia.

Resina ex arbore stillans oleoso-fluida, consisten-
tiae fere Terebinthinæ, pellucida, flavescens, odoris
specifici subaromatici, non ingrati, saporis subacris,
amaricantis. Optimus Brasiliensis habetur, solubilis

in Alcohole Vini, Naphtha Vitrioli, Oleisque aetheris. Adulteratus Terebinthina et Oleo Amygdalarum dulcium solutionem lacteam turbidamque cum sedimento efficit; Terebinthina quoque, Balsamo ferro candenti insperfo, odore proprio sese prodat.

Balsamus Peruvianus, s. Indicus niger. Schwarzer Peruanischer Balsam.
Perubalsam.

Myroxylon peruiferum L. Arbor Americae meridionalis, praesertim regni Peru.

Succus oleoso-resinosus coctione ramulorum in aqua paratus, ponderosus, spissitudine Syrupi communis; coloris e fusco nigricantis, odoris suaviter fragrantis, Vanigliæ non absimilis, saporis acris amaricantis, ad Salem Benzoes accedentis. Sit solubilis in Alcohole Vini, remanentibus tantum flocculis quibusdam subfuscis; connubium cum Oleis expressis plane respuat; guttula in aquam demissa statim fundum petat; Acidum Vitrioli colore tingat coccineo. Adulteratus Balsamo Copaiyæ, cum Acido vitriolico effervesces, odorem spargit ingratum.

Benzöe, s. Benzöin, s. Asa dulcis. Benzoe. Wohlriechender Asand.

Styrax Benzoin Dryanderi. Arbor Indiae orientalis.

Resina e ramis fauciatis exsudans, friabilis, nitens, subfusca vel fusca, granulis albis immixtis variegata, odoris grati, saporis ex dulci acris.

Bis-

Bismuthum, vulgo Marcasita. Wis-
muth. Marcasit.

Metallum ex albo rubellum, nitens, fragile, scissile, leni igne liquefcens, fortiori in calcem et vitrum mutabile; Acido Nitri nuptum per aquam sub forma calcis albae præcipitatur.

Bolus rubra. Rother Bolus.

Ex fodinis Germaniæ allata argilla, terram martialem continens, sicca, levis, tactu pinguis, linguæ adhaerens, diffracta nitens, coloris rubri lineis vel maculis albis interspersis, saporis nonnihil adstringentis.

Borax, s. Borax Veneta. Borax.

Benedischer Borax.

Tincal Asiæ mediæ; sal minerale nativum, constans Alkali minerali et Acido boracico proprio, prædominante Alkali, colores vegetabilium caeruleos in virides, rubros in violaceos, flavos quosdam in fuscis mutans, nec tamen cum Acidis effervescent; depuratum in Belgis in crystallos abithexæedras columnares, nitide albas, subpellucidas, leni calore fusiles, saporis primo dulcis, deinde subacris, alcalini, amaricantis.

Cacao, s. Noces Cacao.

Cacao. Cacaobohnen. Cacaonüsse.

Theobroma Cacao L. *Arbuseula in America australi frequenter culta.*

Semi-

Semina subovata, seminibus Viciæ Fabæ similia, testa scabra fragili, e fusco nigricante, et pulvere argenteo conspersa, vestita, medullosa, grisea, in lobulos epidermide propria tectos divisa, saporis oleoso-farinacei, grateque amari.

Calx.

(*Calcaria.*) Kalkerde.

Terra propria acido carbonico iuncta, quo amissio in aquæ partibus quingentis solubilis, cum Acido Vitrioli gypsum constituit. Optimam præbent Marmor album, Testæ Ostrearum, cet.

Camphora depurata. Gereinigter Campher.

Laurus Camphora L. *Arbor Indiac orientalis, præsertim Iaponia.*

Camphora cruda, substantia cinerea flavescens, destillatione ramulorum et foliorum cum aqua sublimata in massulis globulosis ex India orientali advecta in Belgis nova sublimatione convertitur in *Camphoram depuratam*, quæ massas exhibet magnas orbiculares, tactu pingues, semipellucidas, coloris nivei glacialis, odoris proprii fragrantissimi, saporis amaricantis, aromatici, acris, cum sensu, primo ustionis, deinde refrigerationis. Camphora, indolis propriæ, hactenus occultæ, nec resinosæ, nec gummosæ, analysi chemica aquam, acidum, oleum et gas exhibens, in Spiritu Nitri acido perfecte solvitur, et in *Oleum* mutatur.

Can

Cantharides. Spanische Fliegen.

Meloe vesicatorius L. *s. Lylla vesicatoria*
Fabricii.

Insecta Europæ meridionalis, oblonga, muscæ
maioris magnitudine, ex viridi splendentia. antennis
nigris filiformibus instructa, a Fraxino, Syringa, et
Ligustro aestate collecta et leniter ficcata, odoris pici
liquidæ similis, virosi, saporis primo picei, mox acris
corrosivi,

Caricae, *s. Ficus passae.* Getrock-
nete Feigen.

Ficus Carica L. *Arbor Orientis et Europæ*
meridionalis.

Receptacula fructus turbinati, carnosî, concavi,
clausi, ficcati, variæ figuræ et magnitudinis, ex albo
flavescentis, superficie interna seminibus exiguis, lenti-
cularibus tecta, atque principio saccharino et mucilagi-
neo referta.

Caryophylli, *s. Caryophylli*
aromatici. Gewürznelken.

Caryophyllus aromaticus L. *Arbor Indiæ*
orientalis, præsertim insularum Moluccensium.

Flores cum calyce ante anthesin ficcati, clavi spe-
ciem simulant, ponderosi, fragiles, oleosi, coloris
fusci, odoris fortis, grati. ad odorem Dianthi Caryo-
phylli accedentis, saporis aromatico-acris, subamari,
ferventis.

Cassia

Cassia Fistula. Rohr : Cassia.

Cassia Fistula L. Arbor Arabiae et utriusque Indiae.

Fructus leguminosi, cylindracei, subinde incurvati, pedem unum, ad duos, longi, pollicem crassi, nigricantes, dissepimentis transversis subflavis interstincti, pulpa nigerrima saporis suaviter dulcis, seminaque rotunda, dura, nitentia, obscure flava involvente, referti.

Castoreum. Bibergeil.

Castor Fiber L.

Humor sebaceus, si recens, albidus, deinde fuscus, in sacculis inter genitalia et anum animalis abdomini adiacentibus secretus, odoris nauseosi, saporis amaricantis; constans probabiliter oleo essentiali, resina, partibusque mucilagineo-gelatinosis.

Castoreum Russicum, s. Moscoviticum, s. Sibiricum, Russisches Bibergeil, optimum, cui etiam Polonicum, Borussicum et Germanicum annumeratur, in sacculis Ovi gallinacei magnitudine, intertextum membranulis tenuioribus, advehitur.

Castoreum Anglicum, s. Canadense. Englisches Bibergeil.

Continetur sacculis minoribus nigris, cellulosa tenaciori interiacens, odore et viribus debilius.

Catechu, *vulgo* Terra Catechu,
s. Terra Iaponica. Catechu.

Mimosa Catechu L. *Arbor Bengalensis.*

Extractum aquosum ligni ad ficcitatem inspissatum in massas variæ magnitudinis, fragiles, coloris nigricantis, saporis adstringentis.

Cera. Wachs.

Apis mellifica L.

Materia vegetabilis indolis propriæ.

Cera flava. Gelbes Wachs. *Cera cruda* ab apibus collecta, et a melle separata.

Cera alba. Weisses Wachs. Per apri-
 cationem sub frequenti aquæ adspersione albata.

Cerasa acida. Saure Kirschen.

Prunus Cerasus L. *Arbor orientalis in hor-*
tis Europais culta, spontanea quoque in vallis septi-
busque Germania, et in nostro ducatu, obuia.

Drupæ globosæ, nigricantes, carnosæ, succum sanguineum gratæ aciditatis largientes.

Cerasa nigra. Schwarze Kirschen.

Vogelfirschen.

Prunus Avium L.

Drupæ globosæ, nigrae, carnosæ, succo subduli nigro turgidæ.

Ceruf-

Cerussa alba. Bleynweiß.

Plumbum carbonicum album, ponderosum, saporis dulcis; paratur dum Plumbum metallicum vapore Aceti corroditur.

Cineres clavellati.

(*Kali carbonicum crudum.*) Pottasche.

Massa salina ex cineribus lignorum elixivando et inspissando parata, dein leniter usta, plerumque partibus heterogeneis inquinata ideoque depuranda. Purissima, Alkali ditissima, ex Hungaria Polonia et America advehitur.

Coccionella. Cochenille.

Coccus Cacti L.

Insectum regni Mexicani, ficcatum rotundum parvum, extus atro - purpureum striis transversis rugosum, et quasi pruina alba adpersum, intus rubrum, contritum exhibens pulverem coloris coccinei, saporis acris, amaricantis, adstringentis.

Colocynthis. Coloquinthe.

Cucumis Colocynthis L. *Planta annua orientalis, praesertim Syria.*

Poma ficcata globosa, magnitudine Pyri Mali, sub cortice coriaceo albido continentia medullam albam levem spongiosam, saporis amarissimi peracris, in loculamentis vero semina oblonga, plana, rufa, absque amaritie.

Colo-

Colophonium, s. Resina flava.

Geigenharz. Colophonium.

Pinus silvestris L. *Arbor Europae borealis.*

Resina post destillationem Olei Terebinthinae remanens, denuo cocta, solida, friabilis, subpellucida, coloris ex flavo fusci, pulverata albi, supra ignem liquata coloris e succineo aurantiaci, et odoris terebinthini.

Conchae. Musterschalen.

Ostrea edulis L.

Testae a sordibus depuratae.

Cornu Cervi. Hirschhorn.

Cervus Elaphus L.

Cornua quovis anno decidua, ramosa, dura, extus scabra, ex cinereo nigricantia, intus alba.

Cornu Cervi raspatum, s. Rasura Cornu Cervi. *Geraspeltes Hirschhorn.* Colore ex griseo nigricante et ex griseo albido, intermixtis frustulis integris, ab adulterato discernendum.

Cortex Angusturae. Ungustura-Rinde.

Magnolia glauca L? *vel Brucea ferruginea?* *vel Dysenterica L'Heritier?* *Frutex Americae meridionalis, praesertim insulae Trinidad.*

Cortex, in frustulis solidis, incurvatis, plerumque sex digitos longis, digitum unum et dimidium latis, lineam unam alteramve crassis, coloris extus e pallido

pallido albicantis, intus e luteo fusci, in fractura nitens, resinofus, odore ingrato, sapore aromatico, amaro-acri, notabilis.

Cortex Aurantiorum. Pomeranzen-Schale.

Citrus Aurantium L. Arbor Orientis et Europae meridionalis, semper virens.

Cortex fructus maturi externus fulvus, inaequalis, poris copiosis pertusus, oleo essentiali abundans, odore fragrante et amaritiae grata praeditus.

Flavedo Corticum Aurantiorum dicitur cortex exterior flavus, praevia maceratione in aqua, ab interiori albo, fungoso, inodoro et insipido, liberatus et siccatus.

Cortex Aurantiorum Curassaviensium. Curassao-Pomeranzenschale.

Citrus Aurantium L. var. Curassaviensis. Arbor Indiae occidentalis et Americae meridionalis.

Cortex fructus maturi, tenuitate et amaritiae aromatica Europaeo praestans.

Cortex Cascarillae, s. Chacarillae. Cascarillrinde. Schacarille.

Croton Cascarilla L.? an Clusia Eluteria L. Frutex, Americae australis, Peru et Paraguay.

Cortex

Cortex in frustulis tubulosis, convolutis, aliquot pollices longis, dimidium circiter digitum latis, lineam fere dimidiam crassis, solidis, fragilibus, in fractura punctis resinosis nitentibus, extus cinereis lichenibus subinde obfritis, intus e fusco ferrugineis, odore, super prunis, aromatico fragrante, moschato, sapore amaricante, aromatico, calido, acri, praeditis.

Cortex Cassiae lignae. (*Cassia Cinnamomea*.) *Cassiarinde. Zimmet: Cassia.*

Laurus Cassia L. Arbor Indiae orientalis, praesertim Insularum Sumatrae, Javae, Zeylon, cet.

Cortex internus ramorum, in frustulis planis, aut convolutis, adjectus, digitum circiter latis, lineam crassis, in fractura glabris et aequalibus, mucilaginosus, nec in tam subtilem, ut Cinnamomum verum, pulverem tundendo abientibus, odore et sapore aromatico Cinnamomi, sed colore intensiore, odore debiliore, et sapore acriore diversus.

Cortex Chinae fuscus, s. officinalis. **Cortex Peruvianus, olim Cortex Kinakinae, s. Chinchinae.** *Gewöhnliche Chinarinde.*

Cinchona officinalis L. Arbor regni Peru, et provinciae, Terra Firma, dictae.

Corticis ramorum frusta convoluta, duos vel tres pollices longa, digitum circiter dimidium lata, ponderosa, fragilia, ad solem splendentia, extus fusca, scabra, plerumque lichene albo obducta, intus coloris e ferrugineo cinnamomei, odoris mucidi, subaromatici, saporis subamari, cum mucore aliquo subadstringente.

Cortex Chinae flavus, s. regius.

Gelbe Chinarinde. Königs Rinde.

Cinchonae species nondum satis definita.

Cortex crassior, lignosior, colore dilutiore cinnamomeo, et principio amaro, subaromatico, ceteris Cinchonae corticibus praestans.

Cortex Chinae ruber. Rothe China-

Rinde.

Cinchonae species nondum satis definita.

Corticis frustula maiora, crassiora, ponderosa, uno latere concava, non convoluta, epidermide ex albo grisea tecta, subtus ex fusco rubra, odoris Chinae officinalis, saporis valde amari, austero-adstringentis, principio resinoso aliis Cinchonae corticibus antecellentia.

Cortex Cinnamomi veri, s. acuti.

Zimmet Rinde. Canel Rinde.

Laurus Cinnamomum L. Arbor Indiae orientalis, praesertim insularum Zeylon, Sumatrae, Javae, et.

Cortex tenuis in cannulam longam convolutus, lignosus, levis, tenax, in fractura fibrosus, coloris ex fusco rubicundi, odoris fortis, gratissime fragrantis, et reficientis, saporis subdulcis, subadstringentis, pungentis, aromatici.

Cortex

Cortex Citri. Citronenschale.

Citrus medica L. *Arbor Asiae, et Europae meridionalis.*

Cortex fructus maturi exterior, tenuis, flavus, recens odoris fortis specifici, grati, saporis aromatici, amaricantis, oleo essentiali abundans.

Cortices siccati, in fructis ovato-acuminatis, extus profunde luteis, intus substantia alba fungosa obductis, odoris et saporis longe debilioris, ex Italia, aliisque Europae meridionalis regionibus, advehuntur.

Cortex Granatorum, s. Malicorum. Granatapfel-Schale.

Punica Granatum L. *Arbor Europae meridionalis, praesertim Hispaniae.*

Cortex fructus, externe rubicundus, interne flavus, crassus, coriaceus, tenax, saporis amaro-austero-adstringentis.

Cortex Guajaci. Guajac-Rinde.

Guajacum officinale L. *Arbor Indiae occidentalis.*

Cortex crassitudine lineae et ultra, ponderosus, scaber, constans lamellis cinereis, aut fuscis, sapore acri praeditis.

Cortex Hippocastani. Rosskastanien-Rinde.

Aesculus Hippocastanum L. *Arbor Germaniae.*

Cortex ramorum alburno adhaerente liberatorum, colore subluteo, sapore amaro, adstringente, haud ingrato, cortici Chinae officinalis quodammodo similis.

Cortex Mezerei. Seidelbast.

Daphne Mezereum, et Daphne Laureola L.
Frutices Hispaniae, Galliae, et Germaniae meridionalis, nobis hortenses.

Cortex trunci et ramorum maiorum, tenuis, quodammodo striatus, extus e viridi fuscus, intus viridescens, saporis peracris, urentis.

Cortex Quassiae. Quassia: Rinde.

Quassia excelsa L. *Arbor Americae meridionalis, praesertim Jamaicae et Guianae.*

Cortex ligni tenuis, fragilis, ex albo cinereus, aut viridescens, amaritiae ligno praeestans.

Cortex Quercus, s. Cortex quercinus. Eichen: Rinde.

Quercus Robur L. *Arbor in Germania frequens.*

Cortex ramorum iuniorum extus glaber, cinereus, Lichene albo subinde obfitus, intus, si recens, albidus, accessu aëris, vel fluiditatis, rubellus, aut subfuscus, ficcatus fragilis, saporis amari, peradstringentis, praefendus cortici ramorum maiorum rimoso, sulcato, fusco, Lichene albo tecto, vermibus plerumque corrosio.

Cortex Salicis fragilis. Bruchweiden, Rinde.

Salix fragilis L. *Arbor Germaniae.*

Cortex ramorum iuniorum tenuis, glaber, nitens, recens ex viridi flavus, vel rubellus, ficcatus externe fuscus, interne albidus, odoris subdulcis, saporis amari, subacris, subbalsamici.

Cortex Salicis laureae. Lorbeerweiden, Rinde.

Salix pentandra L. *Arbor Germaniae, praesertim meridionalis.*

Cortex ramorum iuniorum, tenuis, glaber, flexilis, externe fuscus, interne pallidus, odoris nonnihil fragrantis, subdulcis, saporis balsamici, amari, subadstringentis, non ingrati.

Cortex Simarubae. Simaruba, Rinde.

Quassia Simaruba L. *Arbor Americae, praesertim Guianae.*

Cortex radicis in frustulis pedem et ultra longis, digitos aliquot latis, lineam circiter crassis, incurvatis, vel convolutis, levibus, flexilibus, tenacibus, fibrosis, extus coloris ex albo subfusci, intus albo-lutei, saporis peramari, subadstringentis.

Cortex Ulmi. Ulmenrinde. Ruster, Rinde.

Ulmus campestris L. *Arbor Germaniae.*

Cortex interior ramorum et trunci arboris iunioris, tenuis, glaber, tenax, recens subluteus, ficcatus

rubellus, aut subfuscus, saporis mucilaginei, acris, adstringentis.

Creta alba. Weisse Kreide.

Terra alba, admodum ficca, levis, friabilis, facile in pollen abiens, manusque tingens, odoris et saporis expers, aquam imbibens, in Acidis, excepto Vitriolo, solubilis, ustione in Calcem vivam dilabens. Albissima fit, levissima, purissima, minimeque arenosa. Praestat Colonienfis.

Crocus. Safran.

Crocus sativus L. var. Crocus autumnalis Hoffmanni. Planta perennis Orientis et Europae meridionalis, culta in Gallia, Anglia, Germania.

Stigmata e floribus resecta et ficcata, pollicem longa, tenuia, coloris fulvi, aut obscure rubri, in aqua aurei, odoris aromatici peculiaris, saporis aromatici, amaricantis.

Cubebae. Cubeben.

Piper Cubeba L. f. Piper caudatum Bergii. Frutex Indiae orientalis.

Fructus exsiccati pedicellati, globosi, magnitudine Piperis nigri, e griseo nigrescentes, vel saturate fusci, testa fragili includentes semen albidum, sapore calido, aromatico, subamaro, praeditum.

Cuprum, f. Aes f. Venus. Kupfer.

Metallum solidum, ductile, e flavo rubrum, nitens, sed ab aëre mox offuscatur, et rubigine viridescente obductum, acido carbonico in calcem viridem mutabile.

Ele-

Elemi; vulgo Gummi Elemi, Delbaum Harz.

Amyris elemifera L. Arbor Americae meridionalis.

Refina, ex trunco arboris vulnerato stillans, liquida, mox indurata, tenax, subpellucida, coloris lutei, vel e griseo viridis, odoris peculiaris fragrantis, ad Foeniculum accedentis, saporis amaricantis.

Euphorbium. Euphorbium.

Euphorbia officinarum L. Frutex Africae meridionalis.

Gummi - refina ex frutice vulnerato, velut lac stillans, deinde vel in ipsis spinis indurata, magnitudinis et formae variae, granulata, extus sordide flava, vel rufescens, intus albicans, saporis acerrime urentis, prunis iniecta odoris non ingrati.

Fel Tauri. Ochfengalle.

Bos Taurus domesticus L.

Bilis cystica viscosa, ex flavo viridis, odoris ingrati, saporis peramari; in putredinem prona statim inspissanda et in vitro clauso fervanda.

Ferrum, ꝑ. Mars. Eisen.

Metallum solidum compactum, nigrescens, diffractum e griseo album et nitens, Magneti obediens, in aëre humido et in aqua rubiginosum, acidis solutum, adhibito principio adstringente, nigricans praecipitatur.

**Flores Arnicae. Wölderleih : Blumen.
Fallsraut : Blumen.**

Arnica montana L. *Planta perennis Germaniae.*

Flores compositi saturate lutei, squamulis calycinis brevioribus, non fetosis, apice purpureis, saporis amaro-acris, digitis fricati, aut contusi, sub odore balsamico sternutationem moventes.

**Flores Aurantium, s. Naphae.
Orange : Blüthen. Pomeranzen : Blumen.**

Citrus Aurantium L.

Petala oblonga alba, si recentia, odoris balsamici suavissimi, saporis amaricantis, destillatione Oleum aethereum rubellum, fragrantissimum, largientia.

**Flores Balaustiorum, s. Granati.
Granat : Blumen.**

Punica Granatum L.

Flores austero-adstringentes, petalis coccineis, et calycibus coriaceis rubris conspicui.

**Flores Chamomillae Romanae.
Römische Kamillen.**

Anthemis nobilis L. *Planta perennis Europae meridionalis.*

Flores compositi radiati, receptaculo paleaceo convexo, flosculis disci flavis, aromaticis, odore et sapore
Chamos

Chamomillam vulgarem superantibus, flosculis radii numerosis, brevibus, albis, insipidis.

Flores Chamomillae vulgaris.

Gemeine Kamillen.

Matricaria Chamomilla L. *Planta annua Germaniae.*

Flores compositi radiati, receptaculo nudo, conisco, flosculis disci flavis, amaris et fragrantibus, flosculis radii albis, reflexis, insipidis.

Flores Lavendulae. Lavendel-Blumen.

Lavandula Spica L. *Fruticulus Galliae meridionalis, nobis hortensis.*

Corollae parvae cylindraceae, caeruleae, odoris penetrantis, aromatici, suavis, saporis calidi, amaricantis.

Flores Liliorum convallium.

Mayblumen.

Convallaria majalis L. *Planta perennis silvatica Germaniae.*

Corollae parvae, campanulatae, albae, recentes odoris grate fragrantis, saporis amari.

Flores Malvae arboreae, s. hortensis, s. roseae. Stockrosen. Pap-pelrosen.

Alcea

Alcea rosea L. Planta biennis orientalis, in hortis Europaeis culta.

Corollae atro-fuscae, saporis mucilaginei, subsalsi, subadstringentis.

Flores Malvae vulgaris. Gemeine Pappelblumen.

Malva rotundifolia L. Planta annua Germaniae in ruderatis frequentissima.

Malva silvestris L. Planta perennis Germaniae.

Corollae albae, vel caerulecentes, vel rubellae, venis rubris, aut caeruleis, pictae, saporis mucilaginei.

Flores Meliloti citrini. Meliloten-Blumen. Gelbe Steinflee-Blumen.

Trifolium Melilotus officinalis L. var. floribus citrinis. Planta biennis Germaniae.

Rami cum floribus parvis, papilionaceis, luteis, odoris proprii fragrantis, saporis mucilaginei, amari, subacris.

Flores Millefolii. Schafgarben-Blumen.

Achillea Millefolium L. Planta perennis Germaniae.

Flores compositi parvi, albi, aut rubelli, odoris subaromatici, saporis amari, subacris.

Flo:

Flores Papaveris rhoeados *f. er-*
ratici. Klatschrosen. Klapprosen.

Papaver Rhoeas L. *Planta annua Germaniae, inter segetes frequentissima.*

Petala papaverina vivide rubra, mollia, tactu pingua, odoris subvaporosi, subnarcotici, ingrati, saporis mucilaginei, amaricantis.

Flores Rosarum incarnatarum.
Rothe Rosen.

Rosa centifolia L. *Frutex in hortis frequens.*

Petala subrotunda, pallide rubra, odoris grati, reficientis, saporis subdulcis, subadstringentis.

Flores Rosarum rubrarum. Essig-
rosen. Damascener-Rosen.

Rosa Gallica f. Damascena L. *Frutex Galliae meridionalis, in hortis Germanicis cultus.*

Petala atro-purpurea, odoris debilis, saporis adstringentis.

Flores Sambuci. Hollunder-Blumen.
Holderblüthen. Gliederblumen.

Sambucus nigra L. *Arbor per totam Germaniam frequentissima.*

Cymae

Cymae florentes floribus ex viridi albis, recentes
 odoris peculiaris, fortis, subnarcotici, haud ingrati, sa-
 poris mucilaginei, amaricantis.

Flores Tanaceti. Rainfarn-Blumen.
 Birmfarn-Blumen.

Tanacetum vulgare L. Planta perennis Ger-
 maniae, ad vias, inter segetes frequens.

Flores compositi tubulosi, lutei, odoris et saporis
 fortis, aromatici, camphorati, nauseosi, saporis quo-
 que amari.

Flores Tiliae. Lindenblumen.

Tilia Europaea L. Arbor in pratis nemoro-
 sis Europae meridionalis spontanea, apud nos culta.

Flores parvi, nectario destituti, e viridi albican-
 tes, odoris, si recentes, suavis, subdulcis, subnarco-
 tici, saporis dulcis, subviscidi.

Flores Verbasci. Bollkraut-Blumen.
 Königsferze-Blumen.

Verbascum Thapsus L. Planta biennis Ger-
 maniae, in solo arenoso frequens.

Corollae rotatae, luteae, parvae, odoris suavis, ro-
 facei, saporis pinguis, mucilaginei.

Flores Violarum, s. Violae Mar-
 tiae. Beilchen. Märzviolen.

Viola

Viola odorata L. *Planta perennis Germaniae, in hortis frequenter culta.*

Flores purpureo-caerulei, odoris specifici grati, quodammodo narcotici, saporis mucilaginei, subamaricantis.

**Folia Asari. Haselwurz = Blätter.
Mausohr = Blätter.**

Asarum Europaeum L. *Planta perennis Germaniae, frequens praesertim in coryletis.*

Folia reniformia, bina, longe petiolata, coriacea venosa, supra profunde viridia, nitida, subtus dilutiora, tomentosa, saporis acris, amaricantis, nauseosi.

**Folia Aurantium. Pomeranzen-
Blätter.**

Citrus Aurantium L.

Folia ovata, appendice cordata, ad basin aucta, supra nitida laeteque viridia, subtus pallida, si recentia versus lucem punctulis pellucidis, oleo essentiali praeditis, conspicua, fricata odoris grate fragrantis, saporis amari, subaromatici.

**Folia Ilicis Aquifolii. Stechpal-
men = Blätter. Hülßen = Blätter.**

Ilex Aquifolium L. *Frutex Germaniae, semper virens.*

Folia ovata, margine undulata, dentato-spinosa,
coriacea

coriacea, coloris saturate viridis, nonnunquam variegati, saporis amaricantis, subacris.

Folia Lauro - Cerasi. Kirschlorbeer-Blätter.

Prunus Lauro-Cerasus L. *Arbor Orientis, et Europae australis.*

Folia sempervirentia ovato-lanceolata, margine ferrata, dorso biglandulosa, integra, coriacea, nitide viridia, succulenta, saporis velut Amygdalarum amararum, odoris sub tritura fragrantis, Nucleo Persicae similis, pulverata sternutationem moventia, principio narcotico deleterio abundantia; siccata fere insipida.

Folia Quercus. Eichen-Blätter.

Quercus Robur L.

Folia ovato-oblonga, supra latiora, sinuata, glabra, laete viridia, austero-adstringentia.

Folia Sedi maioris. Großes Hauslauch. Hauswurzfräut.

Sempervivum tectorum L. *Planta perennis Germaniae, in muris, rupibusque obvia, et tectis aedium cum gleba terrae affixa ibidem vicens.*

Folia ovata, acuminata, ciliata, supra plana, subtus convexa, crassa, sempervirentia, laete viridia, apice rubella, radicalia in rosulas disposita, succo acidulo, subaustero, in Spiritu Vini in mucum coagulante, turgida.

Folia

Folia Sennae. Senneßblätter.

Cassia Senna L. *Frutex Orientis et Europae australis.*

Folia ovato-acuta, inaequalia, longitudine semipollicari, coloris ex flavo viridis, odoris ingrati, saporis amaro-acris, nauseosi. Optima sunt *Alexandrina*.

Folia Uvae Ursi. Bärentraubenblätter, Sandbeerenblätter.

Arbutus Uva Ursi L. *Fruticulus Germaniae semper virens.*

Folia obovata, obtusa, utrinque glabra, reticulata, coriacea, supra profunde, subtus dilute viridia, ibique non, ut Folia Vaccinii Vitis Idaeae, punctata, magnitudine circiter foliorum Vaccinii Vitis Idaeae, aut Buxi, odoris balsamici, saporis amaro-adstringentis.

Formicae. Ameisen.

Formica rufa L.

Insecta parva coloris ferruginei, acido volatili proprio praedita.

Fructus Mororum. Schwarze Maulbeeren.

Morus nigra L. *Arbor Sinica, apud nos culta.*

Baccae calycinae compositae, ovato-oblongae, magnitudine semipollicari et ultra, subnigrae, succum atro-purpureum, acidulum gratum, largientes.

Fructus Prunorum. Pflaumen.
Zwetschen.

Prunus domestica L. *Arbor Germaniae, in pomariis frequens.*

Drupae oblongae, glabrae profunde violaceae, pruina caerulea aspersae, carnosae, carne flavescente, saporis grati, subacidi, subdulcis, praeditae.

Fructus Ribium rubrorum. Ro-
the Johannisbeeren.

Ribes rubrum L. *Frutex Germaniae, in hortis cultus.*

Baccae globosae magnitudine Pisi, subpellucidae, rubrae, semina parva continentes, atque succo rubello, mucilagineo, acido grato turgidae.

Fructus Rubi Idaei. Rothe Himbeeren.

Rubus Idaeus L. *Frutex Germaniae, in vinetis et lucis, in nostro quoque ducatu, spontaneus, in hortis cultus.*

Drupae aggregatae, subrotundae, succulentae, coloris rubelli, odoris grate fragrantis, saporis subaciduli grati.

Fructus Tamarindorum. Tamar-
rinden.

Tamarindus Indica L. *Arbor Arabiae et Indiae orientalis.*

Legu-

Legumen oblongum, nonnihil incurvum, compressum duos circiter pollices longum, cortice duplici vestitum, uniloculare, femina subrotunda, fusca, dura includens, pulpa inter utrumque corticem subfusca, saporis acidi grati, praeditum.

Fungus Salicis. (*Boletus Salicis*). Weis
denschwamm.

Boletus suaveolens L. In Europa boreali
frequens.

Fungus Salicibus accrescens, supra convexus, subtus inaequaliter tubuloso-porosus, colore albo, odore, praesertim post pluviam, aromatico fragrante anisato, aut violaceo, grato, sapore amaro subacidulo, praeditus.

Galbanum, s. Gummi Galbanum.
Mutterharz.

Bubon Galbanum L. Planta perennis umbellifera, Arabiae, Syriae, Mauritaniae et Indiae orientalis.

Gummi-resina, ex trunco prope radicem vulnerato stillans, lactea, viscida, mox indurescens, in frustulis allata granulosis, friabilibus, ex albo luteis, vel rufescentibus, odoris gravis, ingrati, saporis calidi, amaro-acris.

Gallae Turcae. Galläpfel.

Quercus Cerris L. Frutex orientalis, praesertim Syriae.

Tumores morboſi foliorum, a punctura Cynipis Quercus, ſubrotundi, duri, verrucoſi, ex albo flaveſcentes, vel cinerei, ſaepe foramine parvo perforati, ſaporis acerbæ adſtringentis. Praeferuntur *Aleppenſes* colore nigro caeruleſcente, et *imperforati*.

Glandes, ſ. Fructus Quercus. Eicheln.

Quercus Robur L.

Nuces maturae, ovato-oblongae, coriaceae, laeves, ſuperne ſubſuſcae, baſi albae, deraſae nucleum album teſta ruſeſcente, ſaporis amaro-auſteri, includentes, abſque cupula, ſ. calycis involucro, ſervandae.

Gummi Arabicum. (*Gummi Mimosae*).

Arabiſches Gummi. Senegal-Gummi.

Mimosa nilotica et *Mimosa Senegal* L. *Arbores Africae mediae.*

Gummi puriſſimum, valde mucilagineum, e cortice exſudans, in fruſtulis induratis allatum globoliſ, oblongiſ, magnitudine Coryli Avellanae, ad magnitudinem Juglandiſ, ſubpellucidum, ex albo luteum, diſfractum nitens.

Gummi Tragacanthae. Traganth.

Astragalus Creticus La Mark. *Frutex inſularum Archipelagi, et Orientis.*

Succus gummoſus ſponte ex fruticuliſ, vel ex vulnerato cortice, exſudans, ficcus, tenax, ſemipellucidus, albus, ſaporis mucilaginei.

Gutti,

Gutti, *f.* Gummi Guttae. Gummi
Gutt.

Stalagmites Cambogioides Murrayi, f.
Guttifera vera Koenigii. Arbor Indiae orientalis.

Gummi-resina ex ramis dissectis, et cortice fau-
ciato, stillans, indurata, in frustis magnis variae for-
mae advecta, opaca, nitens, flava, saporis acris sub-
dulcis.

Helminthochortos. Burmmovs.
Corsicanisches Moos.

Fucus Helminthochortos Haemmertenii.
Ceramium Helminthochortos Rothii. Ad lit-
us Corsicae frequens.

Alga, constans filamentis dense fasciculatis, ge-
niculatis, ramosis, cartilagineis, subfuscis, pollicem
longis, setae equinae crassitie, odoris vaporosi volatis-
lis, ingrati, saporis subsalsi, nauseosi.

Herba Abrotani Maris, *f.* hor-
tensis. Stabfraut. Eberraute.

Artemisia Abrotanum L. Planta perenn-
nis Orientis et Europae australis, nobis hortensis.

Herba, fruticuli, foliis ramosissimis, fetaceis, ex
viridi albidis, odore gravi, sapore amaro, aromatico,
praedita.

**Herba Absinthii maritimi. Sees
wermuth.**

Artemisia maritima L. Planta perennis in
littoribus maris Europae borealis crescens, et hisce nos
stris frequens.

Herba, foliis multipartitis, tomento albo vestitis,
racemis cernuis, flosculis foemineis ternis, recepta-
culo villoso, odore et sapore specifico, amaro, aroma-
tico, subsalfo, praedita.

**Herba Absinthii vulgaris. Ge-
meiner Wermuth.**

Artemisia Absinthium L. Planta perennis
in Germania frequens.

Herba, foliis multifidis, subtus albo-tomentosis,
floribus subglobosis, pendulis, receptaculo nudo, odo-
ris nauseosi, saporis peramari, acris, aromatici.

Herba Aconiti. Eisenhütlein.

Aconitum Napellus et *Aconitum Cam-
marum* L. Plantae perennes in Sudetibus, Hercy-
nia et Austria, in hortis cultae.

Folia palmata, quinquepartita, supra profunde vi-
ridia, subtus pallidiora, saporis amaricantis, acris,
virofi.

Herba Altheae. Eibischkraut. Altheefraut.

Althaea officinalis L. Planta perennis Ger-
maniae.

Folia

Folia simplicia, obsolete triloba, inciso-crenata, tomento molli cinereo tecta, mucilaginem insipidam largientia.

Herba Anagallidis. Rother Gauchheil. Rother Hühnerdarm.

Anagallis arvensis L. et Anagallis phoenicea Hoffmanni. Planta annua agrestis Germaniae.

Herba, plantae decumbentis, ramosae, foliis parvis ellipticis, laete viridibus, subtus punctatis, floribus rubris, florens colligenda, saporis amaricantis, subacris.

Herba Arnicae. Wölverleih. Falskraut.
Arnica montana L.

Folia ovata, integerrima, utraque superficie pilosa, supra obscure viridia, nitentia, subtus pallidiora, saporis subacris, subamari.

Herba Basilici. Basilienskraut.

Ocimum Basilicum L. Planta annua Persiae et Indiae orientalis, nobis hortensis.

Herba plantae ramosae, laete viridis, nonnunquam purpurascens, foliis integris, ovatis, acutis, glabris, punctatis, odoris suavissimi, saporis moderate aromatici, Majoranae quodammodo similis.

Herba Belladonnae. Belladonnablätter. Tollfirschenblätter.

Atropa Belladonna L. *Planta perennis Europae meridionalis, in hortis medicis culta.*

Folia magna, integra, ovata, acuta, supra obscure viridia, infra pallidiora et pilosa, odoris et saporis oleracei, narcotici.

Herba Botryos Mexicanae, s. *Chenopodii Ambrosiaci.* Mexisches Traubenkraut.

Chenopodium Ambrosioides L. *Planta annua Mexicana, nobis hortensis.*

Herba, florens colligenda, racemis foliatis simplicibus, foliis lanceolatis, dentatis, sapore, gaudens aromatico, amaricante, digitis fricata odorem spargens ambrosiacum.

Herba Cardui benedicti. Cardobenediktenkraut.

Centaurea benedicta L. *Planta annua insularum Archipelagi, nobis culta in hortis medicis.*

Herba, foliis magnis, oblongis, sinuatis, asperis, spinosis, obscure viridibus, floribus compositis luteis, squamis calycinis cum involucri foliis lanatis, sapore peramaro praedita, odore ingrato.

Herba Centaurii, s. Centaurei minoris. Tausendgöldenkraut.

Gentiana Centaurium L. s. *Chironia Centaurium* Curtis. *Planta annua Germaniae.*

Herba, florens colligenda, floribus rubellis, foliis ovatis, laete viridibus conspicua, sapore gaudens acri, peramaro; praeferenda summitatibus cum floribus.

Herba Chelidonii Majoris. Großes Schöllkraut.

Chelidonium majus L. Planta perennis Germaniae, ad muros et sepes frequens.

Herba, foliis magnis, pinnatis, foliolis incisis, foliis Quercus similibus, tennibus, mollibus, colore ex flavo viridi, odore ingrato, gravi, sapore amaro, acri, praedita, recens succum aurantiacum, acrem, largiens.

Herba Cicutae maculatae. Schierling. Erdschierling. Gefleckter Schierling.

Conium maculatum L. Planta biennis Germaniae.

Folia supradecomposita, foliolis lanceolatis, incisis, glabris, supra saturate viridia, subtus pallidiora, caule maculis purpureis aspersis, odoris vaporosonauseosi, sub tritura Felium lotio similis, saporis subdulcis, subacris.

Herba Cochleariae. Löffelkraut.

Cochlearia officinalis L. Planta annua ad littora maris Europae borealis frequens.

Herba, florens colligenda, foliis radicalibus, subrotundis, caulinis oblongis, sinuatis, nitide viridibus,

bus, succosis, odore, sub tritura, specifico, volatili, acri, et sapore acri; amaro, falso, praedita.

Herba Digitalis. Rother Fingerhut.

Digitalis purpurea L. *Planta silvestris montana Helvetiae et Germaniae, nobis hortensis.*

Folia elliptica, rugosa, hirsuta, margine ferrata, supra obscure viridia, subtus pallidiora, saporis amari, acris.

Herba Flammulae Iovis, s. Clematidis erectae. Brennfraut. Aufrechte Baldrebe.

Clematis erecta L. *Planta perennis Germaniae meridionalis, Austriae, Bavariae, cet. nobis hortensis.*

Herba, florens colligenda, corollis albistepetalis, aut pentapetalis, foliis pinnatis, foliolis ovatis, lanceolatis, integerrimis, longe petiolatis, supra obscure viridibus, infra pallidioribus. Folia recentia, perinde ac Flores, ardorem in lingua et faucibus cient, diutius retenta ruborem et vesiculas; ficcata sunt mitiora sapore parum urente, acido, subdulci, leniter adstringente; contrita tamen naribus, faucibus et pectori, infesta.

Herba Fumariae. Erdrauch.

Fumaria officinalis L. *Planta annua Germaniae, inter segetes frequens.*

Folia

Folia supradecomposita, foliolis trilobatis, tenerrima, ex caeruleo viridia, odoris mucidi, saporis amari, acris.

Herba Gratiolae. Gnadenfraut.

Gratiola officinalis L. Planta perennis Germaniae, pratensis et riparia.

Herba, florens colligenda, foliis oblongo-lanceolatis, serratis, glabris, laete viridibus, floribus ringentibus, subalbidis, sapore peramaro, acri, praedita.

Herba Hederae terrestris. Gundersmann.

Glechoma hederacea L. Planta perennis in Germania frequentissima.

Folia reniformia, crenata, glabra, obscure viridia, recenter fricata odoris fortis, ingrati, saporis amari, subaromatici.

Herba Hyoscyami. Bilsenfraut.

Hyoscyamus niger L. Planta annua Germaniae, in ruderatis et ad vias frequens.

Folia semiamplexicaulia, oblonga, lata, sinuata, hirsuta, ex cinereo viridia, odoris virosi valdeque narcotici, saporis salini, amaricantis.

Herba Hyperici. Johanniskraut.

Hypericum perforatum L. Planta Germaniae perennis, pratensis et silvestris.

Herba

Herba, florens colligenda, foliis ovatis, obtusis, pellucido-punctatis, gummi-resina rubicunda repletis, petalis luteis, oblique truncatis, crenulatis, puncto atro intra crenam notatis, sapore subacri, balsamico, subadstringente, praedita, odore suavi.

Herba Hyssopi. Isop.

Hyssopus officinalis L. Fruticulus Europae meridionalis, nobis hortensis.

Herba, foliis lanceolatis, integris, glabris dilute viridibus, odoris fragrantis, grati, saporis amaro-aromatici.

Herba Iaceae, f. *Violae tricoloris*. Stiefmütterchen. Drensfaltigkeitsblume.

Viola tricolor L. Planta Germaniae annua.

Herba, florens colligenda, floribus calyce glabro duplo maioribus, foliis ovatis, inciso-crenatis, flavo-viridibus, stipulis dentatis, recens fricata odori Nucleorum Persicae similis, saporis mucilaginei, subacris.

Herba Lichenis Islandici. Isländisches Moos.

Lichen Islandicus L. In Sudetibus, Hercynia, monte Bructero, aliisque Germaniae montibus frequens.

Lichen ficcus, coriaceus, sinuatus, lacunofus, supra cinereus, subtus fuscus, saporis amaricantis, mucilaginei.

Herba

Herba Linariae. Leinfraut.

Antirrhinum Linaria L. Planta Germaniae perennis.

Herba, florens colligenda, floribus imbricatis luteis, foliis lanceolato-linearibus, confertis, laete viridibus, odoris subvaporosi, nauseosi, saporis subamari, ingrati.

Herba Majoranae. Majoran.

Origanum Majorana L. Planta annua Europae meridionalis, nobis hortensis.

Folia ovata, obtusa, subtomentosa, ex viridi albicantia, odoris specifici, fortis, saporis aromatici, subacris.

Herba Malvae. Râsepappeln. Pappelfraut.

Malva rotundifolia L.

Folia cordato-orbiculata, subquineloba, glabra, obscure viridia, saporis mucilaginei.

Herba Mariveri. Amberfraut.

Teucrium Marum L. Fruticulus Orientis et Europae australis, praesertim Syriae et Hispaniae.

Herba, foliis parvis, ovato-acutis, integris, subtus tomento albo superinductis, floribus racemosis purpureis, odore fragrante, camphoraceo, sapore calido, amaro, acri, praedita.

Herba

Herba Marrubii albi. Weißer Andorn.

Marrubium vulgare L. Planta perennis Germaniae, in ruderatis frequens.

Folia ovato-oblonga, crenata, rugosa, mollia, subtus albicantia, odoris sub frictione quomdammodo moschati, saporis amari, subadstringentis.

Herba Matricariae. Mutterkraut.

Matricaria Parthenium L. Planta perennis Germaniae.

Herba, florens colligenda, floribus compositis radiatis, disco flavo, radio albo, brevi, foliis compositis, planis, foliolis ovatis, incisis, mollibus, subpilosissimis, pallide viridibus, odore fragrante, nonnihil nauseoso, sapore amaro, aromatico, praedita.

Herba Meliloti. Melotenkraut. Steinflee.

Trifolium Melilotus officinalis L. Planta annua vel biennis Germaniae, ad vias, aggeres, et ruderata crescens.

Herba, florens colligenda, floribus luteis, foliolis ex petiolo communi ternis, petiolatis, oblongo-ovatis, ferrato-dentatis, glabris, intense viridibus, odore specifico fragrante, sapore herbaceo, subamaro, acri.

Herba Melissa, s. Melissae citratae. Melisse. Citronenmelisse.

Melissa officinalis L. Planta perennis Germaniae meridionalis, nobis hortensis.

Folia

Folia ovato-cordata, ferrata, villosa, dilute viridia, odoris citrei grati, saporis aromatico-balsamici, subacris.

Herba Menthae crispae. Krause münze.

Mentha crispa L. Planta perennis Sibirica, nobis hortensis.

Folia cordata, dentata, rugosa, undulata, profunde viridia, odoris fortis, specifici, saporis subamarum, aromatici, calidi.

Herba Menthae piperitae. Pfef- fermünze.

Mentha piperita L. Planta perennis Angliae, nobis hortensis.

Folia ovata, acuta, ferrata, glabra, laete viridia, odore penetrante, sapore aromatico, camphoraceo, urente, praedita.

Herba Millefolii. Schafgarbe.

Achillea Millefolium L.

Herba, foliis bipinnatis, laciniis linearibus, dentatis, saturate viridibus, odoris balsamici, saporis amaro-aromatici, subacris.

Herba Nicotianae. Toback.

Nicotiana Tabacum L. Planta annua Americae australis, in Germania culta.

Folia

Folia magna, integerrima, oblongo-lanceolata, coloris vivide viridis, ficcata fusci, odoris peculiaris, nauseosi, saporis acris, amari.

Herba Origani Cretici. Spanischer Hopfen.

Origanum Creticum L. *Planta perennis*
Europae australis.

Herba, spicis aggregatis, longis, prismaticis, ex viridi subfuscis, bracteis membranaceis calyce duplo longioribus, odore iucundo, gravi, sapore grate aromatico, amaricante, praedita.

Herba origani vulgaris. Gemeiner Dost. Wohlgemuth.

Origanum vulgare L. *Planta perennis* Ger-
maniae.

Herba, ramis quadrangulis, rubentibus, pilosis, foliis oppositis, ovatis, margine integris, dilute viridibus, florum bracteis ovatis, calyce longioribus odore grato, balsamico, Majoranae non absimili, sapore acri, amaricante, aromatico, gaudens.

Herba Pulegii. Poley.

Mentha Pulegium L. *Planta perennis* Ger-
maniae, in locis humidis crescens.

Herba, florens colligenda, floribus verticillatis, rubicundis, foliis parvis, ovato-lanceolatis, serratis, hirsutis, odoris fragrantis, saporis amaro-aromatici.

Herba

Herba Roris marini, *f.* Anthos.
Rosmarin.

Rosmarinus officinalis L. *Frutex Europae meridionalis, nobis hortensis.*

Herba, floribus ringentibus, parvis, dilute caeruleis, foliis lineari-lanceolatis, margine revolutis, supra viridissimis nitentibus, subtus nervosis, tomento incano tectis, odorem fragrantem, aromaticum, ingratum spirantibus, sapore acri, camphoraceo, subadstringente, praeditis.

Herba Roris marini silvestris, *f.*
Ledi palustris. Wilder Rosmarin.
Porsch.

Ledum palustre L. *Fruticulus in locis co-
spitosis et uliginosis Germaniae frequens.*

Folia sparsa, linearia, margine revoluta, supra glabra saturate viridia, subtus hirsuta rubiginosa, odoris gravis, saporis amaro-adstringentis.

Herba Rutae, *f.* Rutae hortensis.
Raute. Weinraute.

Ruta graveolens L. *Frutex Europae australis, nobis hortensis.*

Herba, foliis decompositis, foliolis subrotundis, ex viridi caeruleo-virescentibus, specificè graveolentibus, saporis amaro-acris, subaromatici.

Herba Sabinae. Sevenbaum. Sade-
baum.

Juniperus Sabina L. Arbor orientalis semper virens, nobis hortensis.

Summitates ramorum foliis oppositis erectis, decurrentibus, profunde viridibus, odoris gravis, saporis amaro-acris, resinosi.

Herba Salviae. Salben.

Salvia officinalis L. Fruticulus Europae australis, nobis hortensis.

Folia lanceolato-subovata, integra, rugosa, crenulata, ex griseo viridescencia, odoris aromatici, saporis subadstringentis.

Herba Saponariae. Seifenkraut.

Saponaria officinalis L. Planta perennis Germaniae.

Folia ovato-lanceolata, glabra, trinervia, vivide viridia, submucilaginea.

Herba Scordii. Scordienkraut. Laschenfnoblauch.

Teucrium Scordium L. Planta perennis Germaniae.

Folia oblonga, sessilia, dentato-ferrata, subhirsuta, profunde viridia, odoris, si recentia, alliacei, saporis acris, peramari.

Herba Serpylli. Quendel. Wilder Thymian.

Thy

Thymus Serpyllum L. Fruticulus in Germania frequentissimus.

Herba caulis repentis, debilis, foliis parvis, planis, ovatis, obtusis, basi ciliatis, floribus capitatis purpurascens, odoris grate citrini, saporis amaro-aromatici.

Herba Tanaceti. Kainfarn. Burmfraut.
Tanacetum vulgare L.

Herba, foliis pinnatifidis, planis, oblongis, argute serratis, pilosis, supra punctatis, profunde viridibus, odore forti camphoraceo, sapore amaro, aromatico, gaudens.

Herba Taraxaci. Löwenzahn.

Leontodon Taraxacum L. Planta perennis, per totam Germaniam frequentissima.

Herba, floribus compositis, lingulatis, flavis, foliis runcinatis, denticulatis, laevibus, laete viridibus, saporis amaricantis.

Herba Thymi. Thymian.

Thymus vulgaris L. Fruticulus Europae meridionalis, nobis hortensis.

Herba caulis erecti, firmati, floribus verticillato-spicatis, albis, foliis ovatis, revolutis, fusco-punctatis, odore et sapore aromatico acri, penetrante, notabilis.

Herba Trifolii fibrini. Dreyblatt.
Bitterflee. Fieberflee.

Menyanthes trifoliata L. *Planta perennis palustris Germaniae.*

Folia terna, ovata, integerrima, glabra, optime viridia, odoris sub frictione ingrati, saporis amari.

Herba Tussilaginis, s. Farfarae.

Hustattig.

Tussilago Farfara L. *Planta perennis Germaniae.*

Folia subcordato - angulata, denticulata, supra dilute viridia, subtus tomento incano vestita, saporis mucilaginei, amaricantis, subadstringentis.

Herba Verbasci. Bollkraut. Königsferzenkraut.

Verbascum Thapsus L.

Herba, foliis decurrentibus longis, crassis, ovato-lanceolatis, e griseo viridibus, utrinque tomento albo, molli, tectis, sapore herbaceo, mucilagineo, subamaro, praeditis.

Herba Veronicae. Ehrenpreis.

Veronica officinalis L. *Planta perennis Germaniae.*

Herba, caule procumbente, spicis lateralibus pedunculatis, floribus caeruleis, foliis oppositis, ovatis, crenatis, subhirsutis, colore languide viridi, sapore amaricante, subadstringente, praedita.

Hirun

Hirudines vivae. Blutegel. Blutigel.

Hirudo medicinalis L.

Vermes, corpore oblongo, depresso, molli, viscido, duos, vel tres, pollices longo, calamum anserinum, et ultra, crasso, ore caudaque in orbiculum expandendis sese promoventes, in dorso fusci, lineis sex flavis notati, intermediis maculatis, subtus cinerei maculis nigris; verno tempore ex aquis limpidis, arenosis, colligendi, et in vitris, aquae purae semiplenis, servandi.

Ichthyocolla, s. Colla Piscium.

Hausenblasen. Fischleim.

Acipenser Sturio et *Acipenser stellatus* L.

Gluten album, semipellucidum, tenax, in aqua facile solubile, ex vesica natatoria coctione extractum, refrigerio condensatum, convolutum.

Kino, s. Gummi Kino, s. Gummi

Gambienfe. Kinogummi. Kinoharz.

Arbor Africae interioris nondum satis cognita.

Gummi-resina, ex Cortice vulnerato stillans, et in massas condensata diffformes, fragiles, opacas, obscure rubras, saporis cum quadam dulcedine peradostringentis.

Lacca in ramulis, s. baculis. Stanzgenlack.

Coccus Ficus L.

Massa resinoso-ceracea, fragilis, subpellucida, rubra, exsudans super larvas *Cocci Ficus* ex ramulis *Fici religiosae*, et *Fici Indicae*, quibus adhaerens affertur; masticata salivam tingit colore purpureo, aquam calidam chermesino, subsidente pulvere nigricante, Spiritui Vini saporem impertit subamarum, subadstringentem, cum odore grato.

Lapides Cancrorum. Krebssteine,
vulgo Krebsaugen.

Cancer Astacus L. Cancer fluviatilis Fabricii.

Concrementa albicantia calcarea, texturae lamellosae, superficie, qua ventriculo cancri adhaerent, umbilicatae, saporis terrestris; in Acido Nitri soluta mucilaginem relinquunt, Lapidum solutorum figuram repraesentantem, quo ab adulteratis distinguuntur.

Lapis Calaminaris, s. Cadmia fossilis. Galmenstein.

Minera Zinci calcinata, friabilis, vel lapidea, ponderosa, coloris ex luteo cinerei. Praefertur *Goslarie*nsis.

Lignum Guajaci, s. Lignum sanctum. Guajac-Holz.

Guajacum officinale L.

Lignum lamellosum, durissimum, compactum, in aqua subsidens, resinosum, cortice ex cinereo nigricante tectum, punctatum, colore ex griseo flavescente,

te, odore, si accenditur, aromatico, sapore subacri, subamaricante, praeditum.

Lignum Juniperi. Wacholderholz.

Juniperus communis L.

Lignum radicis, cortice cinereo tectum, solidum, ponderosum, resinosum, albidum, intus rubellum, odoris, si accenditur, fragrantis grati, saporis aromatici, subacris.

Lignum Quassiae. Quassiaholz. Bitterholz.

Quassia excelsa L.

Lignum trunci et ramorum diversae magnitudinis et crassitiei, solidum, durum, leve, albicans, cortice tenui, albicante vestitum, et sapore peramaro praeditum.

Lignum Sassafras. Sassafrasholz. Fenchelholz.

Laurus Sassafras L. Arbor Americae, praesertim provinciarum Carolinae, Virginiae, cet.

Radix arboris lignosa, prostrans in frustis longis, levibus, cortice ferrugineo, vel spadiceo, vestitis, colore rubicundo, odore fragrante, grato, foeniculaceo, sapore subdulci, subacri, aromatico, gaudens.

Lithargyrum, s. Lithargyrium.

Silberglätte. Bleiglätte.

Plumbum oxydatum, semifusum, ponderosum, tactu pingue, in cupellatione Argenti, forma squamarum, e rubello flavescentium, obtentum.

Macis. Muscatenblumen.

Myristica moschata L. Arbor aromatica insulae moluccensis, Bandae.

Tegmentum reticulatum Nucem moschatam proxime vestiens, tenax, pingue, coloris cinnamomei, vel crocei, odoris fortis, balsamici, saporis calidi, aromatico-amaricantis, grati.

Magnesia nigra, s. Magnesia Vi-
triariorum, s. Magnesium. (*Manganese-
sum oxydatum nativum*). Braunstein.

Metallum compagis radiosae, vel stellatae, fragile, nitens, e cinereo nigrescens, manus inquinans, perquam oxydatum, et in vase clauso ignitum Gas Oxygenium largiens.

Manna, s. Manna Calabrina. Man-
na. Calabrische Manna.

Fraxinus Ornus L. var. *rotundifolia* L.
Arbor in Calabria et Sicilia frequens.

Succus saccharinus, viscidus, levis, fragilis, ex albo lutescens, odoris melligeni, saporis dulcis, subas-
cris, ex arbore sponte stillans, eaque optima: Manna
in granis, vel Lacrymis albidis, et Manna cannulata
dicta; vel ex arbore fauciata educta, in massas con-
densa:

densata tenaces, sordide luteas, odoris et saporis subacidi, nauseosi: (*Manna crassa vulgaris*).

Mastiche. Mastix.

Pistacia Lentiscus L. Arbor insularum Archipelagi.

Resina ex vulnerata arbore exsudans, granulosa, fragilis, pellucida, coloris pallide citrini, accensa odoris grate balsamici, atque saporis specifici, subaromatici, quodammodo adstringentis.

Mel. Honig.

Apis mellifera L.

Massa saccharina subpellucida, ex albo flava, ab Apibus e nectariis florum collecta.

Mel album, s. Virgineum, Weißer Honig, Jungfernhonig. Sponte ex favis juniorum apium effluens, spissum, granulosum, albicans, odoris et saporis suavis.

Mel commune, s. crudum, Gemeiner Honig.

Calore et pressione ex cellulis ceraceis elicatum, partibus cereis mixtum, tenacius, coloris saturioris, odoris et saporis minus grati.

Mercurius vivus, s. Argentum vivum. (Hydrargyrum.) Quecksilber.

Metallum coloris splendide argentei, valde ponderosum, sub nostro coelo liquidum, pressione in globulos dissiliens. Sit purum, sine sordibus relictis fluens, corium pressione perfecte permeans, in crucibulo candente

dente totum avolans, nec cum Aceto decoctum dulcedinem producat. Depuratione plerumque indiget.

Millepedes, *f.* Millepedae, *f.* Asfelli. Kellerswürmer.

Oniscus Asellus L.

Insecta, longitudine circiter semipollicari, oblonga, lateribus ferrata, dorso cinereo, abdomine albo, pedibus quatuordecim, instructa, tactu conglobata, humore acri repleta.

Minium. Mennig.

Plumbum ustione in calcem rubram, subflavam, conversum, valde ponderosum, squamulisque minutissimis, nitidis, conspicuum. Purum, carboni impostum, ope tubi ferruminatorii prorsus in globulum metallicum redigitur.

Moschus. Bisam. Muscus.

Moschus moschiferus L.

Massa unguinosa, secreta in vesicis oblongis animalis abdomini inter genitalia et anum adiacentibus, siccata cum vesicis granula ferruginea, subnigra, sanguini grumoso similia, in textu celluloso deposita, referens, odoris specifici, fragrantissimi, saporis amaricantis. Moschus via sicca dat Alcali volatile, fluidum et crystallifatum, Gas Oxygenium, et Oleum empyreumaticum, relicto carbone; solubilis fit in Spiritu Salis acido et in Oleo Vitrioli, ac cum Cineribus clavellatis tritus, absque odore volatili alcalino.

Moschus

Moschus Tunquinesis, Chinesischer Bisam; optimus, at rarissimus, vesicam velut ovum columbinum replens, instructam cute, pilis radiatis, ex albo subfuscis, obsita.

Moschus Cabardinus, s. *Tabbargus*, s. *Moscoviticus*, Russischer Bisam; odore et efficacia debiliori, folliculo pilis albicantibus obsito notabilis.

Myrrha, s. *Myrrha rubra*. Myrrhe.

Arbor Aethiopiae nondum cognita.

Gummi-resina, ex arbore vulnerata fluens, condensata, granulosa, tactu pinguis, friabilis, subpellucida, extus fusca, intus ex flavo rubens, odore peculiari, forti, hand ingrato, sapore amaro, aromatico, praedita.

Nitrum crudum, s. commune, s. vulgare. (*Kali nitricum*). Salpeter.

Sal medium, vel *nativum* ex India orientali, ac quibusdam Europae regionibus; vel *artefactum* ex nitrariis Europaeis in frustis minoribus, vel maioribus fordide albis, allatum, saporis acris, amaricantis, cum sensu refrigerationis, in aqua solubile, in igne aperto scintillas exhibendo comburens, clauso liquefescens, carbone admixto detonans, metalla ignita in calcem mutans; Terram calcaream, Sal commune, et Magnesium plerumque continet, ideoque depurandum.

Nuces Juglandis immaturae. Unreis

se Wallnüsse. Grüne Welsche Nüsse.

Juglans

Juglans regia L. Arbor orientalis, apud nos culta.

Nuces immaturae, ovales, seu subrotundae, cortice carnosio, crasso, glabro, extus viridi, digitos inquinante, intus albo, vestitae, saporis austero-amari.

Nuces moschatae, s. Myristicae.

Muscattennüsse.

Myristica moschata L.

Nuclei subrotundi, solidi, ponderosi, oleosi, extus cinerei, intus ex fusco rubentes, odoris grati, penetrantis, saporis subpinguis, aromatici, iucunde calidi.

Nuces Vomicae. Krähenaugen.

Strychnos Nux Vomica L. Arbor Zeylanica et Malabarica.

Nuclei subrotundi, compressi, umbilicati, tenaces, villis ex cinereo argenteis obsiti, saporis peramarum, nauseosi, ingrati.

Oleum Bergamottae, s. Corticum Aurantium. Bergamottöl.

Pomeranzenöl.

Citrus Aurantium L.

Oleum aetherium fragrans, e cortice fructus maturi expressione in Italia et Gallia paratum, subpellucidum, flavescent, odoris et saporis corticum siccatum.

Oleum

Oleum Cajeput. Cajeputöl.

Melaleuca Leucodendron L. *Arbor oriens talis, in Malabarica et insula Banda frequens.*

Oleum aethereum, ex foliis arboris destillatum, pellucidum, e viridi flavescent, odoris et saporis fragrantissimi camphoracei; accensum, vel evaporatum, penitus evanescent.

Oleum Caryophyllorum aromaticorum. Nelkenöl. Gewürznelkenöl.

Caryophyllus aromaticus L.

Oleum aethereum fragrans, in loco natali Indiae ex Caryophyllis destillatum, limpidum, tenue, si recens, album, successu temporis flavescent, vel fulvum, odoris caryophyllacei, saporis grati, subacris, calidi, non urentis, in aqua subsident, in Alcohole Vini penitus solubile.

Oleum de Cedro. Cedronöl.

Citri medicae L. *varietas.*

Oleum aethereum fragrans, subflavescent, e sacculis oleosis Corticis fructus maturi pressione paratum, et ex Italia advectum, odore et sapore optimo Corticis cum Citri recentium, praestans *Oleo Corticis Citri destillato.*

Oleum Cinnamomi. Zimmtöl. Cassinelöl.

Laurus Cinnamomum L.

Oleum

Oleum aethereum fragrantissimum, in loco natali Indiae destillatum ex cortice et floribus, limpidum, ex albo flavescentis, in aqua subsidens, odoris fortis cinamomei, saporis acris, calidi, gratissimi.

Oleum laurinum. Lorbeeröl. Loröl.

Laurus nobilis L.

Oleum unguinosum, subaethereum, praegressa coctione expressum e Lauri baccis recentibus, ex Italia et Hispania allatum, spissitudine Butyri, coloris ex viridi flavescentis, odoris fortis laurini, saporis amaricantis, in Alcohole Vini prorsus solubile.

Oleum Macis. Muscatenblumenöl.

Myristica moschata L.

Oleum aethereum destillatum in India orientali, tenue, limpidum, fragrantissimum, volatile, coloris ex albo flavescentis, odore et sapore Macis forti, aromatico, suavi, praeditum.

Oleum Nucistae, s. Nucis Moschatae. Muscatennußöl.

Myristica moschata L.

Oleum subaethereum, ex Belgis plerumque allatum, expressum leni calore e nucibus moschatis, primo limpidum et flavum, frigefactum consistentiae fere baceae, extus flavum, intus rubellum, variegatum, odoris et saporis moschati, fortis.

Oleum Olivarum. Baumöl. Olivenöl.

Olea Europaea L. Arbor Europae meridionalis.

Oleum unguinosum, expressum e fructibus fere maturis, pellucidum, pallide luteum, vel ex albo subviride, odoris fere nullius, saporis subdulcis, blandi, frigore facillime congelans.

Oleum Petrae, s. Petroleum. Bergöl. Steinöl.

Bitumen liquidum, ceu oleum aethereum, plerumque e saxorum fissuris stillans, ex Italia et Gallia advectum, consistentiae spissiusculae, flavum, vel ex fusco rubescens, odoris et saporis fragrantis, acris, Oleo Succini rectificato non absimilis, in Oleis solubile, non vero in Spiritu Vini.

Oleum Ricini. Ricinusöl.

Ricinus communis L. var. seminibus minoribus. Planta annua Indiae occidentalis.

Oleum unguinosum, e feminibus leni calore expressum, spissiusculum, ponderosum, ex albo flavescentis, odoris fere nullius, saporis tenuissimi, frigore non congelans.

Oleum Sassafras. Sassafrasöl.

Laurus Sassafras L.

Oleum aethereum, in America ex cortice et ligno destillatum, in aqua fundum petens, sub frigore non nihil congelans, coloris ex albo flavescentis, odoris grati foeniculacei, saporis calidi, aromatici, acris.

Oleum Vitrioli. (*Acidum vitriolicum, s.*

sulphuricum concentratum). Vitriolöl. Con-

centrirte Vitriol: oder Schwefelsäure.

Acidum

Acidum minerale, combustionem Sulphuris, aut destillatione ex Vitriolo Martis, obtentum, consistens oleosae, ponderosissimum, coloris et odoris proprie nullius, plerumque tamen colorem fuscum, odorem sulphureum, induens, accedente aëre fumans, valde corrodens, etiam multa aqua dilutum saporis acidi styptici. *Optimum est Nordhusanum, Anglico praestans, aequae tamen depuratione indigens.*

Olibanum, s. Thus. Weihrauch.

Juniperus Lycia, et Juniperus thurifera L. Arbores orientales.

Refina ex cortice sudans, condensata in grana variae magnitudinis, cohaerentia, fragilia, subpellucida, ex albo lutea, odoris supra ignem fragrantis grati, saporis balsamici, subamari.

Opium. Mohnsaft.

Papaver somniferum L. Planta annua Orientis, praesertim in Persia culta.

Succus gummeo-refinosus, lacteus ex pericarpis fauciatis stillans, in massam induratus tectam plerumque foliis Papaveris, vel pulvere aliorum vegetabilium, ponderosam, opacam, foris spadiceam, in fractura nitentem, odoris fortis, ingrati, narcotici, virosi, saporis, primo nauseosi et amari, deinde acris calidique.

Opoponax, vulgo Gummi Opoponax. Opoponax. Panargummi.

Pastinaca Opoponax L. Planta biennis Orientis et Europae australis.

Gummi-

Gummi - refina, e fauciatis ramulis et radicibus elicita, granulosa, tactu subpinguis, fragilis, extus spadicea vel fusca, intus flava vel albicans, magnitudine Pisi, aut Fabae Viciae, odore forti, ingrato, levistico, sapore amaro, nauseoso notabilis, et praes ferenda *Opoponaci in massis* nigricantibus, impuris.

Ova Gallinacea recentia. Frische
Hünereyer.

Phasianus Gallus domesticus L.

Piper album. Weißer Pfeffer.

Piper nigrum L. Frutex Indiae orientalis.

Nuclei fructus maturi, cortice nigro acriori liberati, albi, rotundi, glabri, odoris subaromatici, saporis calidi, acris, quodammodo urentis.

Plumbum, s. Saturnus. Bleij.

Metallum ex albo caerulescens, valde ponderosum, molle, ductile, parum tenax, via sicca Oxygenium facile attrahens, igne mediocri fluens, deinde in calcem abiens, frictione odoris valde ingrati, Alcoholi Aceti nuptum saporis subdulcis.

Poma Aurantiorum immatura, s.
Aurantia Curassavica. Unreife
Pomeranzen. Curassao - Aepfel.

Citrus Aurantium L.

Fructus immaturi, rugosi, magnitudine Pisi ad Cerasi magnitudinem, coloris ex viridi fusci, saporis peramari, subaromatici.

Poma Citri. Citronen.

Citrus medica L.

Fructus ovales, vestiti foris cortice tenuiori, gibbofo, flavo, oleifero, proprie et suaviter fragrante, intus spongiofo, albo, insipido, pulpam continente succulentam, acidam, cum feminibus pallidis, ovato-acutis, amaris.

Poma acidula. Säuerliche Aepfel.

Pyrus Malus L. Arbor in hortis Europaeis culta.

Praeferuntur Borsdorfiana et Pepiniana.

Radix Alkannae rubrae spuriae.

Alfannawurzel. Rothe Ochsenzungen-
Wurzel.

Anchusa tinctoria L. Planta perennis Hispaniae et Galliae meridionalis.

Radix fere cylindracea, calamus scriptorium crassa, cortice saturate rubro, tinctorio, ligno albicante, sapore debili subdulci praedita.

Radix Allii. Knoblauch.

Allium sativum L. Planta perennis in hortis culta.

Bulbus subrotundus, constans quinque vel sex fasciculatim iunctis bulbulis, seu spicis, foris ex albo purpurascens, intus albus, carnosus, succulentus, odoris specifici, volatilis, gravis, saporis acris, subdulcis.

Radix

Radix Altheae. Altheewurzel. Eibische wurz.

Althaea officinalis L.

Radix constans ramis longis, digitum circiter parvum crassis, extus subgriseis, intus albis, in fibras secundum longitudinem facile dividendis, mucilagine subdulci repletis.

Radix Angelicae, s. Angelicae fativae, s. hortensis. Angelikwurzel. Brustwurzel.

Angelica Archangelica L. Planta biennis spontanea Norwegiae, Lapponiae, Helvetiae, nobis frequentissima in eliminatis ad Visurgim; in hortis culta.

Radix magna, crassa, fibrosa, succulenta, extus e flavo rubens et rugosa, intus albida cum punctis flavis, odore fragrante, aromatico, decocta nonnihil moschato, sapore initio aromatico dulci, deinde amaro, subacri, non ingrato, praedita.

Radix Ari, s. Aronis. Aronswurzel. Zehrwurzel. Deutscher Ingber.

Arum maculatum L. Planta perennis Germaniae, in locis nemorosis frequens.

Radix tuberosa subrotunda, digitum crassa, extus pallide fusca, intus alba, odoris fere nullius, saporis, si recens, penetrantis, acris et urentis, ficcata, acedine orbata, farinosi.

Radix Aristolochiae rotundae, f. verae. Runde Osterlucey: Wurzel.

Aristolochia rotunda L. *Planta perennis Europae meridionalis.*

Radix tuberosa, subglobosa, ponderosa, pollicem crassa, extus fusca, vel cinerea et rugosa, intus albidula, recens odoris nonnihil volatilis, saporis amaro-aromatici.

Radix Armoraciae, f. Raphani rustici. Meerrettig.

Cochlearia Armoracia L. *Planta perennis palustris Europae australis, apud nos plerumque culta.*

Radix ramosa, cylindracea, longa, unum vel alterum pollicem crassa, extus fusca, intus alba, recens succulenta, odoris et saporis fortis, volatilis, acris, pungentis.

Radix Arnicae. Wohlverleihwurzel. Gallkrautwurzel.

Arnica montana L.

Radix lignosa, fibrosa, inaequalis, calamus scriptorium crassa, foris intense fusca, intus alba, odoris gravis, saporis acris, aromatici.

Radix Asari. Haselwurz. Mausohr.
Asarum Europaeum L.

Radix

Radix tennis, fibrosa, ex cinereo fusca, vel grisea, odoris gravis, subaromatici, Valerianae quodammodo similis, saporis nauseosi, acris, amaricantis.

Radix Bardanae. Klettenwurzel.

Arctium Lappa L. *Planta biennis in Germania frequentissima.*

Radix perpendicularis, crassa, levis, extus cortice nigricante vestita, intus alba, substantiae spongiosae, saporis ex acri subdulcis.

Radix Belladonnae. Belladonnawurzel. Tödlicher Nachtschatten.

Atropa Belladonna L.

Radix ramosa, unum vel alterum pollicem crassa, extus e cinereo flavescens, intus alba, mollis, recens odoris narcotici, subfoetidi, ingrati, saporis subdulcis, nonnihil adstringentis.

Radix Bryoniae. Zaunrübe. Gichtrübe.

Bryonia alba L., *Bryonia dioica* Jacquini.
Planta perennis Germaniae

Radix fusiformis, magna, brachium et ultra crassa, extus flava, intus alba, recens succo tenui lacteo scatans, atque odore subfoetido, sapore amaro-acri, urente praedita; mitior autem siccata.

Radix Calami aromatici, s. Acori veri. Calmuswurzel.

Acorus Calamus L. *Planta perennis palustris Germaniae.*

Radix longa, geniculata, inferne fibrosa, spongiosa, digitum crassa, foris subrubra, intus albida, odoris balsamici grati, saporis amaro-aromatici.

Radix Caricis arenariae, f. Graminis rubri. Sandriedgras: Wurzel.

Deutsche Sassa-parille.

Carex arenaria L. Gramen perenne in arenosis Germaniae frequens.

Radix repens, articulata, pennam columbinam crassa, extus subfusca, intus alba, farinosa, recens odoris terebinthinei, saporis amaro-resinosi.

Radix Carlinae, f. Cardopatiæ. Eberwurzel.

Carlina acaulis L. Planta perennis alpina Helvetiæ et Germaniæ, in Sudetibus frequens.

Radix ramosa, fibrosa, rugosa, et in superficie corrofa, digitum crassa, extus subfusca, intus pallida, odoris subaromatici, saporis subdulcis, amaro-acris.

Radix Caryophyllatæ. Nelkenwurzel. Benediktenwurzel.

Geum urbanum L. Planta perennis Germaniæ.

Radix fibrosa, extus subfusca, intus rubella, aut flavescens, recens odoris aromatici caryophyllacei, saporis amaro-aromatici, austeri.

Radix

**Radix Chelidonii majoris. Große
Schöllkrautwurzel.**

Chelidonium majus L. Planta perennis Germaniae, ad muros et sepes frequens.

Radix ramosa, fibrosa, pollicem et ultra crassa, recens subfusca, succo croceo acri scatens, ficcata nigrescens, odore ingrato, sapore amaro-acri, praedita.

Radix Chinae, s. Chinae ponderosae. Chinawurzel. Pockenwurzel.

Smilax China L. Frutex utriusque Indiae.

Radix nodosa, lignosa, magna, epidermide fuscorubente vestita, intus pallide rubicunda, saporis subdulcis, unctuosus.

Radix Cichorii, s. Cichorii filvestris. Cichorienwurzel. Wegwartswurzel.

Cichorium Intybus L. Planta biennis Germaniae, ad vias frequens, in hortis culta.

Radix longa, ramosa, pollicem crassa, extus subfusca, intus alba, recens succo lacteo, amaro-dulci, praedita.

**Radix Columbo, s. Colombae.
Columbowurzel.**

Planta Africana, nondum satis cognita, forsitan Bryoniae.

Radix lignosa, in taleolas, a semi ad tres pollices latas, plerumque perforatas, transversim secta, extus subfusca, intus ex viridi lutea, odoris balsamici, cumminacei, saporis amaro-aromatici, ingrati.

Radix Contrajervae. Contrajerva-
wurzel. Giftmurzel.

Dorstenia Contrajerva L. *Dorstenia Houstoni*. *Planta perennis Peruviana.*

Radix fibrosa, capitulo oblongo, tenui, digitum plerumque crassa, extus rufa, intus pallida, odoris nonnihil aromatici, saporis subacris, amaro-adstringentis.

Radix Curcumae. Curcuma. Gelbwurzel.

Curcuma longa L. *Amomum Curcuma Jacquini*. *Planta perennis Indiae orientalis.*

Radix oblonga, aut rotunda, rugosa, ponderosa, coloris extus pallide lutei, intus profunde flavi, crocei, vel aurantiaci, in fractura nitens, odoris subfragrantis, quasi unguinosi, saporis amaro-aromatici, subacris.

Radix Dauci, s. Dauci sativi. Car-
rotten. Gelbe Wurzel. Möhren.

Daucus Carota L. *Planta biennis Germaniae, hortensis.*

Radix fusiformis, crassa, aurantiaca, vel ex flavo rubens, succo grate dulci repleta.

Radix

Radix Dictamni albi, *f.* Fraxinellae. Weißer Diptam. Eschenwurzel.

Dictamnus albus L. Planta perennis in montosis Germaniae, praesertim meridionalis.

Cortex radiceis crassae, lignosae, convolutus, crassitudine circiter digiti dimidii, coloris, si recens, pallide lutei, ficcatus albidus, odoris, si recens, gravis, hircini, saporis, et ficcati corticis, subacris, amaricantis.

Radix Enulae, *f.* Helenii. Mantelwurzel.

Inula Helenium L. Planta perennis montana Helvetiae et Germaniae.

Radix ramosa, carnosae, pollicem crassa, recens extus fusca, ficcata glauca, vel grisea, intus albida, odoris, si recens, subaromatici, camphoracei, ficcata violacei, saporis, si recens, initio subrancidi, glutinosi, dein amari, subaromatici, pungentis.

Radix Filicis. Farnkrautwurzel.

Polypodium Filix Mas L. Planta perennis, in silvis Germaniae frequens.

Radix oblonga, digitum circiter crassa, obessa undique bulbis oblongo-ovatis, incurvatis, approximatis, nigricantibus, atque squamis emarcidis, ferrugineis. Color externus pallide viridis ficcatione transit in subrufescentem. Siccata odoris est terrestris, non nihil nauseosi, saporis primo subdulcis, dein amaricantis, subadstringentis.

Radix Galangae, f. Galangae minoris. Galgant. Kleine Galgantwurzel.

Maranta Galanga L. f. Alpinia Galanga Swartzii. *Planta perennis Indiae orientalis.*

Radix ramosa, tuberosa, nodosa, dura, in particulas digitum circiter longas dissecta, extus intusque rufescens, odoris, praecipue dum contunditur, fragrantis aromatici, saporis fervidi, acris, subamari, subadstringentis.

Radix Gentianae, f. Gentianae rubrae. Genzianwurzel. Rother Enzian.

Gentiana lutea L. *Planta perennis alpina.*

Radix pedem unum alterumve longa, cylindracea, annulata, nonnihil rugosa, spongiosa, tenax, pollicem unum, vel duos, crassa, cortice fusco vestita, intus aurantiaca, saporis amarissimi.

Radix Graminis, f. Graminis albi. Graswurzel. Quefen.

Triticum repens L. *Gramen perenne Germaniae, agros obsidens.*

Radix subramosa, repens, geniculata, geniculis fibrosis, pennam corvinam crassa, ex albo flavescent, succo dulci repleta.

Radix Hellebori nigri veri, f. Radix Melampodii. Schwarze Nieferwurzel. Christwurz.

Helleborus

Helleborus niger L. *Planta perennis alpina, in hortis medicis culta.*

Radix fibrosa, capite subrotundo, crassitie Nucem moschatam aequans, fibrillis copiosis, longis teretibus, in annosioribus contortiplicatis, extus nigrescentibus, intus albidis, odoris ingrati, ficcatione debilioris, saporis primo amaricantis, dein acris, nauseosi, narcotici.

Radix Jalappae, s. Gialappae, s. Mechoacannae nigrae. Sa-
lappenwurz.

Convolvulus Jalappa L.? *Planta perennis Americae australis.*

Radix plerumque in orbiculos, vel in duas partes, longitudinaliter secta, figurae variae, rugosa, compacta, ponderosa, resinosa, coloris extus e fusco nigricantis, intus obscure grisei, striis nigris variegata, pulverata griseo-flavescent, odore et sapore acris, ingrato, nauseoso notabilis.

Radix Ipecacuanhae, s. Ipecacuan-
nae. Brechwurzel. Ruhrwurzel.

Psychotria emetica L. *Planta perennis Americana, in regno Mexicano praesertim frequens.*

Radix flexuosa, sulcis annulisque notata, digitum circiter longa, calamus minorem crassa, dura, fragilis, constans cuticula cinerea, cortice albicante, odoris mucidi, saporis amaro-acris, nauseosi, et parte interiore lignea, subflava, insipida.

Radix

**Radix Iridis, f. Ireos Florenti-
nae.** Violeuwurzel. Florentinische Veil-
chenwurzel.

*Iris Florentina L. Planta perennis Italiae,
in hortis culta.*

Radix tuberosa, nodosa, compacta, ponderosa,
pollicem crassa, resecto cortice fulvo, alba, punctis
subfuscis notata, odore grato Violae odoratae, sapor-
e subacri, subamaro, praedita.

**Radix Lapathi acuti, f. Oxyla-
pathi.** Grindwurzel.

*Rumex acutus L. Planta perennis German-
niae, ad fossas frequens.*

Radix ramosa, cylindracea, longa, superne pol-
licem et ultra crassa, foris fusca, intus flavescens,
masticata salivam croceam reddens, atque saporis ama-
ro-acris, subadstringentis.

Radix Levistici, f. Ligustici. Lieb-
stöckelwurzel.

*Ligusticum Levisticum L. Planta perenni-
s alpina, in hortis culta.*

Radix praelonga, crassa, racemosa, carnosae, fo-
ris obscure flava, intus alba, in medio subflava, odo-
ris specifici, gravis, saporis subdulcis, acris, aroma-
tici, ingrati.

**Radix Liquiritiae, f. Glycyrrhi-
zae.** Süßholz.

Glycyrr

Glycyrrhiza glabra L. *Planta perennis Europa meridionalis.*

Glycyrrhiza echinata L. *Planta perennis Russiae meridionalis.*

Radix praelonga, cylindracea, lignea, rugosa, tenax, digitum circiter crassa, extus e cinereo fusca, intus dilute flava, transversim secta radiis vasisque succosis instructa, saporis primo dulcis, deinde non nihil amaricantis.

Radix Pimpinellae albae, s. Pimpinellae nostratis. Weiße Pimpinellwurzel. Bibernellwurzel.

Pimpinella saxifraga L. *Planta perennis Germaniae.*

Radix fibrosa, dura, spithamam longa, digitum minorem crassa, extus flavo-cinerea, intus albida, punctulisque resinosis et medulla lignosa conspicua, odoris, si recens, volatilis, saporis amaricantis, acris, pungentis.

Radix Polygalae amarae. Bittere Kreuzblumenwurzel.

Polygala amara L. *Planta perennis montana Germaniae et Galliae meridionalis.*

Radix gracilis, racemosa, fibrillis multis, extus flavo-cinereis, intus albidis instructa, saporis subdulcis, amaricantis, nonnihil balsamici.

Radix

**Radix Polypodii, f. Filiculae
dulcis. Engelsfuß.**

*Polypodium vulgare L. Filix in silvis Germania
maniae frequens.*

Radix cylindracea, ramosa, dentato-articulata,
pennam anserinam crassa, tenax, extus fusca, intus
sublutescens, saporis initio dulcis, subadstringentis,
dein amaro-nauseosi.

**Radix Pyrethri. Bertramwurzel. Speis-
chelmurzel.**

*Anthemis Pyrethrum L. Planta perennis
Asiae et Africae, ad oras Maris mediterranei indige-
na, nuper in Germania culta.*

Radix cylindracea, rugosa, tenax, digitos aliquot
longa, digitum minorem crassa, fibrillis rarioribus ob-
sita, extus subfusca, intus albida, saporis peracris,
urentis.

**Radix Rhabarbari, f. Rhei. Rha-
barber.**

*Species Rhei, an Rheum palmatum L.?
Planta perennis Chinesis. Rheum palmatum col-
tur in Anglia, Gallia, Suecia, Germania.*

Segmenta longitudinalia, aut frusta transversalia,
radicis decorticatae solida, spongiosa, levia, extus e
luteo aut croceo rubentia, intus iisdem striis colo-
rata, vel colore albido variegato conspicua, salivam
flavedine tingentia, odoris et saporis specifici, fortis,
ingrati, nauseam moventis.

Rhabar-

Rhabarbarum Russicum, itinere terrestri ex China allatum, optimum est, Indico, s. Hollandico, itinere marino advecto, praeferendum.

Radix Rubiae Tinctorum. Färbers
röthe. Krapp.

Rubia Tinctorum L. Planta perennis Europae mediae, frequenter culta.

Radix repens, longa, fibris lignosis, calamus scriptorium crassis, ex trunculo nodoso oriundis, instructa, extus intusque e fusco rubra, saporis subamari, nonnihil ficcantis et adstringentis.

Radix Salep, s. Saleb, s. Salap.

Salebwurzel. Salapwurzel.

Orchis Morio et Orchis mascula L.

Plantae perennes pratenses Orientis, nec non Europae.

Radices tuberosae, oblongae, durae, ponderosae, magnitudine Fabae minoris ad magnitudinem Amygdalae, subpellucidae, ex subfusco cinereae, et e toto mucilagineae. Praestant ex China, Syria et Persia, filo gossypino transactae, allatae.

Radix Saponariae, s. Saponariae

rubrae. Seifenkrautwurzel. Rothe

Seifenwurzel.

Saponaria officinalis L.

Radix cylindracea, longitudine duorum vel trium pedum, crassitie digiti minimi, geniculata, superne
ramos

ramosa, fibrosa, solida, epidermide fulva vel spadicea, medulla flavescente, saporis subdulcis, glutinosi, amaricantis, subacris; cum Aqua decocta et agitata instar Saponis spumescit.

Radix Sarsaparillae, f. Saffaparillae. Sarsaparillwurzel. Cassaparille.

Smilax Sarsaparilla L. *Planta perennis Americana, frequens in Mexico et Brasilia.*

Radicis repentis, pollicem crassae, rami flexuosi, tenaces, fragiles, subrugosi, farinacei, aliquot pedes longi, calamus scriptorium crassi, foris fusci, intus albi, saporis submucilaginei, quodammodo amaricantis.

Radix Scillae, f. Squillae. Meerzwiebel.

Scilla maritima L. *Planta perennis, ad oras Maris mediterranei frequenter crescens.*

Bulbus pyriformis, ponderosus, magnitudine pugni et ultra, constans squamis externis subrubris, tenuibus, membranaceis, lineatis, exsuccis, internis autem albidis, carnosus, in statu recenti friabilibus, succo viscoso, peracri, nauseoso turgidis, lenta siccatione tenacioribus, subacribus, peramaris.

Radix Scorzonerae. Scorzonermurzel. Wilde Scorzoner. Nattermurzel.

Scorzonera humilis et Scorzonera Hispanica L. *Plantae perennes Europae meridionalis.*

Radix

Radix longa, a calamo scriptorio usque ad digitum minimum crassa, lignosa, fragilis, extus ferruginea, intus alba, recens succo lacteo saporis subamari gaudens.

Altera species, in hortis culinaribus culta, pollicem crassa, carnosae, recens extus nigricans, intus alba, succo lacteo subdulci praedita, ficcata vero, epidermide orbata, fulva et fere insipida.

Radix Senegae, s. Senekae, s. Polygalae Virginianae. Senegawurzel. Klapperschlangenwurzel.

Polygala Senega L. Planta perennis Virginiae et Pensilvaniae.

Radix superne nodosa, inferne, in ramos incurvatos, longitudine digiti, crassitie calami scriptorii, desinens, extus e cinereo flavescens, intus alba, saporis, initio farinacei, dein subacidi, subamari, acris, pungentis.

Radix Serpentariae Virginianae. Virginische Schlangenwurzel.

Aristolochia Serpentaria L. Planta perennis Virginiae.

Radix, constans fibrillis numerosis, ex trunco communi erumpentibus, complicatis, colore ex fusco viridescente, intus pallide luteo, odore fragrante, ad Camphoram et Valerianam accedente, sapore amaricante, pungente, praeditis.

Radix Taraxaci, f. Dentis Leonis. Löwenzahnwurzel.

Leontodon Taraxacum L.

Radix fusiformis, fibrosa, nonnunquam ramosa, spithamam longa, digitum minorem crassa, extus fusca, intus alba, saporis ex dulci amaricantis, recens succo lactescente turgida.

Radix Tormentillae. Tormentillwurzel.

Tormentilla erecta L. *Planta perennis*

Germaniae.

Radix brevis, tuberoso-nodosa, contorta, solida, fibrillis numerosis obsessa digitum crassa, foris e rubro fusca, intus dilute rosea, saporis styptici, austeri, subaromatici.

Radix Valerianae silvestris, f. minoris. Baldrianwurzel.

Valeriana officinalis L. *Planta perennis*

Germaniae, in montosis colligenda.

Radix fibrosa, capitulo oblongo, quodammodo truncato, fibris numerosis, longis, tenacibus, subfuscis, intus albidis, pennam corvinam crassis, instructa, odoris specifici, hircini, gravis, penetrantis, subnauseosi, saporis amaro-acris, subadstringentis.

Radix Zedoariae, f. Zedoariae longae. Zedoarwurzel. Langer Zittwer.

Kaempferia rotunda L. f. *Amomum Zedoaria Bergii.* *Planta perennis Indiae orientalis.*

Radix

Radix tuberosa, ponderosa, in segmenta rotunda longaque dissecta, crassitie digiti minimi, foris cinerea, intus subfusca, odore fragrante camphoraceo praedita, sapore acri, amaricante.

Radix Zingiberis albi. Ingber. Weis
ser Ingber.

Amomum Zingiber L. Planta perennis Indiae orientalis.

Radicis segmenta ficcata, duos circiter digitos longa, pollicem et ultra crassa, tuberosa, articulata, rugosa, compacta, ponderosa, foris ex albo cinerea, intus albida, odoris aromatici grati, saporis acris, urentis.

Refina Guajaci nativa, vulgo Gummi Guajaci. Guajac-Harz.

Guajacum officinale L.

Refina ex arbore exsudans, in frustis magnis inaequalibus advecta, friabilis, in fractura nitens, subpellucida, ex fusco viridescens, prunis iniecta odoris peculiaris, non ingrati, saporis amaricantis, acris, pungentis.

Refina Pini, s. Refina communis.
Gemeines Harz.

Pinus silvestris et Pinus Abies L.

Refina ex cortice arboris exsudans, indurata, tenax, ex albo flava, seu aurantiaca, ardens odore ingrato.

Saccharum album. Weißer Zucker.
Hutzucker.

Saccharum officinarum L. *Gramen perenne palustre utriusque Indiae.*

Succus Arundinis dulcis a partibus heterogeneis liberatus, et in formam Salis concreti redactus.

Saccharum canthum album et flavum;
weiß und gelber Zuckerkant. Succus depuratus,
coctione inspissatus, super fila crystallifatus.

Saccharum Lactis. Milchzucker.
Bos Taurus L.

Sal essentiale Seri Lactis dulcis, constans crystallis parvis, semipellucidis, aegre solubilibus, coloris lactei, saporis debilis saccharini, et terrestri. Advenit praesertim ex Helvetia in frustis variae magnitudinis, supra crystallifatis, infra glabris, praestans venali pulverato, Saccharo communi inquinato.

Saccharum Saturni, s. Sal Saturni,
ni, s. Plumbum acetatum. Bleizucker. Bleisalz.

Sal medium metallicum, ponderosum, ex calcinato Plumbo et Acido Aceti, praesertim in Belgis, paratum, crystallis parvis nitentibus subpellucidis, albidis, conspicuum, in aëre farinescens, in Aqua et Spiritu Vini solubile, saporis dulcis adstringentis.

Sagapenum, vulg. Gummi Sagapenum. Sagapen. Sagapengummi.

Planta

Planta umbellata orientalis, nondum satis cognita; an Ferulae species?

Gummi-resina variae magnitudinis, tenax, fusca, granulis albis, subpellucidis, nitentibus, mixta, odoris ingrati alliacei, ad Asam foetidam accedentis, saporis amaro-acris, calidi, pungentis.

Sal Acetosellae. (*Oxalium*). Sauerflee-
salz.

Oxalis Acetosella, et Rumex Acetosa
L. *Plantae perennes Germaniae*

Sal nativum ex succo expresso et depurato plantae crySTALLIFICATIONE obtentum, constans Acido proprio, ex parte Alkali vegetabili iuncto, sapore valde acido praeditum, et aegre solubile. Sit purum, album, aut subfuscum, atque solutionem Terrae calcariae praecipitet.

Sal ammoniacum, s. armoniacum.
(*Ammonium muriaticum*). Salmiac.

Sal neutrum, constans Acido Salis et Alkali volatili, coloris albi, saporis acris, pungentis, ingrati, solubile in triplo Aquae fervidae, tritum cum Terra calcaria, aut Alkali fixo, odoris volatilis, igne fortiori sublimatur, vel totum avolat. *Brunsvicense, et Magdeburgense*, praestat crudo et impuro *Aegyptiaco*, ex fuligine stercoreum exustorum sublimato.

Sal Anglicum, s. amarum catharticum, s. Ebshamenfe. (*Magnesia vitriolata, s. sulphurica*). Bit-

tersalz. Englisches Laxirsalz.

Sal medium, constans Terra amara Acido vitriolico saturata, ex Aquis foteriis Ebshamenfibus, et ex Muria Salis marini, evaporando et crySTALLIFANDO paratum, coloris albi, saporis amari, solutum cum Alkali fixo *Magnesium albam* largiens. Depuratione indiget.

Sal culinare, s. commune. (*Natrum muriaticum*). Rochsalz. Küchensalz.

Sal neutrum, in officinis salinariis per evaporationem Muriae paratum, constans Acido Salis et Alkali minerali, coloris albi, saporis specifici salis, in Aquae fervidae triplo penitus solubile, in igne decrepitans.

Sal mirabile, s. Sal Brunsvicense.
(*Soda vitriolata, s. Natrum vitriolatum, s. Natrum sulphuricum crystallisatum*). Bunsdersalz. Braunschweigisches Salz.

Sal neutrum, ex Alkali minerali et Acido vitriolico compositum, album, subpellucidum, saporis primo refrigerantis, dein amari. *Sal mirabile* tritum cum Cineribus clavellatis Alkali non redolet; solutio affuso Argento soluto turbida Sal culinare prodit; ab admixto Alkali volatili aërato turbida cum colore albo, Magnesium, caeruleo Cuprum, flavo Ferrum manifestat, quod insuper nigredine ab affusa Tinctura Gallarum cognoscitur.

Sal Saidschützenfense, vulgo Sedlitzense. Böhmisches Bittersalz.
Sedlitzer Salz.

Salis Anglici analogon, sed depuratione non indigens, ideoque praeferendum, ex Aqua medicata Saidschützensi, evaporando et crySTALLIFANDO, obtinetur.

Sandaraca, s. Refina Juniperi.

Wacholderharz.

Juniperus communis et Juniperus oxycedrus
L. Arbor in oris Africae mediterraneis frequens.

Refina ex arbore exsudans, granulosa, subrotunda, pellucida, coloris citrini, vel albidus, saporis fere expers, prunis injecta odorem suavem spirans.

Sanguis Draconis. Drachenblut.

Calamus Rotang L. Frutex Indiae orientalis, et *Pterocarpus Draco* L.? Arbor Indiae orientalis.

Massa resinosa e fructibus exsudans iisque superinducta indurefcens, postea calore emollita in globulos magnitudine circiter Pruni redacta, friabilis, in fractura glabra, coloris obscure rubri, pulverata chermesini, nitidi, soluta saporis calidi, pungentis.

Sapo Hispanicus, s. Alicantinus.

Spanische Seife.

Coquendo Oleum Olivarum recens cum Sale minerali caustico paratus, albidus aut subflavescent, variegato Veneto praeferendus, solidus, cum Aqua et Spiritu Vini optime spumans, odoris et saporis oleoso-salsi, non ingrati, minimeque rancidi.

Scammonium Aleppense, *f.* Diagrydium. Scammonium von Aleppo.

Convolvulus Scammonia L. *Planta perennis orientalis, praesertim Syriae.*

Succus resinofus vulneratae radice, ficcatus, in massis majoribus adveetus spongiosis, levibus, coloris extus e cinereo flavescentis, intus e nigro grisei, odoris ingrati, saporis specifici, amaro-acris, nauseosi.

Semen Amomi, *f.* Piper Jamaicaense. Englisches Gewürz. Melkenpfeffer.

Myrtus Pimenta L. *Arbor Americana, in Mexico et Jamaica frequens.*

Baccae immaturae globosae, vel oblongae, umbilicatae, magnitudine Piperis nigri et ultra, semina duo hemisphaerica includentes, pericarpis rugosis cinctae coloris fusci, saporis et odoris quasi plurium aromatum unitorum: Caryophyllorum, Cinnamomi, Nucis moschatae.

Semen Anisi stellati, *f.* Badian. Sternanies.

Illicium anisatum L. *Frutex orientalis, praesertim Japonicus.*

Pericarpia stellata, coriacea, fusca, seminibus ovatis nitidis, intus albidis, instructa, odoris et saporis aromatico-dulcis, anisati, fortis.

Semen Anisi vulgaris. Anies.

Pimpinella

Pimpinella Anisum L. *Planta annua orientalis, in Europae variis regionibus, in Germania quoque, culta.*

Semina parva, oblonga, striata, ex viridi fusca, odoris fragrantis proprii, saporis subdulcis, aromatici.

Semen Cannabis. Hanffamen.

Cannabis sativa L. *Planta annua sativa Europae borealis.*

Nuces parvae, ovatae, glabrae, cuticula cinericea nucleum album subdulcem, oleosum, mucilaginem, includentes.

Semen Cardamomi minoris. Kleisne Cardamom.

Amomum Cardamomum L. *Planta perennis palustris Indiae orientalis.*

Pericarpia striata, sublutea, seminibus parvis multiformibus, extus subrufis, vel nigricantibus, intus albidis, instructa, odoris fortis, iucundi, saporis aromatico-acris, camphoracei.

Semen Carvi. Kümmel.

Carum Carvi L. *Planta perennis pratensis Germaniae.*

Semina fructus parvi ovato-oblongi, striati, bipartibilis oblonga, convexo-plana, coloris obscure fusci, odoris fragrantis, saporis calidi, aromatici, subamari.

Semen Cinae, s. Santonici. Burm.
samen, vulgo Zittwersamen.

Artemisia Santonica, et Artemisia Judaica
L. Fruticuli orientales, praesertim Persiae, Syriae,
Palaeestinae.

Semina parva, oblonga, ex flavo viridula, plerum-
que cauliculis florumque et foliorum particulis come-
mixta, odoris specifici, nauseosi, fortis, saporis amar-
ro-acris. Optima sunt Asiatica, praecipue Aleppensia.

Semen Coriandri. Coriander.

Coriandrum sativum L. Planta annua Euro-
pae australis, in hortis culta.

Semina fructus siccati parvi, globosi, striati, bi-
partibilis, hemisphaerica, concava, flavo-grisea, odor-
is et saporis subaromatici, haud ingrati.

Semen Cumini, s. Cymini. Römis-
cher Kümmel. Mutterkümmel.

Cuminum Cyminum L. Planta annua or-
ientalis, in Europa culta.

Semina fructus ovati, striati, bipartibilis, ovata,
convexo-plana, seminibus Carvi fere similia, at du-
plo longiora, ex cinereo flava, vel subfusca, odoris
aromatici fortis, saporis amaro-calidi.

Semen Cydoniorum. Quittensamen.
Quittenförner.

Pyrus Cydonia L. Arbor Cretensis, nobis
hortensis.

Semina

Semina oblongo-acuta, compressa, sub epidermide fusca medullam albam, valde mucilagineam, gerentia.

Semen Foeniculi. Fenchelsamen.

Anethum Foeniculum L. *Planta perennis Galliae meridionalis et Helvetiae, in hortis culta.*

Semina fructus parvi, subovati, compressi, striati, bipartibilis, subovata, convexo-plana, ex flavo viridia, odoris peculiaris grati, saporis aromatico-dulcis.

Semen Foeni Graeci. Bockshornsam.

Trigonella Foenum Graecum L. *Planta annua Europae meridionalis, in hortis medicis culta.*

Semina quadrangularia, compressa, dura, obscure lutea, valde mucilaginosa, odoris fortis, ad Melilotum accedentis, nauseosi, saporis amari, subaromatici.

Semen Hordei excorticatum, s. mundatum. Geschälter Gärsten. Gärstengraupe.

Hordeum vulgare, Wintergärsten, et *Hordeum hexastychon* L. Sommergärsten. *Gramina sativa in Germania frequentissima.*

Farinosum, album, submucilagineum, subdulce.

Semen Lini. Leinsamen.

Linum usitatissimum L. *Planta annua sativa Europae borealis.*

Semina

Semina parva, ovata, compressa, glabra, nitida, testa spadicea, carne alba, oleosa, mucilaginea, saporis ingrate dulcis, praedita.

Semen Lycopodii, vulgo Pulvis Lycopodii; et Sulphur Lycopodii. Streupulver. Bärlapppulver.

Lycopodium clavatum L. Muscus in silvis Germaniae frequens.

Semina e capsulis elastice dehiscentibus effusa, subtilissima, pallide flava, tactu pingua, digitis adhaerentia, aquae connubium respuentia, flammae admotam fulgurantia.

Semen Melonum. Melonenkörner.

Cucumis Melo L. Planta annua Tartarica, in hortis culta.

Semina oblonga, compressa, glabra, ex luteo albidum, carne alba, oleosa, dulci.

Semen Papaveris albi. Weißer Mohnsamen.

Papaver somniferum L. var. seminibus albis. Planta annua orientalis, in Germania culta.

Semina in capsula quavis numerosissima, minima, reniformia, nonnihil rugosa, alba, oleo dulci repleta.

Semen Petroselinum. Petersiliensamen.

Apium Petroselinum L. Planta biennis Sardiniae, nobis hortensis.

Semina

Semina fructus parvi, ovati, striati, bipartibilis, ovata, plana, obscure viridia, striis flavidis in latere convexo notata, odoris et saporis acris, amaro - aromatici.

Semen Phellandrii, *f.* Foeniculi aquatici. Wasserfenchelsamen.

Phellandrium aquaticum L. *Planta perennis palustris Germaniae, et in ducatu nostro in fossis frequentissima.*

Semina fructus ovati, laevis, perianthio et pistillis coronati, bipartibilis, ovata, convexo - plana, coloris ex flavo viridis, rufescentis, odoris aromatici gravis, saporis levistici, acris, subadstringentis.

Semen Psyllii. Glöhsamen.

Plantago Psyllium L. *Planta annua agrestis Germaniae.*

Plantago Cynops L. *Fruticulus Europae australis.*

Semina exigua oblonga, obscure fusca, valde mucilaginosi, saporis nauseoso - acris.

Semen Sabadillae, *f.* Sabadilli. Läusesamen.

Veratrum Sabadilla Retzii? *Planta perennis Mexicana.*

Semina oblongo - acuta, rugosa, compacta, nigricantia, intus albida, ingrate amara, acerrima, urentia, pericarpio membranaceo fusco tecta.

Semen

Semen Sinapeos nigrae. Schwarz
zer Senfsamen.

Sinapis nigra L. *Planta annua sativa Germaniae.*

Semina exigua, rotunda, nonnihil compressa, striis concentricis notata, e fusco nigricantia, saporis subamari, peracris.

Sevum, s. Sebum Vervecinum, s. Ovillum. Hammeltalg. Schaftalg.

Ovis Aries L.

Pinguedo recens, alba, ex capsulis adipalibus renum et omenti eliquata.

Soda. (*Natrum carbonicum*). Sode.

Soda Hispanica, s. Alicantina, concretum e cinereo caerulefcens, ex combustis plantis maritimis ortum, elixando Alkali minerale fistens.

Soda Hungarica, nativa, in lacubus sponte exsiccatis copiose generata, depuratione Alkali minerale largiens.

Spathum ponderosum. (*Baryta sulphurica nativa*). Schwerspath.

Minera ponderosa, alba, vel subfusca, in metallifodinis Hercyniae, Saxoniae, cet. venas implens, constat Terra propria Acido Vitrioli nupta, in Aqua plane indissolubili, igne in pulverem grossiusculum nitentem diffiliante. Eligantur frustula alba, lamellosa, hete.

heterogeneis minus inquinata. Terra Spathi pura, aëre fixo solum saturata, in Anglia reperitur.

Sperma Ceti. (*Cetaceum*). Wallrath.

Phyfeter Macrocephalus L.

Liquor unguinosus animalis ventriculorum cerebri, macerando Lixivio alcalino diluto, exprimendo et lavando ab adipe oleosa separatus, in massam induratur albissimam, lamellosam, tactu pinguem, subfriabilem, subpellucidam, nitentem, in Spiritu Vini calido solubilem, odoris piscosi, haud ingrati, saporis oleosi, subdulcis.

Spongia marina. Meerschwamm. Badeschwamm.

Spongia officinalis L.

Zoophyton Maris rubri et mediterranei, leve, flexile, exigue foraminosum, bibulum, sublutescens.

Stannum. Jupiter. Zinn.

Metallum molle, ductile, coloris caeruleo-argentei, odoris sub frictione fere alliacei, cum Spiritu Nitri acido calcem albam, valde refractariam, exhibens. Optimum est *Moluccense*, dein *Cornwalliense*.

Stipites Dulcamarae. Bittersüßstengel.

Solanum Dulcamara L. Frutex scandens, in silvaticis paludosis Germaniae frequens.

Ramuli biennes vel triennes longi, calamum, vel digitum minimum, crassi, lignei, medullosi, cortice

tice ex flavo viridescente, vel ex cinere fusco, tecti, odoris si recentes narcotici, ingrati, saporis amaro - dulcis.

Strobuli, s. Coni Lupuli. Hopfen.

Humulus Lupulus L. Plantae dioicae perennis Germaniae foemina.

Amenta foeminea matura, ovato-oblonga, ex albo flavescentia, odoris gravis, aromatici, saporis amaro - calidi, haud ingrati.

Storax, s. Styrax liquidus, s. Liquidambar, s. Ambra liquida.

Blüssiger Storax.

Liquidambar styraciflua L. Arbor regionum calidarum Americae septentrionalis.

Balsamus nativus spissus, coloris ex rubro nigrescentis, odoris fragrantis, saporis calidi acris.

Styrax in granis, s. Calamita. Rohrstorax. Storax in Körnern, oder Sähren.

Styrax officinalis L. Arbor Orientis et insularum Archipelagi.

Refina ex cortice fauciato stillans, granulosa, magnitudinis variae, plerumque in massam coalescens facile liquefcentem, luteam, vel fuscam, odoris, si accenditur, suavissime balsamici.

Genuinus raro occurrit; sufficiat ergo asservare *Styracem liquidum.*

Suc

Succinum. Bernstein. Agtstein.

Bitumen variae magnitudinis et formae, durum, fragile, in Aqua subfidens, electricum, pellucidum, coloris citrini; aut profunde flavi, insecta nonnunquam includens, combustum odore specifico in carbonem atrum abiens, Acidum concretum via sicca largiens; praesertim in oris Maris Baltici reperiendum.

Succus Liquiritiae, s. Glycyrrhizae. Lakritzensaft. Brustfuchen.

Glycyrrhiza glabra, et Glycyrrhiza echinata L.

Succus radicis recentis, coctione in Aqua ad consistentiam Extracti ficci paratus, in massis Lauri foliis obvolutis ex Hispania et Sicilia advectus, coloris nigri, in fractura nitentis, saporis dulcis, non ingrati.

Sulphur, s. Sulphur citrinum, s. vulgare. Schwefel.

Substantia nativa, vel artefacta, solida, friabilis, citrina, leni igne liquefscens colore rubro, ardens flamma caerulea vapore forti suffocante, comburendo, Oxygenio nupta, *Acidum Sulphuris*, seu *Vitrioli*, exhibens.

Sulphur, leni calore in vasis clausis sublimatione in pulverem citrinum conversum, dat *Flores Sulphuris*, Schwefelblumen.

Syrupus saccharinus communis. Gemeiner Syrup.

Saccharum officinarum L.

H. HAYERER Succus

STAATS-
BIBLIOTHEK
MÜNCHEN

Succus Sacchari crySTALLISATIONEM respuens res-
fiduus, viscidus, impurus, coloris ex nigro fusci,
saporis subdulcis.

Tacamahaca vera. Bahre Tacama-
hac. Tacamahac in Schalen.

Fagara octandra L. Arbor Americae cali-
dioris, praesertim insulae Curacao, etiam indigena
insulae Madagascar.

Refina e cortice arboris fauciatae exsudans, in pe-
ricarpiis cucurbitinis collecta, mollis, subpinguis, sub-
pellucida, lutescens, odoris grati, ad Lavendulam,
vel Ambram, accedentis, saporis aromatici, amarican-
tis. Raro hodie occurrit; sufficiat ergo:

Tacamahaca vulgaris, gemeiner Ta-
camahac, in granis vel frustulis subpellucidis allata,
coloris ex albo fusci, subviridis, odoris minus grati.


Tartarus crudus. Weinstein. Wein-
steinsalz.

Sal acidum ex parte Alkali nuptum, parietibus
dolorum, vino iuniori acidulo repletorum, adhae-
rens; depuratum in officinis Gallicis *Crystallus Tar-*
tari, Weinstein-Crystallen, exhibet.

Terebinthina communis. Gemeiner
Terpenthin.

Pinus sylvestris L.

Balsamus nativus ex trunco fauciato arboris stil-
lans, viscidus, subpellucidus, ex cinereo flavus, odo-
ris



ris specifici gravis, resinosi, saporis amaricantis, pungentis.

Terebinthina Laricina, f. Veneta. Benedischer Terpenthin.

Pinus Larix L. Arbor Europae meridionalis.

Balsamus natus, sponte, vel ex trunco arboris terebrato, stillans, subviscidus, pellucidus, pallide luteus, odoris fragrantis, saporis amaricantis, pungentis, ingrati.

Turiones Pini, vulgo Strobuli, f. Coni Pini. Sichtenknospen. Kiefernprossen.

Pinus silvestris L.

Gemmae cylindratae nondum exclusae et apertae, extus spadiceae, intus virides, resina divites, odoris grati, saporis balsamici amari.

Vinum. Wein.

Vitis vinifera L. Frutex in vineis cultus.

Succus Baccarum Vitis viniferae, rite peracta fermentatione vinosa, satis diu in doliis asservatus.

Usui pharmaceutico inserviunt *Vinum Rhenum, Vinum Gallicum acidulum album et rubrum, et Vinum Hispanicum, praecipue Malacense.*

Viride Aeris, f. Aerugo. (*Cuprum acetatum*). Spangrün. Grünspan.

Calx Cupri Acido aëreo saturata, ex Cupro mediantibus vinaceis corroso, e caeruleo viridescens, sa-

poris acidi, nauseosi, acris, corrosivi. Praestat Mons-
pelienſe.

Viscus quernus, s. Lignum Visci.

Weisse Mistel. Buchmistel. Mistelholz.

Viscum album L. Fruticulus parasiticus Quer-
cus, Fagi, Pini, aliarumque arborum.

Ramuli iuniores lignosi, digitum minimum craſſi,
una cum foliis ovatis coriaceis collecti, ex flavo fu-

Zincum. Zink. Spiauter.

Metallum tenax, ex albo caerulescens, vi ignis
fusile, flamma subviridi fumoque albo odoris allia-
cei flagrans, in calcem albam levissimam sublimatur.
Praeferendum est *Chinense Goslariensi.*

PRAE

PRAEPARATA ET COMPOSITA.

Retortae collum adhaere cum
Aqua destillatae Locis quatuor.
Tunc adaptato recipiente et iuncturis firmatis. Ad des-
tillationem ad firmum. Servetur in lagena vitrea.
Nota. Sic Caput peracidi, odoris penetrantis, grate-
que acidi, neque solutionem Terrae ponderosae ac-
cetatae, nec Argenti vitriolici turbat.

Acetum destillatum.

Acetum crudum, per retortam vitream puri-
ficetur & destillet a retorta vitrea, nec a retorta capta, sicut
uo puro obducta, nec a retorta capta, nec a retorta capta.

PRÆPARATA

ET

COMPOSITA

3 H

PRÆ

(104)

Acetum concentratum.

(*Loco Aceti per frigus concentrati*).

Rec. Alkali vegetabilis depurati aëratı, Uncias
sedecim,

Aceti destillati, quantum sufficit ad perfectam
saturationem.

Evaporent ad Uncias quadraginta, quibus in retor-
tam vitream immıssis adde

Olei Vitrioli optimi, Libram unam,

Aquae fontanae Unciis octo dilutam.

Retortae collum ablue cum

Aquae destillatae Unciis quatuor.

Tunc adaptato recipiente et juncturis munitis fiat de-
stillatio ad siccum. Servetur in lagena vitrea.

Nota. Sit saporis peracidi, odoris penetrantis grate-
que acidi; neque solutionem Terrae ponderosae a-
cetatae, nec Argenti vitriolici turbet.

Acetum destillatum.

Acetum crudum, super pulvere Carbonis puri,
destillet e retorta vitrea, aut e cucurbita cuprea, Stan-
no puro obducta, munitaque capitello, una cum ca-

nali refrigeratorio e Stanno puro parato, quamdiu prodit limpidum, et ab empyreumate liberum.

Nota. Sit limpidum, odoris et saporis acidi grati; Sulphur ex Hepate Sulphuris volatili colore fusco non praecipitet, neque solutionem Sacchari Saturni turbidam reddat.

Acetum Lithargyri.

Rec. Lithargyri pulverati Libras duas,
Aceti Vini optimi, Libras decem.

Coque in lebete plumbeo, moderato calore, bacillo ligneo saepius agitando, usque ad saturationem. Filtra per chartam, et serva in vase vitreo.

Acetum prophylacticum, s. bezoardicum.

(*Acetum aromaticum*).

Rec. Herbae Absinthii vulgaris,
Roris marini,
Salviae,
Menthae piperitae,
singulorum Uncias duas,
Corticis Cassiae Cinnamomeae, Unciam dimidiam,
Caryophyllorum,
Nucum moschatarum,
singulorum Drachmas duas,
Aceti destillati, Libras octo.

Post sufficientem macerationem in vase vitreo supra arenam tepidam, exprime et cola.

Ace

Acetum Rosarum.

Rec. Florum Rosarum rubrarum, Uncias tres,
Aceti destillati, Libras duas.

Post macerationem tepidam in lagena vitrea, cola
et ferva.

Acetum Rubi Idaei.

Rec. Fructuum recentium Rubi Idaei, Libram
unam,

Aceti destillati, Libras duas.

Seponantur in lagena vitrea per mensem. Dein
de colentur et ferventur.

Acetum Rutae.

Rec. Herbae Rutae, Uncias tres,
Aceti destillati, Libras duas.

Macera loco tepido et cola.

Nota. Aceta Rosarum, Rubi Idaei, et Rutae a cor-
ruptione defenduntur addita Alcoholis Vini parte
octava.

Acetum scilliticum.

Rec. Radicum Scillae siccatarum, Uncias duas.

Minutim scillis affundantur

Aceti Vini, Librae duae.

Macerentur leni calore. Liquor leviter expressus
fervetur.

Acidum phosphoricum.

Rec. Cornu Cervi, aut aliorum Ossium, ad albe-
dinem utorum, Libras tres.

Subtilissime pulveratis adde

Olei Vitrioli optimi, Libras duas,

Aquae communis Libris quindecim dilutas. Ebulliant leniter per horam in lebetes stanneo sub agitatione continua. Cola cum expressione, et liquorem ad Mellis spissitudinem evapora. Residuum in Aqua iterum solutum et colatum cum

Alcali volatili sicco

perfecte fatura. Liquidum filtratum, et ad siccum evaporatum, praebet **Sal Ammoniacum phosphoricum**; e quo, retortae vitreae satis amplae, aut vasi porcellaneo profundo, commisso, Ammoniacum leni calore expellatur. Postquam spumescere cessavit, Acidum phosphoricum restans, igne modice aucto, adhuc per aliquot temporis momenta lente fluens detineatur; refrigeratum in Triplo Aquae destillatae solvatur, et liquor filtratus limpidus fervetur.

Nota. Acidum phosphoricum cum triplo Aquae dilutum coloris et odoris expers, saporis acidi grati, sit liberum a Terra ossea, Selenite, atque Alcali minerali phosphorato, ideoque ab Alcohole Vini turbidum non fiat; neque Acido vitriolico sit inquinatum, quod detegitur, addendo Acido phosphorico cum Aquae partibus quadraginta diluto Terram calcariam acido-nitricam, aut Ferrum salitum, quamdiu praecipitatum obtinetur, quo filtrato liquor addita Terra ponderosa salita limpidus persistat.

Acidum phosphoricum purum et genuinum et ex ipso Phosphoro, at immenso pretio, obtinetur.

Aethiops antimonialis.

(*Hydrargyrum stibiato-sulphuratum*).

Rec. Antimonii crudi laevigati, Uncias duas,
Mercurii vivi puri, Unciam unam.

Misceantur

Misceantur et terantur, donec Mercurius penitus dispareat, et massa in pulverem aequaliter nigrum abeat.

Aethiops martialis.

(*Ferrum oxydulatum nigrum*).

Rec. Croci Martis aperitivi, quantum lubet.

Irrora

Olei Olivarum quantitate sufficiente, ut fiat pulvis humidiusculus, qui in retortam vitream immissus, ad siccum destillet, igne ad pulveris fere excandescentiam aucto. Residuum nigerrimi coloris tere, et vitro obturato serva.

Nota. Sit Magneti obediens, solubilis in Acidis, Spiritum Salis Ammoniaci colore caeruleo non tingens.

Aethiops mineralis.

(*Hydrargyrum sulphuratum nigrum*).

Rec. Mercurii vivi puri,

Florum Sulphuris, Partes aequales.

Misceantur sedulo in mortario vitreo, donec Mercurius Sulphure mixtus plane dispareat, et fiat pulvis aequaliter niger.

Alcali causticum.

(*Kali causticum siccum*).

Liquor Alcali caustici evaporet in vase ferreo, donec gutta, in metallum frigidum demissa, perfecte concreascit; tunc effunde, et frustula diffracta statim in vase rite obturato serva.

Nota. Aquam Calcis non turbet, solubilis sit in Acidis cum aestu, absque effervescencia, valdeque urens, cutem brevi erodens.

Alcali

Alcali volatile ficcum.*(Ammonium carbonicum).*

Rec. Salis Ammoniaci pulverati et ficcati, Libram
unam,
Cretae Colonienfis pulveratae et ficcatae, Li-
bras duas.

Mixta in retortam collo amplo immitte. Adapta-
to recipiente, et juncturis optime clausis, sublimatio-
nem institue, igne ab initio leni, sub finem aucto.
Sublimatum in vase bene obturato serva.

Nota. Cretae quantitate justo minori adhibita, Sal
Ammoniacum volatile inquinans proditur faturatio-
ne cum Acido Nitri, admixta solutione Argenti, un-
de turbida fit mixtura, aut praecipitatur.

Alcohol Aceti.*(Acidum aceticum).*

Rec. Tartari vitriolati pulverati, Libram unam,
Olei Vitrioli optimi, Libram dimidiam,
Aquae communis Unciis octodecim
dilutam. Mixta evaporent ad ficcum. Admisce
Terrae foliatae Tartari,
leni calore ficcatae, Uncias novem.

Immitte in retortam vitream, et applicato vase re-
cipiente, atque juncturis optime clausis, ex arena calo-
re moderato fiat destillatio. Liquorem obtentum in
vase vitreo clauso serva.

Nota. Sit saporis valde acidus, odoris penetrantis, aci-
dique grati. Acido Vitrioli, aut Salis, inquinatum
esse, reagentia sub Aceto concentrato allegata pro-
bant.

Alumen

Alumen ustum.

Alumen crudum uratur in crucibulo amplo, aut in olla fictili non vitreata, fatis capaci, donec pernitus in massam spongiosam levem abeat.

Ammoniacum depuratum.

Ammoniacum electum per tempestatem gelidam terendo redigatur in pulverem, ab adhaerentibus quisquiliis ope cribri setacei fecernendum.

Pari modo depurantur

Afa foetida,
Galbanum,
Sagapenum.

Antimonium crudum praeparatum.

(*Stibium sulphuratum nigrum laevigatum*).

Antimonium crudum electum in mortario ferreo contritum, super lapidem expolitum et durum, affusa paululum Aqua, laevigetur, ut fiat pollen subtilissimum, loco tepido siccandum.

Antimonium diaphoreticum ablutum.

(*Stibium oxydatum album ablutum*).

Antimonio diaphoretico non abluto affunde Aquae fervidae Decuplum, agita, ut solvantur Salia illi adhaerentia; instilla

Spiritus Vitrioli quantum fatis, ut saturetur Alkali, partem Antimonii regulinam solutam in se continens. Pulverem album in fundo vasis collectum perfecte

fecte ablue, et affusa Aquâ alia, a parte crassiori decan-
thando libera, sicca et serva.

Antimonium diaphoreticum non ablutum.

(*Stibium oxidatum album non ablutum*).

Rec, Antimonii crudi, Libras quatuor,

Nitri depurati, Libras decem.

Pulverata et mixta injiciantur successive in cruci-
bulum amplum et leviter candens; partem Antimonii
regulinam, lateribus crucibuli superioribus adhaeren-
tem, sollicitè immiscendo. Detonatione peracta massa
adhuc per semihoram candescat; tunc cochleari ferreo
eximatur. Refrigerata teratur in pulverem, vitro ob-
turato servandum.

Nota. Probe edulcoratum Antimonium diaphoreti-
cum sit coloris albi, in flavum vergentis, saporis
expers, in Aqua et Acidis insolubile. Nisi purissi-
mum adhibeatur Nitrum, a Sale culinari et diges-
tivo perfecte liberum, Antimonium producitur mu-
riaticum, quod sub ablutione Calcem imperfectam,
ceu Pulverem Algarotti, praecipitabit, emesin cien-
tem. Nec Gypso sit inquinatum, ideoque Antimo-
nii cum Aqua decocti particulae nullae solvantur,
quae, quum refrixerint, ab Acido Sacchari praeci-
pitentur. Plumbum admixtum probatur, si ab Acido
Nitri puro aliquantulum solutum fuerit, quod affusa
Aqua hepatica acidulata nigrescat.

Aqua aromatica.

(*Loco Aquae cephalicae et Aquae Embryonum*).

Rec. Herbae Salviae, Uncias octo,

Roris marini,

Menthae piperitae,

Florum

(III)

Florum Lavendulae, singulorum Uncias quatuor,

Seminis Foeniculi,

Corticis Cassiae Cinnamomeae, singulorum
Uncias duas.

Scissis et contusis affundantur

Spiritus Vini rectificati, Librae quatuor,

Aquae communis, quantum satis.

Macerentur per horas viginti quatuor, et destillando eliciantur Librae duodecim. Serva.

Aqua Calcis.

(*Aqua Calcariae ustae*).

Rec. Calcis vivae, nuper ustae, Libram unam.

Sensim affunde

Aquae communis, Libras triginta.

Ebullitione peracta Aqua supernatans decanthetur, et in lagenis rite obturatis servetur.

Nota. Sit saporis alcalini, subadstringentis, ab Alkali vegetabili aërato lactea, Mercurium sublimatum corrosivum reducat, calcem ejus colore aurantiaco praecipitet. Sponte sedimentum in lagena deponens, viribus debilior est, atque de novo paranda.

Aqua Cerasorum.

Rec. Cerasorum nigrorum, una cum nucleis contusorum, Libras decem,

Aquae communis, quantum satis.

Destillent inde Librae viginti.

Aquae

Aqua Chamomillae.

Rec. Florum Chamomillae vulgaris ficcatorum,

Libras duas,

Aquae communis, quantum fatis.

Destillent Librae viginti.

Pari modo parantur:

Aqua Florum Sambuci,

Tiliae.

Aqua Cinnamomi simplex, s. sine Vino.

Rec. Corticis Cassiae cinnamomeae contusi, Li-

bram unam,

Aquae communis, quantum sufficit.

Destillando eliciantur Librae novem.

Aqua Cinnamomi vinosa.

Rec. Corticis Cassiae cinnamomeae contusi, Li-

bram unam,

Spiritus Vini rectificati, Libras duas,

Aquae communis, quantum fatis.

Destillent inde Librae novem.

Aqua destillata simplex.

Destillent Aquae communis duae tertiae partes, rejecta prima stillantis Aquae portiuncula.

Nota. Ne odorem empyreumaticum, vel acescentiam, contrahat, ante destillationem Aquae Mensuris decem adde Libram unam Carbonis puri pulverati. A Salibus alcalinis, et solutione Terrae ponderosae depuratae, non turbetur.

Aqua Foeniculi.

Rec. Seminis Foeniculi contusi, Libram unam,
Aquae communis, quantum sufficit.
Destillando eliciantur Librae viginti.
Oleum aethereum innatans auferatur.

Aqua fortis, *s.* Spiritus Nitri acidus.
(*Acidum nitricum*).

Rec. Nitri depurati pulverati, Libras octo.
In retortam vitream satis capacem immixtis affunde
Olei Vitrioli, Libras quatuor,
dilutas antea caute

Aquae communis Libris totidem.

Applicetur excipulum amplum, in quod

Aquae destillatae simplicis Librae quatuor
antea sint immixtae. Fiat destillatio ex arena, igne
primum remissiori, sub finem pedetentim aucto, ad sic-
cum. Acido elicto instilla

Argentum nitricum solutum,
quam diu inde fit turbidum. Seponatur per aliquot dies.
Tunc liquorem limpidum decantha, et ex retorta, fe-
re ad siccum destillando, rectifica.

Nota. Aqua destillata simplici dilutam nec Terra pon-
derosa nitrata, nec Argentum nitricum turbet, quo
observato latitans Acidum Vitrioli, aut Salis, pro-
batur.

Aqua Hyssopi.

Rec. Herbae Hyssopi ficcatae, Libras duas,
Aquae communis, quantum sufficit.
Destillent Librae viginti.
Eodem modo parantur

Aqua Melissae,
Menthae crispae,
Salviae.

Aqua Lauro-Cerasi.

Rec. Foliorum recentium Lauro-Cerasi, Libras
duas,

Aquae communis, quantum satis.

E retorta vitrea destillando elice Libras tres.
Serva sollicite.

Aqua Menthae piperitae.

Rec. Herbae Menthae piperitae ficcatae, Li-
bras duas,

Aquae communis, quantum satis.

Destillent Librae quatuordecim.

Aqua Menthae piperitae vinosa.

Rec. Herbae Menthae piperitae ficcatae, Li-
bram unam,

Spiritus Vini rectificati, Libram unam cum
dimidia,

Aquae communis, quantum satis.

Destillent inde Librae sex.

Aqua Naphae.

(*Aqua Florum Aurantii*).

Rec. Florum Aurantiorum recentium, Libras
duas,

Aquae

Aquae communis, quantum sufficit.

Abstrahantur Librae duodecim.

Aqua Petroselini.

Rec. Seminis Petroselini, Libram unam,

Aquae communis, quantum fatis,

Destillent Librae duodecim.

Aqua phagedaenica.

(*Liquor Hydrargyri muriatici corrosivi*).

Rec. Mercurii sublimati corrosivi,

Salis Ammoniaci depurati, singulorum Gra
na viginti quatuor.

Solve in

Aquae destillatae simplicis, Libris duabus.

Adde

Mellis rosati, Unciam unam,

Serva.

Aqua Rosarum.

Rec. Florum Rosarum recentium, Libras quatuor,

Aquae communis, quantum fatis.

Abstrahantur inde Librae viginti.

Aqua Rubi Idaei.

Rec. Fructuum Rubi Idaei maturorum, Libras
decem,

Aquae communis, quantum fatis.

Destillent Librae viginti.

Nota. Aquae destillatae, quoad partes volatiles plantarum, earundem odore, sapore et viribus, nec tamen nimis, sint donatae, neque lacteae et turbidae, nec pituitosae, aut acescentes.

Aqua vegeto-mineralis.

(*Aqua saturnina*).

Rec. Aquae destillatae simplicis, Libras duas,
Extracti Saturni, Unciam dimidiam.
Misce.

Aqua vulneraria.

(*Mixtura vulneraria acida*).

Rec. Aceti crudi, Libras tres,
Spiritus Vini rectificati, Libram unam cum
dimidia,
Spiritus Vitrioli, Libram dimidiam,
Mellis despumati, Libram unam.
Misce.

Aqua vulneraria vinosa.

Rec. Herbae recentis Salviae,
Absinthii vulgaris,
Menthae piperitae,
Rutae,
Roris marini,
Florum recentium Lavendulae, singulorum
Uncias quatuor,
Spiri.

Spiritus Vini rectificati, Libras sex,

Aquae communis, quantum satis.

Macerentur per viginti quatuor horas, et destillent
Librae octodecim.

Argentum nitricum, *ſ.* nitratum.

Rec. Argenti puri, malleo in bracteas tenuissimas
redacti, et forfice in fascias graciles secati, quantum
placet.

Fascias per vices Acido Nitri puro figillatim com-
mitte, vas vitreum subinde agitando, donec solutio
saturetur, quam Aqua destillata dilue, turbidam per
Chartam cola, et in vase porcellaneo, aut vitreo, eva-
pora; evaporatum sepone loco frigido, ut in crystal-
los albas, squamosas, vel tabulatas, concreascit, quas
collige, et supra infundibulum vitreum loco obscuro
ficca; Liquorem residuum denuo evapora, quamdiu
cristalli exinde formentur, quas in vitris, obturamen-
to vitreo probe munitis, locoque obscuro serva.

Balsamus Arcaei.

(*Unguentum Elemi*).

Rec. Elemi,

Terebinthinae laricinae,

Sevi vervecini,

Axungiae Porci lotae, singulorum Par pon-
dus.

Leni igne liquefacta colentur per linteum.

Balsamus mercurialis.

(*Unguentum Hydrargyri citrinum*).

Rec. Mercurii vivi puri, Unciam unam.

Spiritus Nitri acidi, Uncias duas, vel quantum fatis.

Solve digerendo. Liquorem etiamnum calidum
sensim admisce

Axungiae Porci, liquefactae et semirefrigeratae,
Unciis duodecim.

Serva.

Balsamus ophthalmicus ruber.

(*Unguentum Hydrargyri rubrum*).

Rec. Butyri recentis sine Sale,

Cerae flavae, singulorum Unciam dimidiam.

Leni igne liquatis, et ab igne remotis admisce

Mercurii praecipitati rubri, subtilissime pulverati, Drachmas duas.

Diligenter et exactissime invicem terantur et misceantur, usque ad refrigerationem.

Balsamus Opodeldoc.

(*Linimentum saponato-camphoratum*).

Rec. Saponis medicati rasi, Uncias duas,

Camphorae tritae, Drachmam unam,

Spiritus Salis Ammoniaci vinosi, Unciam
unam cum dimidia,

Olei Roris marini, Guttas sexaginta.

In vase vitreo, vesica tecto, supra arenam tepidam liquecant, ut refrigerata massam, gelatinae similem, referant.

Balsa

Balsamus Sulphuris simplex.

(Oleum Lini sulphuratum).

Rec. Olei Lini, Uncias octo,

Florum Sulphuris, Uncias duas.

In vase terreo satis capaci, arena circumdato, supra lenem ignem calefiant, spathula continue agitando, donec in unum coëant.

Balsamus Sulphuris terebinthinatus.

(Oleum Terebinthinae sulphuratum).

Rec. Balsami Sulphuris simplicis, Uncias duas,

Olei Terebinthinae, Libram dimidiam,

Solve digerendo.

Balsamus Vitae.

(Mixtura oleoseo-balsamica).

Rec. Olei Lavendulae,

Majoranae,

Caryophyllorum,

Macis,

Cinnamomi,

de Cedro, singulorum Scrupulum unum,

Rutae,

Succini rectificati, singulorum Guttas decem,

Balsami Peruviani nigri, Drachmam dimidiam,

Spiritus Vini rectificatissimi, Uncias decem.

Mixta committantur digestioni frigidae, et filtrentur per Gossypium.

Butyrum Antimonii.

(*Liquor Stibii muriatici*).

Rec. Croci Metallorum, Uncias duas,
Salis culinaris ficcati, Libram dimidiam.

Mixtis in retorta vitrea affunde

Olei Vitrioli, Uncias quatuor,

Aquae communis Unciis duabus

antea dilutas. Fiat destillatio ex balneo arenae, igne sub finem aucto. Liquorem obtentum serva.

Butyrum Cacao.

(*Oleum Cacao*).

Exprimatur e Seminibus Cacao leniter tostis, a Corticibus liberatis et grossiuscule contritis, ope torcularis, cujus laminae in Aqua fervida calefactae sint. Oleum butyraceum cum Aquae Duplo in balneo arenae digeratur, donec a faecibus purgatum sit. Frigefactum ab Aqua separetur et servetur.

Butyrum Majoranae.

(*Unguentum Majoranae*).

Rec. Foliorum Majoranae recentium, Libram dimidiam.

Contusa coquantur leni igne cum

Axungiae Porci, Libra una.

Consumpta humiditate cola, exprime, serva.

Calx

Calx Antimonii.

Rec. Antimonii crudi, grossiuscule pulverati, quantum vis.

Immitte in testam frictoriam planam supra ignem moderatum, idque tam diu ure, donec affurgere fumi definant, et nitentium punctorum maxima pars dispasreat, totumque in Calcem griseum mutetur. Serva.

Calx Antimonii cum Sulphure.

(*Calcaria sulphurato-stibiata*).

Rec. Calcis, recenter ustae, pulveratae, Unciam unam cum dimidia,
Sulphuris Antimonii aurati, Unciam dimidiam.

Invicem tritis sensim adde,

Aquae communis fervidae, Libram unam.

In vase porcellaneo, sub agitatione continua, leni calore exsicca, et pulverem ex albido flavescensem in vitro obturato serva.

Carbo purus.

Ligni Tiliae, vel alius arboris, frustula urantur in retorta terrea, aut in crucibulo clauso, cujus operculum foramine parvo instructum sit, donec fumus penitus definat. Carbo remanens in pulverem tritus servetur in vase clauso.

Cera viridis.

(*Ceratum Aeruginis*).

Rec. Cerae flavae, Libram unam,
Resinae Pini, Libram dimidiam,

Terebinthinae, Uncias quatuor,
 Viridis Aeris triti, Unciam unam.
 Misce fiat Ceratum.

Ceratum Saturni.

(*Unguentum Saturninum*).

Rec. Cerae albae, Libram dimidiam,
 Olei Olivarum, Libras duas.
 Liquefactis successive immisce
 Extracti Saturni, Uncias tres,
 Aquae Rosarum, Libra dimidia
 dilutas. Serva.

Cinnabaris factitia.

Rec. Mercurii vivi puri, Libras duas,
 Florum Sulphuris, Uncias quatuor.

Sulphuri in vase ferreo leni igne liquato, paulatim adjice Mercurium antea calefactum, assidue spathula ferrea agitando, ut bene misceantur. Flammam, simulac mixtura conceperit, extingue operculo vasi adaptato; deinde massam in pulverem redactam immitte in phialam, et ex arena, igne sensim aucto, sublima. Massam sublimatam crystallinam, laevigando cum Aqua, in pollen subtilissimum redige.

Nota. Sit nitens crystallis parvis acufornibus, coloris obscure, sub tritura, laete rubri, odoris et saporis expers, in Acidis, excepta Aqua regia, insolubilis, in igne prorsus avolans, cum Aceto bulliente decocta huic dulcedinem non impertiens; colatura, cum Aqua hepatica acidulata mixta, limpida maneat.

Coloꝝ

**Colocynthis praeparata; vulgo Trochisci
Alhandal.**

Rec. Pulpae Colocynthidum, a feminibus liberatae, et minutim concisae,
Uncias quinque,

Gummi Arabici, pulverati, Unciam unam.

Cum Aquae quantitate sufficiente fiat pasta, quae
exsiccata in pulverem subtilem redigatur.

Conserva Cochleariae.

Rec. Foliorum Cochleariae recentium, Libram
unam.

Contundantur in mortario lapideo, ope pistilli lignei, in pulvem, admiscendo successive

Sacchari albi pulverati, Libras tres.

Serva.

Conserva Rosarum.

Rec. Petalorum Rosarum rubrarum recentium,
Libram unam,

Sacchari albi pulverati, Libras duas.

Fiat Conserva.

Cremor Tartari.

(*Tartarus depuratus*).

Crystalli Tartari purificati venales explorentur, an ab inquinamentis metallicis et Salibus heterogeneis sint liberae. Tunc Aqua frigida abluantur, et iterum siccatae in mortario ferreo mundo et modice calefacto in pulverem terantur.

Nota.

Nota. Sit coloris albi, saporis aciduli, Cupro non inquinatus, neque adulteratus Tartaro vitriolato, solubilis in Aquae frigidae Partibus centum et quinquaginta, bullientis Partibus viginti octo.

Cremor Tartari boraxatus, ꝑ. solubilis.
(*Tartarus boraxatus*).

Rec. Boracis, Libram dimidiam.

In vase stanneo

Aquae bullientis Decuplo
solve, et adde

Cremoris Tartari, Libram unam cum dimidia.

Solutione peracta Liquorem filtra, et in vase porcellaneo, aut vitreo, aut figulino non vitreato, arenae superimposito, calore sub finem exiguo, evapora. Sal siccum, in pulverem tritum, vitro clauso ferva.

Nota. Sapore acido praeditus in aëre deliquescit, in Aqua facillime solvitur.

Crocus Martis aperitivus.

(*Ferrum oxydatum fuscum*).

Rec. Vitrioli Martis, quantum lubet.

Solve in Aqua fervida, filtra et instillando
Liquoris Alkali vegetabilis quantum satis,
praecipita; praecipitatum Aqua calida sedulo edulcora, sicca et ferva.

Crocus Metallorum.

(*Stibium oxydulatum fuscum*).

Rec.

Rec. Antimonii crudi,

Nitri depurati ficcati, singulorum Par pondus.

Pulverata et mixta in olla ferrea munda accendantur pruna admota. Post detonationem massa refrigerata in pulverem redigatur, Aqua fervida sedulo edulcoretur, et ficcetur.

Cuprum Ammoniacum, f. Ammoniacale.

(*Cuprum Ammoniatum*).

Rec. Vitrioli de Cipro, subtilissime laevigati, quantum placet.

Solve in

Spiritus Salis Ammoniaci caustici, quantum fatis.

Ex solutione filtrata, et cum

Alcoholis Vini Triplo

mixta, statim crysalli parvae, acufomes, caeruleae subsidebunt. Stet mixtura per aliquot horas; tunc effuso liquore Cuprum Ammoniacum colligatur, in aëre ficcetur, et in vitro munito fervetur.

Elaeofaccharum Anisi.

Rec. Sacchari albissimi pulverati, Unciam unam,

Olei Anisi aetherei, Guttas viginti quatuor.

Misce et serva.

Eodem modo parantur:

Elaeofaccharum Cinnamomi;

Foeniculi;

Menthae

Menthae piperis
 tae;

et reliqua.

Elaeosaccharum Flavedinis Citri,
paratur quoque, atterendo Fructibus Citri re-
centibus Sacchari frustula, donec oleosa Flavedinis
substantia fatis impraegnata sint.

Electuarium lenitivum.

(Electuarium e Senna).

Rec. Caricarum, Libram dimidiam,
Radice Liquiritiae, Uncias duas.

Coque ex

Aquae Libris quatuor
ad dimidium; exprime, cola, et Decoctum evapora ad
Uncias duodecim, in quibus dissolve

Sacchari albi, Uncias sedecim.

Huic Syrupio immisce

Pulpae Tamarindorum,

Prunorum, singularum Uncias quin-
que,

et postremo

Foliorum Sennae pulveratorum, Uncias qua-
tuor cum dimidia,

Seminis Anisi pulverati, Unciam dimidiam.

Serva.

Electuarium mundificans.

Rec.

Rec. Corticis Ligni Guajaci, Uncias duas,
Sassafras, Unciam unam,
Foliorum Sennae,
Radiciis Rhabarbari, singulorum Unciam di-
midiam.

Redige in pulverem, cujus Parti unae admiscean-
tur Mellis despumati Partes quatuor.

Nota. Electuaria aëre calidiori in fermentationem
acidam, aut nimiam ficcitatem, prona, minori quan-
titate parentur, atque in vasis clausis, locoque fri-
gido ferventur.

Electuarium Theriaca.

Rec. Radicum Angelicae, Libram dimidiam,
Serpentariae Virginianae, Un-
cias quatuor,
Valerianae minoris,
Scillae,
Zedoariae,
Corticis Cassiae cinnamomeae, singulorum
Uncias duas,
Seminis Cardamomi minoris,
Myrrhae,
Croci,
Caryophyllorum,
Opil, singulorum Unciam unam,
Mellis despumati, Libras sex.

Melli

Melli paululum calefacto addatur Opium in Vini Malacensis quantitate sufficiente dilutum, deinde admisceantur cetera, in pulverem trita. *Serva.*

Nota. Theriacae hujus Unciae singulae continent Opii Grana circiter quinque.

Elixir acidum.

(Mixtura sulphurico-acida.)

Rec, Spiritus Vini rectificatissimi, Uncias tres.

Succesive instilletur

Olei Vitrioli rectificati, Uncia una.

Serva.

Elixir aperitivum.

Rec. Croci, Drachmas duas,

Alcali vegetabilis aëratı depurati, Unciam unam,

Aquae Chamomillae, Libram unam.

Post digestıonem sufficientem exprime, et in colatura solve

Extracti Aloes aquosi,

Myrrhae aquosi, singulorum Unciam dimidiam.

Serva.

Elixir pectorale.

(Elixir ex Succo Liquiritiae.)

Rec. Succı Liquiritiae depurati, Unciam dimidiam,

Aquae

Aquae Foeniculi, Libram dimidiam.

Solutis et colatis adde

Spiritus Salis Ammoniaci anisati, Drachmas duas,

Tincturae Thebaicae, Drachmam dimidiam.
Serva.

Elixir roborans.

(*Tinctura Chinae composita*).

Rec. Corticis Chinae fusci pulverati, Uncias tres,

Radici Gentianae rubrae,

Corticum Aurantiorum a parenchymate albo mundatorum, singulorum Unciam unam,

Spiritus Vini rectificati, Uncias sedecim,

Aquae Cinnamomi simplicis, Uncias octo.

Digere et cola.

Elixir viscerale.

(*Elixir Aurantiorum compositum*).

Rec. Corticum Aurantiorum, a parenchymate albo mundatorum, Uncias quatuor,

Alcali vegetabilis aëрати depurati, Unciam dimidiam,

Vini Malacensis, Libras quatuor.

Post digestionem sufficientem exprime. In colatura solve

℞

Extra

Extracti Absinthii vulgaris,
Centaurii minoris,
Gentianae rubrae,
Trifolii, singulorum Unciam unam,
Olei de Cedro, Drachmam dimidiam, in
Liquoris anodyni mineralis Uncia una
solutam.

Elixir Vitrioli.

(*Tinctura aromatica acida*).

Rec. Tincturae aromaticae, Libram unam.

Infilla

Olei Vitrioli, Unciam dimidiam.

Emplastrum album coctum.

(*Emplastrum Cerussae*).

Rec. Cerussae tritae, Libras octo,

Olei Olivarum, Libras quatuor cum dimidia.

Oleo calefacto injiciatur Cerussa. Coquantur sub
agitatione continua, instillando sensim modicum
Aquae calidae, ne humidum deficiat, ad justam
Emplastri spissitudinem; tunc adde

Cerae albae, Libram unam.

Fiat lege artis Emplastrum.

Emplastrum Ammoniacy.

Rec. Ammoniacy, Libram dimidiam,

Galbani, Uncias duas,

Cerae

Cerae flavae,

Resinae Pini,

Terebinthinae, singulorum Uncias quatuor.

**Cerae et Resinae liquatis et refrigeratis admisce
Ammoniacum et Galbanum, in Terebinthina blando
calore soluta, ut fiat Emplastrum.**

Emplastrum cephalicum.

(Emplastrum opiatum).

Rec. Elemi,

Mastiches,

Olibani, singulorum Uncias quatuor,

Benzoës, Uncias duas,

Terebinthinae, Libram dimidiam.

**In balneo aquae ad massam homogeneam redac-
tis immisce**

Opium pulverati, Unciam unam,

Balsami Peruviani, Unciam dimidiam.

Fiat Emplastrum.

Emplastrum Cicutae.

(Emplastrum Conii.)

Rec. Cerae flavae, Uncias quatuordecim,

Colophonii,

Olei Olivarum, singulorum Libram dimidiam.

Liquatis et semirefrigeratis paulatim admisce

Herbae Cicutae pulveratae, Libram unam,

Extracti Cicutae, Unciam unam.

Fiat Emplastrum.

Eodem modo paratur

Emplastrum Hyoscyami.

Emplastrum citrinum.

Rec. Resinae Pini, Libram unam,
Cerae flavae, Uncias octo,
Sevi vervecini, Uncias quatuor,
Terebinthinae, Uncias duas,
Curcumae pulveratae, Unciam dimidiam.
Mixta et colliquata colentur. Fiat Emplastrum.

Emplastrum Diachylon compositum.

(Emplastrum Lithargyri compositum).

Rec. Emplastri Diachyli simplicis, Libras quatuor,
Cerae flavae, Libram dimidiam,
Ammoniacy,
Galbani,
Terebinthinae, singulorum Uncias quatuor.
Emplastro et Cera liquatis et aliquantulum refrigeratis, admisceantur Ammoniacum et Galbanum, cum Terebinthina liquata.

Nota. Coloris flavi gratia addatur Croci triti, in Spiritu Vini macerati et diluti, quantum satis.

Emplastrum Diachylon simplex.

(Emplastrum Lithargyri simplex).

Rec. Lithargyri, in subtilissimum pulverem triti,
Libras quinque,
Olei Olivarum, Libras novem.

Coque

Coque moderato igne, spathula semper agitando, et pauxillum Aquae calidae subinde instillando, ad justam Emplastri spissitudinem.

Emplastrum flavum.

Rec. Vitellos Ovorum coctos et ficcatos, Numero sex,

Cerae flavae,

Axungiae Porci lotae, singularum Uncias quatuor.

Misce exacte. Fiat Emplastrum.

Emplastrum Meliloti.

Rec. Cerae flavae, Libram unam,

Colophonii,

Olei Olivarum, singulorum Libram dimidiam.

Liquatis et semirefrigeratis paulatim admisce

Herbae Meliloti pulveratae, Libram unam.

Fiat Emplastrum.

Emplastrum mercuriale.

(*Emplastrum Hydrargyri*).

Rec. Emplastri Diachyli simplicis, Uncias viginti quatuor,

Cerae flavae, Libram dimidiam.

Liquentur leni calore; dein ab igne remotis adde

Mercurii vivi puri, Uncias octo,

Terebinthinae Unciis quatuor

antea diligenti agitatione extinctas. Misce exacte.

Emplastrum resolvens.*(Emplastrum foetidum).*

Rec. Ammoniacy, Uncias viginti quatuor,
 Asae foetidae, Uncias octo,
 Saponis Hispanici rasi, Uncias quatuor,
 Olei Olivarum, Uncias duas.

Coquantur ex Aquae quantitate sufficiente, leni igne, ad Emplastri spissitudinem.

**Emplastrum saponato-camphoratum ;
 vulgo Emplastrum miraculosum.**

Rec. Emplastri Diachyli simplicis, Libras tres,
 Cerae flavae, Libram dimidiam,
 Saponis Hispanici, Uncias tres.

Leni igne mixtis et aliquantulum refrigeratis adde
 Camphorae, Unciam dimidiam in
 Olei Olivarum pauxillo solutam. Fiat Emplastrum.

Emplastrum Spermatidis Ceti.*(Emplastrum Cetacei).*

Rec. Cerae albae,

Sevi vervecini, singulorum Libram unam,
 Spermatidis Ceti, Libram dimidiam.

Massam leni igne liquatam effunde in cistulas papyraceas.

Emplas

Emplastrum stomachicum.

(*Emplastrum aromaticum*).

Rec. Cerae flavae, Uncias octo,
Sevi vervecini, Libram dimidiam.
Liquatis et semirefrigeratis immisce
Pulveris Olibani, Uncias quatuor,
Caryophyllorum, Unciam unam,
Olei Nucis Moschatae expressi, Unciam u-
nam cum dimidia,
Menthae crispae aetherei, Drachmas
duas.
Misce, fiat Emplastrum.

Emplastrum vesicatorium ordinarium.

(*Emplastrum Cantharidum ordinarium*).

Rec. Cerae flavae, Libram unam,
Terebinthinae,
Olei Olivarum, singulorum Uncias tres.
Liquatis et semirefrigeratis immisce
Cantharidum grossiufcule tritarum, [Libram
dimidiam.
Fiat Emplastrum.

Emplastrum vesicatorium perpetuum.

(*Emplastrum Cantharidum perpetuum*).

Rec. Terebinthinae,
Pulveris Mastiches, singulorum Libram dimi-
diam.
Leni calore liquatis immisce

Pulveris Cantharidum, Uncias duas,
 Euphorbii, Unciam unam,
 Fiat Emplastrum.

Extractum Absinthii maritimi.

Absinthii maritimi Summitatibus minutim concisis, in vas stanneum immixtis, affunde Aquae fervidae Octuplum. Ebulliant leniter per horae quadrantem, et liquorem exprime. Residuum ex Aquae Quadruplo iterum per quadrantem horae leniter coque. Decocta expressa et subsidendo depurata evaporent leni calore ad Extracti spissitudinem.

Eodem modo parantur:

Extractum Absinthii vulgaris;
 Cardui benedicti;
 Cascarillae;
 Centaurii minoris;
 Chamomillae vulgaris;
 Chinae aquosum;
 Dulcamarae;
 Fumariae;
 Gentianae;
 Marrubii;
 Millefolii, ex Herba cum Floribus;
 Rhabarbari;
 Salicis fragilis;
 Trifolii.

Extra

Extractum Aconiti.

Herba Aconiti Napelli recens, antequam effloruerit collecta, contundatur in mortario lapideo, adspargendo pauxillum Aquae, et exprimatur succus, qui statim absque defaecatione in balneo aquae, continue sub finem spatula lignea agitando, evaporet ad Mellis spissitudinem.

Eodem modo parantur:

Extractum Belladonnae;
Chelidonii majoris;
Cicutae;
Gratiolae;
Hyoscyami.

Extractum Aloes.

Rec. Aloes optimae, Libram dimidiam.

Pulveratae affunde

Aquae communis, Libras duas.

Solve digerendo, et Liquorem colatum in balneo aquae evapora ad justam spissitudinem.

Eodem modo parantur:

Extractum Myrrhae;
Opii.

Extractum Angelicae.

Rec. Radicum Angelicae, Libras duas.

Crassiuscule contusis affunde

K 5.

Spiri

Spiritus Vini rectificati, Libras tres,
Aquae communis, Libras novem.

Digere in balneo aquae, exprime, et ex liquore
colato Spiritum Vini e balneo aquae destillando elice.
Residuum ad Extracti spissitudinem evaporet.

Pari modo parantur:

Extractum Arnicae, ex toto;

Colocynthis, e Pulpa a feminis
bus purgata;

Columbae;

Corticum Aurantiorum;

Enulae;

Hellebori nigri;

Levistici;

Valerianae minoris.

Extractum catholicum.

(*Extractum Rhei compositum*).

Rec. Extracti Rhabarbari, Uncias tres,

Aloes, Unciam unam.

Mixtis adde

Saponis Jalappini, Unciam unam,

in Spiritu Vini rectificato solutam. In balneo aquae
evaporet, agitando, ad Massae pilularis spissitudinem.

Extractum Chinae, frigide paratum.

Rec. Corticis Chinae fusci pulverati, Libras tres,
Aquae

Aquae communis frigidae, Libras triginta sex.
 Stent subinde agitatae per horas quadraginta octo.
 Liquor colatus leniter evaporet, donec supersint
 Librae circiter duae; frige factus filtretur per chartam,
 et denique balnei aquae calore ad Extracti consistentiam inspissetur.

Extractum, ꝑ. Roob, Dauri Carotae.
(Succus Dauri inspissatus).

Radices Dauri sativi recentes, mundatae et concisae,
 dimidio Aquae superfusae, coquantur in lebeti
 stanneo, ut mollescant. Exprimatur succus, semel
 ebulliendo clarificandus, lenique calore ad consistentiam
 Mellis evaporandus.

Extractum Graminis liquidum, ꝑ. Melago Graminis.

Rec. Radicum recentium Graminis albi, Libras
 duodecim.

Concisas continue in mortario ferreo, addendo
 Aquae communis, Libras sex.

Exprime succum, quem post unicam ebullitionem
 in vase stanneo cola, et leni calore ad Syrupi spissioris
 consistentiam redige.

Eodem modo paratur

Extractum Taraxaci liquidum, ꝑ. Melago Taraxaci

e Radicibus recentibus, cum Herba juniori, primo
 vere collectis.

Extra

Extractum Martis pomatum.

(*Extractum Ferri pomatum*).

Rec. Limaturae Martis purae, Libram unam,
Succi Pomorum acidulorum, Libras quatuor.

Digerantur, saepius agitando, per aliquot dies.
Postea coquantur leni igne ad dimidiae partis consumptionem. Liqueor per linteum colatus evaporet ad justam spissitudinem.

Extractum panchymagogum.

(*Extractum Colocynthis compositum*).

Rec. Pulpae Colocynthis, a feminibus purgatae,
minutim incisae, Drachmas sex,

Spiritus Vini tenuioris, Libram unam.

Macerentur leni calore per quatuor dies; Tincturae expressae adde

Aloes optimae pulveratae, Unciam unam
cum dimidia,

Scammonii Aleppensis, Unciam dimidiam.

Solutione peracta abstrahatur Spiritus, et Massa redigatur leni igne ad consistentiam Extracti solidi, addendo et exacte commiscendo

Seminis Cardamomi minoris pulverati, Unciam dimidiam.

Extractum Quassiae.

Rec. Rasurae Ligni Quassiae cum Cortice, grossiuscule contusae, Libras sex,
Aquae

Aquae communis, Libras sexaginta.

Decoquantur per horam, et Liquor coletur. Repetatur coctio ex Aqua recenti eodem modo bis, terve. Decocta prout subsederint colata, evaporent ad Extracti spissitudinem, sub finem addendo pauxillum

Spiritus Vini rectificati, ut fiat Massa uniformis.

Nota. Extracta Vegetabilium cum Aqua pura rite parata, sine empyrenmate, odore et sapore plantarum specifico gaudeant, in Aqua destillata solvantur, ut plurimum sine sedimento terrestri, resinoso, aut pulverulento, eorumque solutio frigida Decocto plantarum earundem frigefacto respondeat; consistentiae sint vel liquidioris, ut Mellago Graminis et Taraxaci, vel, magis evaporata, spissioris, nec tamen nimis spissae, sed nonnihil tenacis, aequaliter cohaerentis, absque particulis duris, aut combustis. Sic, v. c. Extractum Chinae aquosum coloris sit dilute fusci, ad Chocolatam accedentis, consistentiae Syrupi spissiusculi, quodammodo tenacis, saporis iucunde amari, subaciduli, subadstringentis, atque in Aqua frigida pura solutum Decocto Chinae frigefacto simile. Extractum Rhabarbari sit consistentiae spissiusculae, coloris flavo-fusci, saporis rhabarbarini fortis, nec valde amari, nec falsi. Saepe alcalino inquinatum, in Aqua destillata solutum, colorem fusco-rubrum induit, et cum Acidis effervescit, quae phaenomena solutio aquosa Extracti Rhei genuini non, nisi admixto antea Alkali, producere solet. Extractum Quassiae coloris sit nigro-fusci, consistentiae spissioris, aliquantulum granulosa, saporis amarissimi, diu in ore persistentis.

Extracta paranda sunt in vasis vitreis, porcellaneis, aut figulinis non vitreatis. Parata in vasis cupreis. Stanno purissimo non bene obductis, Cupro plerumque inquinantur, quod probat lamina ferrea polita, Extracto, antea focillato, per unam alteram

ve horam commissa, hinc colore rufo tineta. Cum primum et colore caeruleo sese prodat, dum Extracti combusti residuum cum Spiritu Salis Ammoniaci aequo digeritur.

Extractum Saturni.

(*Acetum saturninum*).

Rec. Aceti Lithargyri, quantum placet.

Evapora in lebeti plumbeo, usque dum vitrum Aquae Unciae dimidia capax Drachmas sex huius Aceti condensati capiat.

Fel Tauri inspissatum.

Fel Tauri recens in balneo aquae ad Extracti spissitudinem evaporet.

Flores Benzoës.

(*Acidum benzoicum*).

Rec. Benzoës pulveratae, Libras duas,

Alcali mineralis crystallisati, Uncias octo.

Misce et decoque ex

Aquae communis, Libris sedecim, perpetuo agitando, per horam dimidiam. Cola. Benzoën residuam denuo ex

Aquae communis Libris sex decoque et cola. Colaturam cum priori misce et evapora, donec supersint Librae duae. Filtra et

Spiritu Vitrioli fatura. Praecipitatum pulverem levem, ex cinereo albidum, in Aqua bulliente solve. Liquorem adhuc ferventem

ventem cola per linteam, et ad crySTALLIFANDUM seponne. CrySTALLOS collectas, Aqua frigida ablutas, sicca et ferva.

Nota. Sint crySTALLINI, coloris splendide argentei, saporis subaciduli, subdulcis, pungentis, in aëre invariables, in igne combusti cum flamma alba sub odore benzoico specifico penitus avolent; aegerissime in Aqua, facilius autem in Alcohole Vini solvantur; Tincturam Laccae caeruleam in rubram commutent.

Flores Salis Ammoniaci martiales.

(*Ammonium muriaticum martiatum*).

Rec. Ferri puri, Unciam unam.

Solve in quantitate sufficiente liquoris, ex

Spiritus Salis acidi, Partibus duabus,

Nitri acidi, Parte una

commixti. Solutum admisce

Salis Ammoniaci Unciis duodecim.

Massam, leni calore exsiccata et contritam, e retorta vitrea, collo amplo instructa, igne gradatim aucto sublima. Sublimatum, colore aurantiaco imbutum, in vase clauso ferva.

Flores Sulphuris.

(*Sulphur depuratum*).

Sulphur sublimatum, quale prostat, Aqua fervida ab Acido adhaerente perfecte libera, et siccatum ferva.

Nota. Particulis arsenicalibus inquinatos esse, color aurantiacus prodit. Lotione cum Aqua ab Acido liberentur.

Flores

Flores Zinci.

(*Zincum oxydatum album*).

Rec. Vitrioli Zinci, quantum vis.

Solve in

Aquae fervidae Decuplo.

Filtra et praecipita sufficiente quantitate

Alcali mineralis crystallisati, in Aqua soluti.

Praecipitatum album bene ablutum, et caloris operis
siccatum, in vitro clauso serva.

Nota. Pulverem exhibeant album, levem, subtilissimum, absque odore et sapore. Soluti in Acido Nitri non praecipitentur ab Acido vitriolico; a Tinctura Gallarum non nigrescant; cum Aceto digesti huic dulcedinem non impertiant.

Globuli martiales.

(*Globuli Tartari martiati*).

Rec. Limaturae Martis, subtilissime pulveratae, Partem unam,

Tartari crudi pulverati, Partes duas.

Mixta in vase ferreo humectentur Aqua, ut fiat Massa pultiformis, quam sub diu, aut Arenae balneo, exsicca; iterum humecta et sicca, idque toties repetite, donec Massa quasi resinosa appareat. Formetur in Globulos.

Hepar Sulphuris calcareum.

(*Calcaria sulphurata*).

Rec. Calcis ustae pulveratae, Uncias duas,

Florum Sulphuris, Unciam unam.

Mixtis

Mixtis sensim affunde

Aquae fervidae, Uncias sedecim.

Supra modicum ignem, continue agitando, evaporent ad siccum. In vase vitreo clauso serva.

Hepar Sulphuris salinum.

(*Kali Sulphuratum*).

Rec. Florum Sulphuris, Partem unam,

Alcali vegetabilis aëratı depurati, Partes
duas.

Mixta in crucibulo tecto et satis amplo leni igne coëant in massam homogeneam, quam in tabulam lapideam, aut in laminam aeneam, Oleo Amygdalarum illitam, effunde, et frigefactam statim in vase rite clauso serva.

Infusum laxativum, vulgo Aqua laxativa Viennensis.

(*Infusum Sennae compositum*).

Rec. Foliorum Sennae, Unciam dimidiam,

Seminis Coriandri, Drachmam unam.

Affunde

Aquae fervidae, Uncias sex.

Macera per semihoram. In Colatura expressa solve

Mannae electae, Uncias duas.

Cola.

Julapium e Camphora.

(*Mixtura camphorata*).

Rec. Camphorae, additis aliquot guttis Spiritus

Vini probe tritae, Drachmam unam.

l.

Misco

Misce exacte cum

Gummi Arabici, Drachmis duabus,

antea cum

Aquae destillatae simplicis Drachmis dua-
bus

in Mucilaginem soluti.

Sub continua agitatione adde successive

Aceti Vini, in quo

Sacchari albi Uncia dimidia

antea soluta est, Uncias sedecim.

Serva.

Kermes minerale.

(*Sulphur stibiatum rubrum*).

Rec. Antimonii crudi, Libras duas,

Alcali mineralis, Libram unam.

Pulverata et mixta liquefiant in crucibulo igne moderato. Massam fluentem effunde, refrigeratam pulverisa, in Aquam fervidamingere, et per horae quadrantem spatula continue movendo, decoque. Liquorem etiamnum fervidum filtra. Refrigeratum a praecipitato sponte nato filtri ope separa, Antimonii residuo iterum affunde, addita Aquae portione denuo per quadrantem horae coque et filtra; et hanc operationem bis vel ter itera. Praecipitatum rubicundum leve, his laboribus genitum, Aqua tepida ablue, in loco umbroso exsicca, et serva.

Lae Sulphuris.

(*Sulphur praecipitatum*).

Rec. Lixivii caustici, quantum placet.

Misce. Herventi in sartagine ferrea per vices adde

Florum

Florum Sulphuris, quantum Lixivium catistis cum valet solvere. Liquori per Chartam colato, et cum Triplo Aquae mixto, instilla

Spiritus Vitrioli, quantum ad praecipitandum Sulphur requiritur, caute vitando Gas suffocans inde natum. Praecipitatum Aqua sedulo ablue, et sicca.

Nota. Sit coloris fordide albi, tenne, leve, odoris et saporis parum vel nihil sulphurici, cum Sale Ammoniaci tritum non spiret odorem alcalinum volatilem, in cochleari supra ignem totum avolet.

Lapides Cancrorum praeparati.

Lapides Cancrorum, Aqua frigida, ut a foribus externis liberentur, aliquoties abluti et siccati, dein grossiuscule contusi, pro extrahendo glutine cum Aqua aliquoties fortiter coquantur, deinde in pollen subtilissimum terantur, et per linteum trajiciantur.

Lapis Calaminaris praeparatus.

Lapidi Calaminari aliquoties candefacto, et in Aqua frigida extincto, deinde in pulverem trito, affundatur Aquae purae quantitas sufficiens, in vase satis capaci, saepius agitando, ut partes subtiliores Aquae immisceantur. Liquor effusus maneat immotus, donec subsideat pulvis levior. Partes grossiusculae, Aquae nondum miscibiles, denuo terantur, et Aquae pari modo immisceantur. Praecipitatum pulverem subtilissimum collige, sicca et serva.

Lapis causticus.

(*Kali causticum siccum*).

Lixivium causticum evaporet in vase ferreo, donec gutta in metallum frigidum demissa, perfecte concreascit; tunc effunde, et frustula diffracta statim in vase rite obturato serva.

Lapis divinus, s. ophthalmicus.

Rec. Pulveris Nitri depurati siccati,
 Vitrioli de Cipro,
 Aluminis crudi,
 singulorum Uncias octo.

Misce et in vase figulino supra ignem liqua; sub frigefactione adde

Camphorae tritae, Unciam dimidiam.

Misce omnia exactissime, et in Vitro clauso serva.

Nota. Praefertur quibusdam Viride Aeris Vitriolo.

Lapis infernalis.

(*Argentum nitricum fusum*).

Rec. Argenti puri, quantum placet.

Solve in

Aquae fortis, quantitate sufficiente.

Deinde leni calore in vase vitreo evapora ad siccum. Massam in vase argenteo, aut porcellaneo, idoneo, atque in cochleari ferreo arenae superimposito, leni calore liqua, et simulac Olei instar fluit, effunde in modulum ferreum calefactum, Sevo illitum. Refrigeratam massam in vitro clauso serva.

Nota. Sit solidus, in fractura crystallinus, coloris e nigro grisei, non viridescentis, in Aqua solutus addito Ferro nec sedimentum cupreum, nec, cum Spiritu

ritu Salis Ammoniaci digestus, colorem caeruleum producat.

Laudanum liquidum.

(*Tinctura Opii composita*).

Rec. Opii optimi, Unciam unam,

Caryophyllorum, Drachmam dimidiam.

In pulverem tritis affunde

Aquae Cinnamomi simplicis, Uncias quatuor,

permixtas cum

Alcoholis Vini, Unciis duabus.

Digere in vitro bene clauso per sex dies in loco calido; tunc exprime, clarifica, et ferva.

Nota. Drachma continet Opii circiter Grana decem.

Limatura Martis praeparata.

(*Ferrum pulveratum*).

Ferrum purum, lima in scobem deductum, in mortario ferreo assidue teratur, ut fiat pollen subtilissimum, per linteum trajiciendum, et in vitro obturato fervandum.

Nota. Sit coloris ferrei, ex nigro grisei et nitentis, minime rubiginosi, aut longa ignitione calcinata, Magneti perfecte obediens, nec Cupro aut Auris chalto inquinata, ideoque colorem caeruleum non induens, si cum Spiritu Salis Ammoniaci aliquamdiu digesta, vel cum Acido Nitri, aut Vitrioli, atque Alkali volatili commixta fuerit.

Linimentum volatile.

(*Linimentum ammoniatum*).

Rec. Olei Olivarum, Uncias tres,
Spiritus Salis Ammoniaci cum Calce, Un-
ciam unam.

Agitentur in vase vitreo, donec perfecte in unum
coëant.

Liquamen Myrrhae.

(*Liquor Myrrhae*).

Rec. Myrrhae contusae, Uncias duas,
Aquae destillatae simplicis, Uncias octo.

Digere in vase vitreo, aut porcellaneo, obturato,
balneo aquae commisso, ad sufficientem Myrrhae solu-
tionem. Liquorem per linteum colatum loco frigido
serva.

Liquiritia cocta, s. Bacilli Liquiritiae.

Rec. Sacchari albi, Libram unam,

Pulveris Radicis Liquiritiae, Unciam unam,

Iridis Florentinae, Drach-
mas duas,

Croci, Drachmam unam.

Mixta redigantur in massam cum

Mucilaginis Gummi Tragacanthae, quantum
sufficit.

Formentur inde Bacilli, supra cribrum siccandi.

Liquor Alkali vegetabilis; vulgo Oleum
Tartari per deliquium.

(*Liquor Kali carbonici*).

Rec.

**Rec. Alkali vegetabilis depurati sicci, Libram
unam.**

Solve in

Aquae destillatae simplicis, Libris duabus.
Filtrā et ferva.

**Liquor Alkali volatilis acetici, vulgo
Spiritus Mindereri.**

(*Liquor Ammonii acetici*).

**Rec. Alkali volatilis depurati sicci, Uncias tres,
Aceti concentrati, Uncias undecim, vel
quantum requiritur ad saturandum.**

Diluatur postea Aqua destillata simplici, ut totius
Pondus sit Unciarum viginti quatuor. Serva.

Nota. Sit limpidus, saporis urinosi, pungentis; ne-
que Chartam Laccae caeruleam colore rubro, nec
Fernambuci rubram violaceo tingat.

Liquor anodynus martialis.

(*Spiritus sulphurico-aethereus martiatus*).

Rec. Limaturae Martis, quantum placet.

Solve in quantitate sufficiente

Spiritus Salis acidi,
cum

Spiritus Nitri acidi quarta Parte
mixti, et evapora. Massam siccam in cellam repone,
ut in Liquorem coloris fusci saturati deliquescat.

Liquorem obtentum misce conquassando cum
Naphthae Vitrioli Duplo.

Aetherem, hoc modo Ferro soluto impraegnatum, separa, et cum

Spiritus Vini rectificatissimi Duplo misce. Mixtum in vitris oblongis bene obturatis radiis solis tam diu expone, donec color omnis evanuerit. Tunc sollicite ferva.

Nota. Hic Spiritus, encheiresi breviori paratus, serviat loco Tincturae Bestuscheffianae,

Liquor anodynus mineralis.

(*Spiritus sulphurico-aethereus*).

Rec. Spiritus Vini rectificatissimi, Libras quatuor.

In cucurbitam vitream immixtis adde sensim

Olei Vitrioli, Libram unam.

Maneant immota in vase clauso, per horas viginti quatuor; dein destillent in arenae balneo, igne lenissimo, Librae circiter tres. Liquor rectificetur supra Terram ponderosam depuratam usitam, et fervetur in vitris probe munitis.

Nota. Encheiresi breviori obtinetur Liquor anodynus ex Naphthae Vitrioli Parte una, et Alcoholis Vini Partibus tribus permixtis.

Sit odoris et saporis penetrantis, suavis, reficientis, minime sulphurei, nec Chartam Laccae caeruleam colore tingat rubro.

Liquor Cornu Cervi succinatus.

(*Liquor Ammonii succinici*).

Rec. Salis Succini, quantum placet.

Satu.

Saturetur exacte

Spiritu Cornu Cervi rectificato.

Filtra et ferva.

Nota. Sit limpidus, non turbidus, aut foetens, Olei supernatantis expers, neque Syrupum Violarum rubro, aut Tincturam Curcumae fusco, colore tingens.

Liquor Terrae foliatae Tartari.

(*Liquor Kali acetici*).

Rec. Terrae foliatae Tartari siccae, Libram unam,

Aquae destillatae simplicis, Libras duas.

Solve et filtra.

Lixivium causticum.

(*Liquor Kali caustici*).

Rec. Alkali vegetabilis aëratı depurati. Libras duas.

In vas ferreum immıssis affunde

Aquae communis fervidae Decuplum;
tunc successiveingere

Calcis ustae pulveratae, Libras tres.

Coque per horae quadrantem, agitando spathula. Si Liquor, cum Acido quocunque mixtus, ullam producat effervescentiam, Calx usta est addenda. Cola per linteum. Liquor in lagenas vitreas obturatas immıssus, postquam subsederit, decanthetur et evaporet, donec ejus Unciae quatuor compleant vas, quod capax foret Unciarum trium Aquae simplicis. Serva in lagenis vitreis obturatis.

Magisterium Bismuthi.

(*Bismuthum Oxydatum album*).

K 5

Rec.

Rec. Bismuthi puri, Uncias duas,
 Spiritus Nitri acidi, Libram dimidiam,
 vel quantum satis ad solvendum.

Bismuthum grossiuscule contusum Spiritui Nitri successiveingere, solutum Aquae dimidio dilue, filtra, et in vas vitreum, Aquae limpidae circiter Libras viginti jam continens, effunde. Bismuthum, per Aquam praecipitatum, quam optime edulcora, et loco calido, radiis solaribus non exposito, sicca et ferva.

Magnesia alba, *ſ.* Magnesia Salis amari.

(*Magnesia carbonica*).

Rec. Salis amari Saidschützensis, vel Anglici,
 crySTALLIFATI, Libras decem,

Alcali mineralis, Libras duodecim.

Solvantur seorsim in Duplo Aquae ferventis. Soluta filtrata in lebetes stanneo commisceantur, atque continue agitentur spatula lignea. Post ebullitionem per horae quadrantem, mixtura diluatur Aqua fervida, et per linteum coletur. Magnesia in linteo remanens edulcoretur, et leni calore perfecte siccetur.

Nota. Sit albissima, subtilissima, perquam levis, odoris et saporis expers, etiam cum Salis Ammoniaci pauxillo trita sine odore volatili, in sufficiente Spiritus Vitrioli quantitate sub effervescencia perfecte solubilis, absque nubeculis, aut sedimento. Rejiciatur Magnesia saporis falsi, quippe non satis edulcorata, sed Sale alcalino, aut Acido Salis, inquinata, nec non, quae solutione turbida Terram calcaream manifestat, quaeque non prorsus solubilis Terram gypseam

gypseam, filiceam, aluminosam, vel argillaceam prodit, quarum praesentia analysi chemica, ope reagentium, ulterius probanda.

Magnesia calcinata.

(*Magnesia usta*).

Magnesia alba in crucibulo tecto, igne fortiori uratur per horam. Frigefacta in vitro obturato servetur.

Nota. Hac methodo non, ut alias solet, pars tertia, sed dimidia obtinetur. Signa probitatis cum illis Magnesia albae eadem sunt. Cum Acidis praeter ea non effervescat, cum Aqua non incalescat, neque in ea, nisi minima ex parte, solvatur.

Mel despumatum.

Rec. Mellis communis, Libras sedecim,

Aquae communis, Libras octo.

Coquantur in vase stanneo, et spuma in superficie orta auferatur cochleari despumatorio. Coletur per manicam, e panno confectam, et inspissetur ad Syrupi consistentiam.

Mel rosatum.

Rec. Florum Rosarum incarnatarum siccatorum,
Uncias octo,

Affunde

Aquae communis fervidae, Libras quatuor.
Macera per noctem, cola et cum

Mellis

Mellis despumati Libris octo,
leni igne, ad Syrupi spissitudinem coque.

Mercurius dulcis, vulgo Calomelas.

(*Hydrargyrum muriaticum mite*).

**Rec. Mercurii sublimati corrosivi, Uncias quin-
decim.**

In mortario vitreo, aut lapideo, caute, ac Spiritus
Vini aliquot Guttas subinde inspergendo, pulveratis
adde

Mercurii vivi puri, Libram unam.

Terantur diutissime, et exactissime misceantur,
donec nulli Mercurii globuli conspiciantur, et mixtu-
ra colorem cinereum referat. Immittatur in cucurbi-
tam vitream oblongam satis capacem; hinc balneo are-
nae commissa lege artis sublimetur. Massa sublimata
purior conteratur, et denuo sublimetur. Tunc in pul-
verem subtilissimum trita abluatur, et edulcoretur affu-
sa Aqua destillata simplici fervente, deiu siccet, et
in vasis vitreis bene obturatis fervetur.

Nota. Rite paratus Mercurius dulcis nigrescat in
Aqua Calcis, quacum Aquam mercurialem mitem
exhibeat. Decoctus cum Alcohole Vini, aut cum
Aqua, in qua Salis Ammoniaci Pars decima sexta
soluta fuerit, nec solubilis fit, nec saporem huic
Decocto conciliet. Neque a Cupro, huic fluiditati
commisso, Mercurius metallicus, nec ab Alkali vo-
latili praecipitatum album, neque ab Aqua Calcis
aurantiacum subsideat.

Mercurius nitrosus.

(*Liquor Hydrargyri nitrici*).

Rec. Mercurii vivi puri, Unciam unam.

Dige

Digerendo leni calore solve in
Spiritus Nitri acidi puri, quantitate sufficiente.
Soluto adde
Aquae destillatae simplicis, quantum requiritur,
ut Liquoris sint Unciae quatuor.

Mercurius phosphoratus.

(*Hydrargyrum phosphoricum*).

Rec. Mercurii vivi puri, quantum placet.

Coquendo solve in

Spiritus Nitri acidi, quantitate sufficiente.

Instilla

Sodam phosphorata

in Aqua destillata simplici solutam, et paucis Spiritus Nitri acidi Guttis acidulatam. Pulverem coloris albi praecipitatum ablue, sicca et ferva.

Nota. Coloris sit albi, saporis nullius, minimeque falsi, in Aqua fervida nec solubilis, nec flavo colore tinctus, neque cum Acido Vitrioli, aut Acido Salis, nec Mercurio sublimato, aut Alkali volatili, inquinatus; quod reagentibus, in primis Terra ponderosa acido-nitrica, probatur.

Mercurius praecipitatus albus.

(*Hydrargyrum muriaticum praecipitatum*).

Rec. Mercurii sublimati corrosivi,

Salis Ammoniaci, singulorum Uncias octo.

Solve in

Aquae destillatae simplicis calidae, Libris octo.

Filtra

Filtra et instilla

Alcali minerale, in Aqua solutum. Pulverem coloris albi praecipitatum lava et sicca.

Mercurius praecipitatus ruber.

(*Hydrargyrum oxydatum rubrum*).

Rec. Mercurii vivi puri, Uncias octo.

Solve in

Spiritus Nitri acidi, Libra una, vel quantum sufficit.

Solutionem in vase vitreo ad siccitatem coque. Massam pulveratam sub continua agitatione cum spatula vitrea, igne prudenter aucto, nec justos excedente limites, ure in vase vitreo, aut in fictili non vitreato, fundi latioris, usque dum rubicundum referat colorem.

Mercurius solubilis.

(*Hydrargyrum oxydulatum nigrum*).

Rec. Spiritus Nitri acidi, Libram dimidiam,

Aquae destillatae simplicis, Uncias duas,

Mercurii vivi puri, Uncias quatuor.

Mixta remaneant per aliquot dies in phiala leviter clausa, subinde agitando, donec Spiritus Nitri, sine ignis calore, Mercurio saturatus sit. Liquori limpido à Mercurio restante decanthato, et Aqua destillata diluto, sensim instilla

Spiritum Salis Ammoniaci cum Calce,

tam diu, nec ultra, quam praecipitatum inde natum colore nigro apparet. Pulverem subsidentem Aqua destillata perfecte ablue, sicca, et in vitro obturato serva.

Nota.

Nota. Sit coloris sammetino-nigri, solubilis in Aceto bulliente, in vasis clausis supra ignem penitus aevolans, in Mercurium vivum quoque reducibilis.

Mercurius sublimatus.

(*Hydrargyrum muriaticum corrosivum*).

Rec. Mercurii vivi puri, Libram unam,

Olei Vitrioli, Uncias viginti.

Fiat destillatio ex retorta vitrea in balneo arenae ad ficcum. Massam remanentem tritam caute misce cum

Salis culinaris ficcati, Pari pondere.

Tunc e cucurbita vitrea, ad tertiam tantum partem repleta, igne initio moderato, sub finem aucto, sublima. Massam sublimatam crySTALLINAM provide serva.

Nota. Sit coloris albi, saporis austero-metallici, acerrimi, valdeque corrosivi, supra ignem prorsus aevolans, in Aqua Calcis colore aurantiaco subsidens.

Mercurius vivus depuratus.

Immitte Mercurii vivi Libram unam in retortam minorem, cujus collum pedem unum cum dimidio aequet. Retortam in sartagine fusoria arenae superimpone, ventrem arena circumda. Sartaginem committe furno anemio minori, ita, ut rostrum ejus pollices aliquot emineat supra furni marginem. Adplica retortae excipulum Aqua sic repletum; ut retortae collum aliquot tantum pollices ab Aqua distet. Tunc sartagine prunis circumdata ignem auge, usque dum Mercurius ebulliat, qui forma vaporis in collo retortae collectus in excipulo praecipitabitur, fordibus in

in retorta relictis. Finita destillatione effunde Aquam supernatantem Mercurio, quem in vase porcellaneo collige, moderato calore sicca, per amiculum chartaceum, in apice acicula perforatum, trajice, et in vasis obturatis serva.

Mixtura simplex.

(*Mixtura pyro-tartarica*).

Rec. Spiritus Angelicae compositi, Libram unam,
Tartari, Uncias octo.

Mixtis sensim instilla

Olei Vitrioli rectificati, Unciam unam.

Serva.

Moschus artificialis.

(*Resina Succini balsamica*).

Rec. Olei Succini rectificati albi, Drachmas duas.

Immitte in calicem vitreum, et guttatim affunde

Spiritus Nitri acidi, Drachmas quinque.

Stent simul per horas viginti quatuor. Resina coloris aurantiaci Aqua frigida iterato abluatur, donec Acidum disparuerit. Serva.

Mucilago Radicis Altheae.

Rec. Radicis Altheae concisae, Unciam unam.

Coque cum

Aquae communis, Unciis octo,

donec supersint Unciae duae.

Cola.

Muci

Mucilago Gummi Arabici.

Rec. Gummi Arabici, Unciam unam,
Aquae destillatae simplicis, Uncias tres.
Fiat Mucilago.

Mucilago Seminis Cydoniorum.

Rec. Seminis Cydoniorum, Unciam dimidiam.
Affunde
Aquae Rosarum, Uncias quatuor,
et leni calore extrahe Mucilaginem.

Naphtha Aceti.

(*Aether aceticus*).

Rec. Terrae foliatae Tartari, blando calore exsiccat
tae, Libram unam.

In retortam vitream immissae affunde

Olei Vitrioli, Libram dimidiam,
antea cum

Spiritus Vini rectificatissimi Unciis decem
mixtam. Vasorum juncturis probe clausis, fiat destil-
latio leni igne. Liquori elicito adde

Aquae communis Partem quartam,

Lixivii caustici, quantum requiritur ad promo-
vendam separationem Naphthae, quam blando calore
rectifica, et in vitro bene obturato ferva.

Nota. Odore et sapore grato et refrigerante praedita
Aquam supernatet, in cujus Partibus septem solvas-
tur; valde volatilis et inflammabilis urat flamma
caeruleo-flava; Tincturam Laccae caeruleam rubor
re non tingat.

Naphtha Vitrioli.*(Aether sulphuricus).*

**Rec. Olei Vitrioli, Libras duas cum dimidia,
Spiritus Vini rectificatissimi, Libras duas.**

Spiritui Vini in cucurbita successive et cante instilletur Oleum Vitrioli. Adaptetur alembicus cum excipulo satis capaci, et juncturis bene clausis instituaturn destillatio ex arenae, aut tutius ex cinerum, balneo, calore remissiori. Ab ulteriori destillatione desistendum est, quam primum Liquor stillans Acidum vitriolicum redolet. Residuo tunc affundatur

Spiritus Vini rectificatissimi, Libra una.

Fiat destillatio uti antea; quae operatio cum simili Spiritus Vini quantitate, bis adhuc potest repeti.

Liquoris aetherei, destillationibus his repetitis obtenti, Partibus duodecim addantur

Aquae communis Partes tres,

Lixivii caustici Pars una.

Naphtha supernatans a reliquo fluido separetur, et rectificetur calore blandissimo, quamdiu purissimus et fragrantissimus transit.

Nota. Sit coloris aquei, odoris gratissime fragrantis, saporis subdulcis, penetrantis et refrigerantis; solvat Olea aetherea et unguinosa, Resinas, Saponem, Ceram; innatet Aquae pauxillo, penitus autem recipiatur ab Aquae Partibus decem.

Nitrum depuratum.*(Kali nitricum).*

Rec. Nitri crudi, Libras viginti.

Solve in

Aquae

Aquae destillatae simplicis, Libris quadraginta.

Solutionem filtra, evapora aliquantulum, et seponere loco frigido. CrySTALLI magnae obtentae, quarum primae et secundae optimae, supra chartam siccentur:

Oleum Absinthii aethereum.

Rec. Summitatum Absinthii vulgaris, cum semine fere maturo, modice siccatarum, Libras duodecim,

Aquae communis Octuplum.

Fiat destillatio ex vesica, sub continua Aquae ebullitione, quamdiu Aqua Oleo gravida prodit. Obtentum Oleum separetur. Aqua stillatitia supra novam Absinthii copiam, addendo Aquae communis quantitatem sufficientem, destillet, et Oleum auferatur; haec operatio toties repetatur, donec Olei desiderata quantitas obtenta fuerit.

Eodem modo parantur:

Oleum Baccarum Juniperi;

Corticum Aurantiorum;

Florum Lavendulae;

Herbae Majoranae;

Menthae crispae;

piperitae;

Origani Cretici;

Roris marini;

M 2

Oleum

Oleum Herbae Sabinae ;
Tanaceti ;
Radicis Valerianae filvestris ;
Seminis Anisi ;
Carvi ;
Cumini ;
Foeniculi.

Nota. Olea aetherea genuina odore forti, volatili, penetrante specifico Plantarum, sapore fragrante aromatico, nonnunquam dulci, praedita, in Alcohole Vini penitus solvantur; guttulae in chartam demissae, supra ignem calefactam, avolent, macula pingui non remanente.

Oleum Absinthii per infusionem paratum.

Rec. Herbae Absinthii vulgaris, Libram unam.

Affunde

Olei Olivarum puri, Libras tres.

Sepone in vase tecto locoque modice calido per dies quatuor. Expressum Oleum cum

Herbae Absinthii Libra una iterum, vel tertia vice renovata Herba, digere, per chartam emporeticam albam cola, et in loco temperato provide ferva.

Adhibito majori vel minori calore, aut frigore, pro diversa plantarum qualitate, similiter parentur:

Oleum

Oleum Chamomillae vulgaris ;

Hyoscyami ;

Hyperici ;

Menthae.

Nota. Oleis coctis praestare hac encheiressi per infusionem parata Olea videbantur. In rancorem itidem prona, majori quantitate non sunt paranda.

Oleum Amygdalarum.

Ex Amygdalis recentibus contusis et cilicio inclusis, preli laminis, in Aqua fervente tepefactis, exprime Oleum.

Eodem modo paratur

Oleum Seminis Lini.

Oleum animale aethereum.

In cucurbita, collo amplo et longo instructa, infundantur Olei empyreumatici animalis Librae duae supra Carbonis puri Libram dimidiam, cavendo ne collum cucurbitae inquinetur Oleo. Adaptetur alembicus cum excipulo, juncturae claudantur vesica madida, ac glutine farinaceo. Tunc fiat tam diu destillatio, lenissimo balnei arenae calore, quam Oleum tenue, coloris expers, elicatur. Immittatur illico in vitra, Drachmarum circiter duarum capacia, obturamento vitreo et vesica madida munita, atque sub Aqua demersa,

Oleum Cerae.

Rec. Cerae flavae rasae,
Calcis ustae pulveratae, singulorum Libram
unam.

Fiat destillatio e retorta vitrea, balneo arenae
commissa. Oleum elicited nova destillatione supra
Calcis ustae Libram dimidiam
rectifica, et serva.

Oleum Chamomillae aethereum.

Rec. Florum Chamomillae vulgaris sine Stipitibus,
modice ficcatorum, Libras sexaginta.

In vesicam destillatoriam immixtas impraegna

Olei de Cedro Uncia una;

adde

Aquae communis, quantitatem, sufficientem,
et fiat destillatio. Oleum colore saturate caeruleo ac
specifica Chamomillae fragrantia praeditum, ab Aqua
stillatitia separa, ac serva.

Nota. Ob lentam Olei Chamomillae fluiditatem, qua
illius separatio ab Aqua, cum qua stillavit, impedi-
tur, hanc modicam Olei de Cedro copiam adhibere
licet.

**Oleum Nucistae, s. Nucis moschatae
expressum.**

Rec. Nucum moschatarum, quantum placet.

Contusas, et sacculo cannabino inclusas, Aquae
bullientis vapore impraegna, et prelo, laminis Aqua
fervida calefactis, exprime Oleum.

Oleum

Oleum Ovorum.

Rec. Ovorum recentium, coctione in Aqua indurac-
torum, quantum placet.

Vitelli exempti in sartagine munda leni calore agi-
tentur ope pistilli lignei, donec rufescant, et pingue-
dinem sudare incipiant; tunc, sacculo cilicino inclusos,
prelo subjice. Oleum expressum in vitro obturato serva.

Oleum Succini.

Oleum destillatione Salis Succini obtentum,
cum Aquae Sextuplo mixtum, e retorta vitrea, su-
pra Carbonem purum, leni igne destillando rectifi-
ca ad albedinem, et serva.

Oleum Terebinthinae.

Rec. Terebinthinae communis clarae, quantum
placet.

Post affusam Aquae communis sufficientem quan-
tatem, destillationi tam diu subjice, quam prodit
Oleum.

Oleum Vitrioli depuratum.

Oleum Vitrioli venale ad praeparanda medica-
menta plerumque quidem satis aptum est. Usui autem
interno dicatum antea rectificetur.

Coquantur ergo Olei Vitrioli Librae aliquot,
in retortam vitream, cui excipulum addendum, im-
missae, ad perfectam albedinem. Hujus Acidi Un-
ciae decem, aut duodecim, ope infundibuli vi-
trei longi, effundantur in retortam Unciarum

octodecim capacem, positam in crucibulo, et circumdatam arena. Crucibulum committatur furno anemio; retortae adaptetur excipulum satis capax, absque luto. Igne circumspecte aucto, ne vas recipiens, vel retorta, dirumpatur, parte crucibuli inferiori excandescente vapores sensim in vas recipiens transeant, et guttatim lenteque praecipitentur. Acidum destillatum in vitris, obturamento vitreo munitis, fervetur.

Oxymel scilliticum.

Rec. Aceti scillitici, Libram unam,
Mellis despumati, Libras duas.

In vase stanneo coquantur ad Mellis liquidi consistentiam,

Oxymel simplex.

Rec. Aceti crudi, Libram unam,
Mellis despumati, Libras duas.

Misce, et in vase stanneo coque ad Mellis liquidi consistentiam.

Pasta Altheae.

Rec. Radicis Altheae mundatae, grossiuscule concisae, Uncias quatuor.

Affundantur

Aquae fervidae, Librae octo.

Stent per noctem. In colatura solvantur

Gummi Arabici electi,

Sacchari albissimi, singulorum Librae duae.

Colentur

Colentur, et continue spatula lignea agitande, evaporent leni calore ad Mellis spissitudinem. Massa ab igne remota agitetur multum ac celeriter, ut albescat; cui admisce

**Albumina Ovorum recentium in spumam
quassata, Numero duodecim,
Aquae Naphae, Uncias duas.**

Detineatur adhuc per breve tempus super ignem, tandem effundatur in capsulas papyraceas, et loco calido penitus exsiccentur. In taleolas scissa fervetur
Pasta.

Pasta Liquiritiae.

**Rec. Radicis Liquiritiae decorticatae, [grossiuscule
concisae, Uncias quatuor.**

Macera per noctem in

Aquae fervidae, Libris octo.

In infuso colato solvantur

**Gummi Arabici electi, Librae duae cum
dimidia,**

**Sacchari albissimi, Libra una cum dimi-
dia.**

Colatura leni igne, sine agitatione et caute evit-
tando empyreuma, evaporet, donec gutta disco vitreo
instillata gelatinae instar appareat. Tunc detracta pel-
licula effunde in cistulas planas, e laminis ferreis
Stanno obductis paratas, et tantillo Olei Amygdala-
rum inunctas. Pastam modico calore sufficienter ex-
siccatam, et in taleolas scissam, serva.

Phosphorus.

Acidum phosphoricum, ad ficcum evaporatum, exacte misceatur cum dimidio pondere **Pulveris Carbonum**. Mixta ingerantur in retortam terream lorricatam. Adplicetur vas recipiens, tubulo parvo in parte superiori instructum, et sufficiente copia **Aquae repletum**. Juncturis optime clausis fiat destillatio igne furni anemii aperto, et gradatim aucto.

Phosphorus elicited, si nondum satis purus appareat, iterum destillet e retorta vitrea, blando arenae calore, in excipulum sufficiente **Aquae copia repletum**.

Pilulae balsamicae; s. polychrestae,
s. ecphracticae.

Rec. Extracti Chamomillae vulgaris, Unciam
dimidiam,

Aloes,
Myrrhae,

Ammoniacy depurati, singulorum Drachmas
duas.

Misce, fiat Massa pilularis.

Pilulae purgantes cum Mercurio.

Rec. Saponis Jalappini, Partes quinque,
Mercurii dulcis, Partem unam.

Misce, fiat Massa pilularis.

Pulpa Cassiae.

Rec. Fistularum Cassiae, quantum lubet.

Medula

Medullam cum seminibus et dissepimentis e fistulis diffractis, cultelli eburnei ope exemptam, macera in Aqua calida, tere per cribrum setaceum, et blando calore ad debitam consistentiam evapora. **Singulis Pulpae Libris admisce**

Sacchari albi pulverati, Uncias duas.

Serva.

Pulpa Prunorum.

Fructus Pruni domesticae maturi, exemptis nucleis, coquantur ex Aqua in vase porcellaneo, aut figulino non vitreato, ad mollitiem. Liquidum per cribrum setaceum trajectum evaporet ad debitam consistentiam. **Singulis Pulpae Libris addantur**

Sacchari albi pulverati, Unciae duae.

Serva.

Eodem modo paratur

Pulpa Tamarindorum.

Nota. Pulpae in vasis cupreis, Stanno purissimo non bene obductis, paratae, Cupro inquinantur, quod prodit spatula ferrea polita, in calefacta pulpa aliquamdiu agitata, tum rubigine tincta.

Pulvis analepticus, ꝑ. cordialis, ꝑ. nobilis Cellensis.

Rec. Sacchari albi, Uncias tres,

Cinnabaris factitiae, Unciam dimidiam,

Olei Cinnamomi, Drachmam dimidiam.

Misce, fiat Pulvis. Serva.

Pulvis

Pulvis antispasmodicus, s. temperans
ruber.

Rec. Nitri depurati,
Tartari vitriolati, singulorum Uncias duas,
Cinnabaris factitiae, Scrupulos quatuor.
Misce, fiat Pulvis.

Pulvis dentifricius.

Rec. Cremoris Tartari, Uncias quatuor,
Radici Iridis Florentinae pulveratae, Un-
cias duas,
Myrrhae,
Sanguinis Draconis, singulorum Unciam
unam,
Olei Caryophyllorum, Guttas quadraginta.
Misce, fiat Pulvis.

Pulvis eccoproticus, vulgo digestivus.

Rec. Magnesia albae,
Cremoris Tartari,
Radici Rhabarbari pulveratae, singulorum
Unciam dimidiam,
Flavedinis Corticum Aurantium, Grana
triginta sex.
Misce, fiat Pulvis.

Pulvis Infantum.

Rec. Magnesia albae, Unciam unam,
Radi-

Radicis Rhabarbari pulveratae, Drachmas
duas,
Pulveris analeptici, Drachmam dimidiam.
Misce, fiat Pulvis.

Pulvis Ipecacuanhae compositus,
***vulgo* Doweri.**

Rec. Tartari vitriolati, Unciam unam,
Opium pulverati,
Radicis Ipecacuanhae pulveratae, singulorum
Drachmam unam.

Misce exactissime.

Nota. Pulveris hujus Grana decem continent Opium
Granum unum.

Pulvis Nutricum.

Rec. Magnesia albae, Unciam unam,
Flavedinis Corticum Aurantium,
Seminis Foeniculi, singulorum Drachmas
duas.

Misce, fiat Pulvis.

Pulvis refrigerans.

Rec. Salis essentialis Tartari, Unciam dimidiam,
Sacchari albi, Libram dimidiam,
Olei de Cedro, Guttas tres.
Misce, fiat Pulvis.

Pulvis

Pulvis Sennae compositus.

Rec. Pulveris Foliorum Sennae,

Seminis Anisi vulgaris,

Sacchari albi,

Cremoris Tartari, singulorum **Unciam unam.**

Misce, fiat Pulvis.

Pulvis sternutatorius.

Rec. Pulveris Herbae Majoranae,

Meliloti, singulorum **Uncias**

tres,

Mari veri,

Radicis Iridis Florentinae,

Florum Liliorum Convallium, sin-

gulorum **Unciam unam.**

Misce, fiat Pulvis.

**Pulvis stomachicus, s. Ari
compositus.**

Rec. Pulveris Radicis Ari, **Uncias duas,**

Calami,

Pimpinellae albae, singula-

rum **Unciam unam,**

Corticis Cinnamomi, **Unciam di-**
midiam,

Alcali vegetabilis aëratı depurati, **Drach-**
mas duas.

Misce, fiat Pulvis.

Pulvis

Pulvis temperans albus.

Rec. Tartari vitriolati,

Nitri depurati, singulorum Par pondus.

Misce, fiat Pulvis.

Nota. Pulveres non in mortariis metallicis, nisi in ferreis, Salia autem in marmoreis, vel serpentinis, terantur; usui interno dicati subtilissime laevigentur, compositi exacte misceantur, atque ingredientium proprietatibus, odore, sapore, cet. sint praediti. Din asservati efficaciae minoris, v. c. Ipecacuanhae, Rhabarbari, cet. restricta quantitate sunt parandi.

Regulus Antimonii.

(*Stibium purum*).

Rec. Frustulorum Ferri puri, Uncias sex.

Committe crucibulo satis capaci, ac igne intenso furni anemii urge, ut candescant, tunc adde

Antimonii crudi, grossiuscule comminuti, **Uncias octodecim.**

Liquefiant; liquatis sensim injice

Nitri depurati, quam maxime ficci, **Uncias quatuor,**

ac ubi Aquae instar fluxerint, effunde in conum fusorium, leniter concutiendum, quo subsidat Metallum reductum. Hoc refrigeratum a scoriis separa, et in pulverem redige. Admisce

Nitri depurati pulverati, quam maxime ficci, **Partem octavam,** tunc igne validiori colliqua, et in conum fusorium transfunde. Post refrigerationem Metallum purum a scoriis separa.

Refina

Refina Jalappae.

Rec. Radicum Jalappae, quantum vis.

In pulverem grossiusculum redactis affunde

Spiritus Vini rectificati, quantum fatis, ut

Radices contegat.

Digerantur leni calore per horas quadraginta octo.

Exprimantur Radices, et alia Spiritus quantitate denuo digerantur per heras viginti quatuor.

Ex tincturis commixtis et filtratis, post additam Aquae quartam circiter partem, e balneo Aquae destillando eliciatur Spiritus Vini. Refina subsidens abluatur Aqua fervida, et exsiccetur in Aquae balneo.

Eodem modo paratur

Refina Ligni Guajaci.**Roob Juniperi.**

(*Succus Juniperi inspissatus*).

Baccae Juniperi maturae recentes conquassatae coquantur ex Aqua communi, donec mollescant; tunc modice exprimantur. Succus expressus, ad consistentiam Mellis calore moderato inspissetur.

Roob Sambuci.

(*Succus Sambuci inspissatus*).

Rec. Succis e Baccis Sambuci maturis expressi et defaecati, Libras octo,

Sacchari albi, Libram dimidiam.

Modico igne coquantur ad Mellis spissitudinem.

Rotu

Rotulae Menthae piperitae.

Rec. Sacchari albissimi pulverati, Libram dimidiam.

Coque cum

Aquae Menthae piperitae, quantitate sufficiente.

Adde

Sacchari albi pulverati, Drachmam dimidiam,

cum

Olei aetherei Menthae piperitae Guttis triginta

tritam; et illico massam a spatula laminae ferreae guttatim instilla, ut fiant Rotulae.

Sal Absinthii citratum.

(Kali citratum).

Rec. Alkali vegetabilis aëрати depurati, quantum vis,

Succi Citri recentis, quantum ad saturationem requiritur.

Liquor seponetur per aliquot dies; tunc a faecibus decanthatus, in lebete stanneo ad quartam circiter partem evaporet, per chartam coletur, et in vase porcellaneo, balnei aquae calore, exsiccetur.

Sal Alkali minerale.

(Natrium carbonicum crystallisatum).

Rec. Sodae, quantum placet.

N

Contra

Contrita solvatur in Aqua fervida. Lixivium filtratum et ad crySTALLIFICATIONIS punctum evaporatum, seponatur loco frigido, ut crySTALLOS dimittat, quae tam diu colligantur, quam purae prodeant.

Sal Ammoniacum depuratum.

(*Ammonium muriaticum depuratum*).

Sal Ammoniacum, quale prostat, tritum supra chartam colatoriam et linteum expansum Aqua superfundatur; solutione frigefacta crySTALLI colligantur et ferventur.

Sal Ammoniacum fixum.

(*Calcaria muriatica*).

Rec. Calcis purae, aut Testarum Ostrearum depuratarum, quantum vis.

Solve in

Spiritu Salis acidi, filtra et in vase vitreo, aut porcellaneo, evapora. Sal ficcum adhuc calens statim in vitro clauso serva.

Obtineri etiam potest ex residuo e sublimatione Alkali volatilis ficci, ope Cretae peracta, residuum in Aqua solvendo, et Liquorem filtratum limpidum evaporando, donec exsicceetur.

Sal Anglicum depuratum.

Salis Anglici amari venalis quantum placet solvatur in pari pondere Aquae fervidae, filtretur, et in crySTALLOS redigatur.

Sal essenziale Tartari.

(Acidum tartaricum).

Rec. Cremoris Tartari, Libras septem,
 Aquae communis, ferventis, Libras viginti
 quatuor.

In lebetem stanneum immixtis sensim adjiciantur
 Cretae purae pulveratae, Librae duae,
 vel quantum sufficit ad perfectam saturationem. Vas
 ab igne remotum, seponatur per horam, et liquor su-
 pernatans, Tartarum tartarizatum continens, caute
 decanthetur. Calci tartaricae residuae, Aqua frigida
 ablutae, addantur

Olei Vitrioli, Librae duae,
 Aquae communis Libris viginti
 dilutae. Spathula lignea saepius agitando, digerantur
 per horas viginti quatuor. Decanthato liquore acido
 Gypsum residuum Aqua abluere, donec plane insipida
 fiat. Liquores acidi commixti et filtrati evaporent in
 vase vitreo, aut porcellaneo, ut maneant Librae
 circiter octo; refrigerati filtrentur, et tandem in a-
 quae balneo in crysallos redigantur, quae siccatae ser-
 ventur.

Nota. Sit coloris albi, saporis acidi puri, in aëre
 non humescens, in Aqua prorsus solubile; solutio
 ejus a Sale Acetosellae turbata, Selenitem prodit;
 si praecipitatum, ab admixta Terra ponderosa aceta-
 ta oriundum, non penitus solvitur ab Acido Nitri,
 itidem Selenite, vel Acido Vitrioli, inquinatum est;
 comburat in igne, relicto Cineris aut Carbonis pau-
 xillo, fatuo, et in Aqua insolubili.

Sal Seignette.*(Tartarus natronatus).***Rec.** Alkali mineralis crySTALLISATI, quantum placet.

Solve in

Aquae fervidae Octuplo.

Lixivio in vase stanneo ebullienti sensim adde

Cremoris Tartari, quantum satis ad saturandum.

Liquorem per chartam colatum evapora, et ad crySTALLISANDUM sepone. CrySTALLOS collectas et siccatas ferva.

Nota. CrySTALLOS exhibeat majores, pellucidas, in aëre farinescentes, saporis leniter salini, haud ingrati, in Aquae Quadruplo prorsus solubiles. Sale digestivo, vel Tartaro vitriolato, non esse inquinatum probatur, si praecipitatum, ex solutione Salis cum solutione Plumbi nitrico-acida mixta obtentum, in Acido Nitri perfecte solvitur.**Sal Succini.***(Acidum succinicum).***Rec.** Succini, grossiuscule contusi, quantum vis.

Fiat destillatio e retorta vitrea satis ampla, igne primum lento et successive aucto. Prodebunt una cum Oleo, primum flavo, dein rubro, Liquor acidulus et Sal concretum; quibus addatur Aquae calidae sufficiens quantitas, ad Sal solvendum. Liquor acidus ab Oleo separatus, leniter evaporet, filtretur, et ad crySTALLISANDUM seponatur. CrySTALLI collectae depurentur solutione in Aqua calida et crySTALLIFICATIONE repetita.

Nota. CrySTALLI parvae, albae, odoris et saporis parum aciduli, super ignem in cochleari argenteo cum
odore

odore succinico prorsus avolantes, non relicto Sale, aut Carbone. Sal Succini adulteratum Nitro, Sale culinari, Tartaro vitriolato, Acido Vitrioli, Saccharo, Sale Ammoniaco, vel Acetosellae, super prunas detonat, vel decrepitat, Saccharum ustum redollet; praecipitatum, ab admixto Saccharo Saturni depurato oriundum, affuso Acido Nitri non penitus solvitur; porro cum Alkali fixo tritum odorem volatilem spirat, neque, ut genuinum, in Alcohole Vini prorsus solvitur.

Sal Tartari;

Alkali vegetabile aëratum depuratum.

(*Kali carbonicum*).

Tartarus crudus vase idoneo inclusus uratur, donec sine flamma et fumo candeat. Residuum Aqua calida elixetur, Liquor coloris expers filtretur, et ad ficcum evaporet.

Eodem modo Alkali vegetabile aëratum extrahitur e massa carbonacea, ex destillatione Tartari residua.

Alkali vegetabile aëratum plurimis aptum usibus, at non omnibus, quibus Alkali e Tartaro paratum convenit, sequenti modo obtinetur:

Cineres clavellati, ut prostant, at Terra filicea soluta omnino non inquinati, in pari Aquae ferventis pondere solvantur, Liquor per chartam colatus evaporet, donec cuticula appareat, et per aliquot dies seponatur, ut Salia nentra in crystallos concrecant. Liquor alcalinus residuus effundatur, et evaporatione in Sal ficcum redigatur.

Alcali dictis modis paratum, majore quidem ex parte, sed non perfecte, Acido carbonico est saturatum. Perfecte saturatum obtinetur, solvendo illud in Aqua, Acido carbonico impraegnata, et solutum evaporando, usque dum cuticula appareat. Tunc Alcali post aliquot dies transit in crystallos, Acido carbonico in totum saturatas.

Nota. Sit saporis blandi, non urentis, insolubile in Alcohole Vini, facile crystallisandum, non deliquescent, Gas acidum carbonicum minime alterans.

Sal volatile Cornu Cervi.

(*Ammonium carbonicum pyro-oleosum*).

Rec. Cornuum Cervi, vel aliorum Ossium purgatorum, quantum vis.

Diffecta, et in retortam tubulatam ferream, aut figulinam immissa, adaptato excipulo amplo cum tubo intermedio, igne aperto gradatim aucto ure. Sal concretum una cum Liquore salino et Oleo foetido inde productum collige, cum Duplo Cretae siccae pulveratae misce, e retorta vitrea, balnei arenae calore, sublima, et in vase obturato ferva.

Sapo antimonialis.

(*Sapo stibiatus*).

Rec. Sulphuris Antimonii aurati, Unciam unam.

Solve digerendo in sufficiente quantitate

Lixivii caustici.

In liquido, triplo Aquae destillatae diluto, dissolve

Saponis medicati rasi, Libram dimidiam.

Evapora

Evaporent leni igne ad Massae pilularis consistentiam; addendo, si massa adhuc rubet, tantum

Lixivii caustici, quantum satis est, ut colorem ex albido cinereum induat.

Sapo guajacinus.

Lixivio caustico, duplo Aquae diluto, et leniter ebullienti, sub continua agitatione, insperge successive

Pulveris Resinae Guajaci nativae, quantum illo solvi potest. Liquorem cola et leni calore ad Massae pilularis consistentiam inspissa.

Sapo Jalappinus.

Rec. Resinae Jalappae,

Saponis medicati, singulorum Uncias duas,
Spiritus Vini rectificati, quantum requiritur,
ut solvantur leni digestionem.

Tunc ad Massae pilularis consistentiam evapora.

Sapo medicatus.

Rec. Alkali mineralis,

Calcis ustae, singulorum Libras quatuor,

Aquae communis, Libras viginti.

Ebulliant semel. Liquor causticus per linteum colatus et in vase clauso subsidendo depuratus, evaporet, donec ejus Unciae octo compleant vas, quod capax sit Unciarum sex Aquae communis. Liquori frigefacto in vase figulino admisce

Olei Olivarum optimi Duplum.

Seponatur vas loco temperato, et agitetur massa per vices spathula lignea, donec homogenea appareat et spissescere incipiat. Effundatur tunc in cistas ligneas planas. Indurata scindatur in taleolas, loco temperato exsiccandas.

Soda phosphorata.

(*Natrum phosphoricum*).

Acido phosphorico, Aquae calidae Octuplo diluto, addatur sensim

Sal Alkali minerale, in Aqua solutum, donec Soda aliquatenus praevaleat. Liquor filtratus ad crystallifandum evaporet. Crystalli collectae in vase clauso ferventur.

Nota. Sapore falso puro absque amaritie praedita, in Aqua facile solubilis, Decoctum Curcumae flavum in fuscum mutat, atque in aëre Aqua crystallificationis et pelluciditate privatur.

Species ad Decoctum Lignorum.

Rec. Ligni Guajaci, Libras duas,

Radicis Bardanae,

Caricis arenariae,

Graminis,

Saponariae, singularum Libram unam,

Liquiritiae,

Ligni Sassafras, singulorum Libram dimidiam.

Concisa misceantur.

Species Diatragacanthae frigidae.

(Pulvis gummosus).

Rec. Pulveris Gummi Arabici, Uncias duas,

Tragacanthae,

Radicis Liquiritiae, singulorum Un-
ciam unam,

Sacchari albi, Uncias duas.

Misce fiat Pulvis.

Species emollientes.

(Species ad Cataplasma).

Rec. Herbae Malvae,

Meliloti,

Florum Chamomillae vulgaris,

Radicis Altheae,

Seminis Lini, singulorum Partes aequales.

Misce, fiat Pulvis.

Species pectorales.

Rec. Radicis Altheae, Uncias quatuor,

Liquiritiae,

Herbae Tussilaginis, singularum Uncias duas,

Florum Papaveris Rhoeados,

Verbasci, singulorum Unciam unam,

Sambuci,

Seminis Anisi stellati, singulorum Unciam
dimidiam.

Concisa misceantur.

Species resolventes.

Rec. Herbae Absinthii,
Meliloti,
Origani vulgaris,
Serpilli, singularum Uncias quatuor,
Menthae piperitae,
Florum Chamomillae vulgaris,
Lavendulae,
Sambuci, singulorum Uncias duas.
Concisa misceantur.

Spiritus Angelicae compositus.

(*Loco Spiritus theriacalis*).

Rec. Radicis Angelicae, Libram unam,
Herbae Scordii, Libram dimidiam,
Radicis Valerianae,
Baccarum Juniperi, singularum Uncias tres,
Spiritus Vini rectificati, Libras sex,
Aquae communis, quantum fatis.
Destillando eliciantur Librae sex.
In quibus solve
Camphorae, Unciam unam cum dimidia.
Serva.

Spiritus Cochleariae.

Rec. Herbae Cochleariae florecentis, Libras
duodecim,
Contusis

Contufis affunde

Spiritus Vini rectificati, Libras fex,

Aquae communis, quantum fatis.

Destillent Librae fex.

Spiritus Cornu Cervi rectificatus.

(*Liquor Ammonii pyro-oleofi*).

Liquor, ex deftillatione Cornu Cervi, ant Offium purgatorum, una cum Sale ficco et Oleo foetido obtentus et feparatus, rectificetur ex cucurbita vitrea, alembico munita, Partem dimidiam deftillatione, fupra Carbones facta, eliciendo.

Spiritus Formicarum.

Rec. Formicarum viventium, a quifquiliis mundatarum, Libras duas,

Spiritus Vini rectificati,

Aquae communis, fingulorum Libras quatuor.

Defstillando elice leni igne Libras quatuor.

Spiritus Lavendulae.

Rec. Florum Lavendulae ficcatorum, Libram unani,

Spiritus Vini rectificati, Libras quatuor,

Aquae communis, quantum fatis.

Post macerationem per viginti quatuor horas defstillando eliciatur Spiritus.

Eodem

Eodem modo paratur

Spiritus Roris marini, *ſ.* Anthos.

Spiritus Mastiches compositus.

(*Loco Spiritus matricalis*).

Rec. Mastiches,

Myrrhae,

Olibani, singulorum Uncias tres,

Spiritus Vini rectificati, Libras sex.

Macera per horas viginti quatuor, et destillando
elice Libras quatuor cum dimidia.

Spiritus Nitri dulcis.

(*Spiritus nitrico-aethereus*).

Rec. Spiritus Vini rectificatissimi, Libras duas,

Nitri acidi, Libram dimidiam.

Destillent ex retorta igne lenissimo Unciae vi-
ginti.

Spiritum elicitedum supra

Magnesia calcinatae Unciam dimidiam
rectifica, et serva in vitris clausis.

Nota. Odore et sapore grato et penetrante gaudeat,
cum Alcalinis non effervescat, Tincturam Laccae
caeruleam non decoloret; acescens rectificetur su-
pra Magnesium calcinatum. Minori quantitate parandus,
et ab aëris accessu caute defendendus est.

Spiritus Salis acidus.

(*Acidum muriaticum*).

Rec. Salis culinaris, Libras sex.

In retortam vitream capacem immixtis affunde
Olei Vitrioli, Libras quatuor,
caute antea dilutas

Aquae communis Libris totidem.

Adaptato vase recipiente amplo, cui insint

Aquae destillatae Librae duae,
et juncturis clausis fiat destillatio, igne primum remissiori, sub finem aucto, ad siccum. Liquidum elicium supra

Salis culinaris Libram dimidiam
rectifica, et ferva.

Nota. Sit limpidus, non flavescent, neque a Tinctura Gallarum sedimentum nigrum, neque flavum a Lixivio Cinerum clavellatorum, nec album a Terra ponderosa salita deponat; quibus observatis destilletur Spiritus supra Terrae ponderosae depuratae Unciam dimidiam, vel integram.

Spiritus Salis Ammoniaci anisatus.

(*Liquor Ammonii anisatus*).

Rec. Spiritus Vini rectificatissimi, Libram unam,
Olei Anisi aetherei, Unciam dimidiam.

Solutis adde

Spiritus Salis Ammoniaci cum Calce, Uncias tres.

Misce et ferva.

Spiritus Salis Ammoniaci aquosus.

(*Liquor Ammonii carbonici aquosus*).

Rec. Salis Ammoniaci, Libram unam,

Alcali

Alcali vegetabilis aëratı depurati, Libram
unam cum dimidia.

In retorta vitrea mixtis adde

Aquae communis, Libras quatuor.

Fiat destillatio leni calore, donec Aqua prodiens
crustam salinam, in excipulo antea obtentam, solverit.

Spiritus Salis Ammoniaci cum Calce.

(*Liquor Ammonii caustici*).

Rec. Calcis ustae, Libram unam cum dimidia.

Conspergantur Unciis circiter novem Aquae
calidae, ut per extinctionem perfectam fatiscant in
pulverem. Huic in cucurbitam, alembico et excipulo
amplo instructam, immisso adde

Salis Ammoniaci contriti, Libram unam,
Aquae communis, Libras tres.

Destillent leniter Librae duae cum dimidia, ut sint
Liquoris Librae tres, in vitris, obturamento vitreo
munitis, fervandae.

Spiritus Salis Ammoniaci vinosus.

(*Liquor Ammonii vinosus*).

Rec. Spiritus Vini rectificatissimi, Partes duas,

Spiritus Salis Ammoniaci cum Calce, Par-
tem unam.

Misce, et in vitro probe clauso serva.

Spiritus Salis dulcis.

(*Spiritus muriatico-aetherens*).

Rec.

Rec. Salis culinaris decrepitati, Uncias sedecim.

Magnesiae nigrae, Libram dimidiam.

In retortam immixtis adde

Olei Vitrioli, Libram unam,
antea cum

Spiritus Vini rectificatissimi Libris quatuor
mixtam. Destillent Librae tres.

Nota. Sit limpidus, odoris subdulcis, aromatici, sa-
poris ad Naphtham Nitri accedentis, atque Tinctu-
ram Laccae caeruleam non decoloret in rubram.

Spiritus saponatus.

Rec. Saponis Hispanici rasi, Libram unam,

Spiritus Vini rectificati, Libras tres,

Aquae Rosarum, Libram unam.

Digere et filtra.

Spiritus Tartari.

(*Liquor pyro-tartaricus*).

Rec. Tartari crudi, quantum vis.

Fiat destillatio ex retorta, ad dimidiam partem
repleta, aperto et sensim aucto igne, in excipulum
fatis capax et tubulo, per quem transeat Gas, impe-
tuoze prorumpens, instructum. Destillatione finita,
Liquorem elicatum ab Oleo foetido filtratione repetita
libera, et ferva.

Spiritus Vini camphoratus.

Rec. Camphorae, Unciam unam,

Spiri

Spiritus Vini rectificati, Libram unam.
Stent loco frigido, donec Camphora fuerit soluta.

Spiritus Vini rectificatus.

Spiritus Vini, uti prostat, bonae tamen notae, fermentatione vinosa et subsequente destillatione, e Frumento, Succo Uvarum, aut quocunque Vegetabili alio, obtentus, rectificetur tam diu, quam Aquae expers prodit.

Spiritus Vini rectificatissimus, *s.* Alcohol Vini.

Spiritus Vini rectificatus iterum ex aquae balneo tam diu destillet, quam Gossypium, Spiritu stillante madefactum et accensum, post Spiritus deflagrationem in cinerem vertatur.

Nota. Sit absque colore, odoris et saporis purissimi, facillime flammam accipiens, peracta combustione phlegmatis nihil prorsus relinquens. Pondus ejus, vitrum Unciae unius capax implentis, Drachmas sex et Grana quadraginta octo aequet.

Spiritus Vitrioli.

(*Acidum sulphuricum, s. vitriolicum dilutum*).

Rec. Olei Vitrioli rectificati, Partem unam.

Instillando misce cum

Aquae destillatae Partibus quinque.

Serva.

Spongia cerata.

Spongiae marinae tenues mundatae et exsiccatae immergantur Cerae flavae liquefactae, ac prelo fortiter exprimantur, et ubi resixerint, ferventur.

Sponz

Spongia usta.*(Carbo Spongiae).*

E Spongia marina mundata, ut Carbo purus, paratur.

Stannum praeparatum granulatum.

Rec. Stanni Orientalis, vel Anglici. puri,
quantum vis.

Liquefactum effunde in pyxidem ligneam crenatam, Creta superinductam, ac quantum potest, celerime succussa, ut pars Stanni liquidi in Granula minima vertatur. Residuum, demuo fufum, eodem modo redige in Pulverem grossiusculum, quem trajice per cribrum et ferva.

Sulphur Antimonii auratum.*(Sulphur stibiatum aurantiacum).*

Rec. Antimonii crudi praeparati,

Florum Sulphuris, singulorum Libram unam,

Lixivii caustici, quantum requiritur.

Mixta coque in lebete ferreo continue spathula movendo, et Aquam evaporatione consumtam interdum restituendo, usque dum paene dissoluta sint. Liquori, Aqua fervida diluto, et per chartam colato, successively adde

Spiritus Vitrioli

quantum sufficit ad praecipitandum; evites vero sedulo Gas noxium, in hac operatione emergens. Post horas viginti quatuor Aqua supernatans decanthetur, Praecipitatum Aqua tepida abluatur, denique lenissimo calore in loco umbroso siccetur et servetur.

Nota. Sit coloris dilute aurantiaci, odoris expers,
atque in igne prorsus avolans.

Sulphur auratum liquidum.

(*Liquor Saponis stibiati*).

Rec. Saponis antimonialis, Uncias octo,
Tincturae alcalinae,
Aquaе destillatae simplicis, singulārum Li-
bram unam.

Digerantur leni calore, subinde agitando Lique-
rem, quem filtratum serva.

Syrupus Altheae.

Rec. Radicis Altheae decorticatae, Uncias qua-
tuor,

Aquaе communis, Libras tres.

Coque, ut Unciae viginti septem supersint. In
Decocto colato dissolve

Sacchari albi, Libras quatuor.

Fiat ebullitione unica Syrupus.

Syrupus Berberum.

Rec. Fructuum Berberum maturorum, quantum
placet.

Conquassati stent per dies tres, tunc exprime
succum.

Hujus Succī, defaecatione depurati, Unciis vi-
ginti adde

Sacchari albi, Libras tres.

Semel ebulliēdo in lebetē stanneo fiat Syrupus.

Eodem

Eodem modo parantur:

Syrupus Cerasorum, ex succo Cerasorum
acidorum;

Mororum, ex Succo Fructuum Mo-
ri nigrae;

Ribium;

Rubi Idaei;

Acetositis Citri.

Syrupus Chamomillae.

Rec. Florum Chamomillae vulgaris recentium,
Libram unam,

Aquae communis fervidae, Libras duas.

Macera per noctem. Colaturae Unciarum viginti
adde

Sacchari albi, Libras tres.

Fiat ebullitione unica Syrupus.

Syrupus Cinnamomi.

Rec. Corticis Cassiae cinnamomeae, in pulverem
grossiusculum redacti, Uncias duas,

Aquae Cinnamomi vinosae, Libram unam,
Rosarum, Uncias duas.

Digerantur in vase clauso, loco tepido, per bi-
dnum. In Unciarum undecim colatura, calore blan-
do, solve

Sacchari albi, Libram unam cum dimidia.

Fiat Syrupus.

Syrupus Corticum Aurantiorum.

Rec. Corticum Aurantiorum ficcatorum, et a
substantia medullari mundatorum,
Uncias quatuor.

Concisis affunde

Vini albi Gallici, Libras duas.

Digere per biduum vase clauso, et exprime. Un-
ciis viginti post colaturam remanentibus adde

Sacchari albi, Libras tres.

Semel ebulliendo fiat Syrupus.

Syrupus Diacodii, ꝑ. Papaveris albi.

Rec. Capsularum feminalium Papaveris albi,
mediocriter maturarum, modice fic-
catarum, et a seminibus liberatarum,
Uncias sedecim,

Radiciis Liquiritiae concisae, Unciam unam,

Aquae communis fervidae, Libras octo.

Macera per noctem, et coque ad dimidium. Ex-
prime fortiter, cola, et adde

Sacchari albissimi, Libras quatuor.

Denuo coque ad spissitudinem Syrupi.

Syrupus emulsivus.

(*Syrupus Amygdalarum*).

Rec. Amygdalarum dulcium, Uncias octo,

amararum, Uncias duas.

Decorticatis, et in mortario lapideo pistilli lignei
ope contusis, sensim adde

Aquae

Aquae destillatae simplicis, Libras duas,
Naphae, Uncias duas.

In Emulsionis colatae Unciis viginti solve
Sacchari albissimi, Libras tres.
Calore lenissimo fiat Syrupus.

Syrupus Liquiritiae.

Rec. Radicis Liquiritiae concisae, Uncias octo,
Aquae communis ferventis, Libras tres.

Post macerationem coque leniter per quadrantem
horae. Liquor expressus evaporet, donec supersint
Unciae quatuordecim, quibus adde

Sacchari albi,

Mellis despumati, singulorum Libras duas.

Semel ebulliendo fiat Syrupus.

Syrupus Mannae cum Senna.

Rec. Foliorum Sennae, Uncias quatuor,
Seminis Foeniculi, Unciam dimidiam,
Aquae fervidae, Libras duas.

Stent in vase clauso per aliquot horas. In Lique-
ris expressi et colati Unciis septemdecim solve

Sacchari albi, Libras duas,

Mannae electae, Libram dimidiam.

Ebulliant semel, ut fiat Syrupus.

Syrupus Naphae, s. Florum Aurantiorum.

Rec. Aquae Naphae, Uncias decem,

Sacchari albi, Unciam unam cum dimidia.
Fiat Syrupus.

Syrupus Papaveris Rhoeados.

Rec. Florum Papaveris Rhoeados recentium,
Libram unam,

Aquae communis fervidae, Libras duas.
Macerare per noctem. In colatura Unciarum vi-
ginti fiat cum

Sacchari albi, Libris tribus
ebullitione unica Syrupus.

Syrupus Rhabarbari, *ſ.* Rhei.

(*Loco Syrupi Cichorii cum Rhabarbaro*).

Rec. Radicis Rhabarbari concisae, Uncias tres,
Alcali vegetabilis aëratı depurati, Drach-
mas duas.

Affunde

Aquae fervidae, Libras duas.

Digere per noctem. Colaturae Unciarum vi-
ginti adde

Sacchari albi, Libras tres.

Fiat Syrupus.

Syrupus Sacchari simplex, *ſ.* Saccharum
clarificatum.

Rec. Sacchari albi, Libras tres.

Solve in

Aquae destillatae simplicis, Unciis viginti,
ut fiat Syrupus.

Syrupus

Syrupus scilliticus.

Rec. Radicis Scillae parum ficcatae, **Unciam**
unam,

Zingiberis contusae, **Unciam** di-
midiam,

Herbae Hyssopi ficcatae, **Uncias** duas,
Aquae Hyssopi, **Libras** duas.

Macera vase vitreo clauso per horas viginti qua-
tuor. Liquorem exprimendo cola, et defaecato adde

Sacchari albissimi, **Libras** tres.

Paululum coquendo fiat Syrupus. **Serva.**

Syrupus Violarum.

Rec. Florum Violae martiae recentium, a calicu-
lis viridibus liberatorum, **Uncias** octo,
Aquae bullientis, **Libras** duas.

Macera in vase stanneo per horas duodecim. Li-
quoris colati **Unciis** viginti adde

Sacchari albissimi, **Libras** tres.

Ebullitione unica in vase stanneo fiat Syrupus.

Tartarus emeticus.

(*Tartarus stibiatus*).

Rec. Vitri Antimonii, subtilissime pulverati, **Li-**
bram dimidiam,

Cremoris Tartari triti, **Libram** unam.

Mixta, in cucurbita vitrea, aut in vase porcellae-
neo, arenae committe, et affunde

Aquae destillatae simplicis, Libras decem.

Massae bullienti pervices iterum affunde, ut evaporatum restituas, Aquae quantum satis. Solutione post horas duodecim, vel ad viginti quatuor, peracta, Liqueorem filtra, et in vase vitreo, aut porcellaneo, semper agitando, sub lenissimo ignis gradu ad ficcum evaporata, in pulverem redige, atque in vitro clauso serva.

Nota. Tartarus emeticus, coloris ex albo flavescentis, in Aqua destillata simplici perfecte solvitur, quae solutio Tincturam Laccae caeruleam colore rubello tingit, ab Alcalinis decomponitur, atque cum Hepate Sulphuris volatili, et Aqua hepatica acidulata, sedimentum deponit aureum. Ustus in lebete candente, vel supra prunas, Antimonium metallicum remanens cum Alkali vegetabili perhibet.

Tartarus solubilis.

(*Tartarus ammoniatus*).

Rec. Cremoris Tartari, quantum placet.

In vase stanneo

Aquae fervidae Octuplo
superfuso, adde per vices

Spiritus Salis Ammoniaci,
quantum ad perfectam saturationem requiritur. Liqueorem filtra, et in vase vitreo, aut porcellaneo, balneo arenae commisso, calore leni et sub finem admodum moderato, evapora, et Sal ficcum vitro obturato serva.

Tartarus tartarifatus.

(*Kali tartaricum*).

Rec. Alkali vegetabilis aëratı depurati, quantum
vis.

Solve

Solve in

Aquae fervidae Octuplo.

Adde successive

Cremorem Tartari tritum, donec effervescentia cesset. Liquorem rite saturatum filtra, et leni calore ad siccum evapora.

Nota. Obtinetur quoque Tartarus tartarizatus, quum paratur Sal essentielle Tartari.

Sit albus, saporis blande salini, in Aquae frigidae Partibus duabus cum quarta facillime solubilis. Decomponitur ab Acidis subsidente Cremore instar pulveris albi.

Tartarus vitriolatus, *ſ.* Arcanum duplicatum.

(*Kali sulphuricum*).

Massam salinam post destillationem Spiritus Nitri acidi remanentem in Aquae quantitate sufficiente coquendo solve, et simul Acidum, si abundat, cum Alkali vegetabili aërato depurato satura; Liquorem evapora, donec cuticula appareat, filtra et in crystallos redige.

Nota. Crystalli parvae, durae albae, subpellucidae, saporis amaricantis, aegre in Aqua, nunquam in Spiritu Vini solubiles. Cupro inquinatas esse, probat color caeruleus solutionis a Spiritu Salis Ammoniaci instillato; Vitriolum Zinci inesse, docet solutio Alkali vegetabilis soluto Tartaro vitriolato admixta, quo praecipitatum album obtinetur, quod elixatum, et in cochleari argenteo candefactum, colorem flavum, et quum refrixerit, albidum refert.

Terebinthina cocta.

Partem resinofam, quae ex destillatione Olei Terebinthinae remanet, ex aqua exemptam, aëri expose, donec indurescat.

Terra foliata Tartari.

(*Kali aceticum*).

Rec. Alkali vegetabilis aëрати depurati, quantum placet,

Aceti destillati, quantum ad saturationem requiritur.

Liquor in lebetе stanneo ad Libras circiter tres evaporatione redactus et filtratus, in vase vitreo, aut porcellaneo, in balneum aquae, aut supra arenam calidam, posito, ad siccum evaporet. Sal concretum statim, ne humidum quid attrahat, in vitro obturato ferva.

Nota. Deliquescit in aëre, solvitur tota in Alcohole Vini absque residuo. Nec Acido, nec Sale alcalino abundet; ergo solutio ejus neque Chartam Laccae caeruleam in rubram, nec Fernambuci rubram in violaceam mutet; solutio ab Aceto concentrato turbida Tartarum tartarifatam, a Terra ponderosa acetata autem Tartarum vitriolatum prodit; Aqua hepatica acidulata colore nigro Plumbum, Tinctura Gallarum fusco, vel nigricante, Ferrum manifestat.

Terra foliata Tartari crystallifata.

(*Natrum aceticum*).

Rec. Alkali mineralis, quantum vis,

Aceti destillati, quantum ad saturationem requiritur.

Liquor

Liquor filtratus et in vase stanneo ad crySTALLISATIONIS momentum evaporatus, loco seponatur temperato. Crystallos natos collige et ferva.

Nota. CrySTALLI albidæ, saporis subacris, pungentis, in aëre farineſcentes, in Aqua et Spiritu Vini facile solubiles.

Terra ponderosa depurata.

(*Baryta depurata*).

Rec. Spathi ponderosi electi et laevigati, **Libram**
unam,

Alcali vegetabilis aëрати depurati, **Libras**
duas,

Aquae communis, **Libras** quatuor.

Coque per horam in lebete stanneo, sub perpetua agitatione spathula lignea, Aquam evaporatione consumtam subinde restituendo; tunc dilue Aqua fervente, cola et ferva.

Terra ponderosa salita.

(*Baryta muriatica*).

Terrae ponderosae depuratae probe ablutae, et **Aquae Sextuplo** dilutae, affunde

Spiritum Salis acidum, donec nihil amplius solvatur.

Solutione facta filtra et evapora, donec exsicceatur. Massa residua in crucibulo excandescat. Refrigeratam et pulveratam in Aqua fervida solve, solutam et limpidissime filtratam ad crySTALLISATIONIS momentum evapora. Crystallos collectas ferva.

Nota.

Nota. Coloris fit albidi, non viridescentis, aut flavi, in aëre non humescat; solutio ejus Alkali volatile causticum non turbet, aut colore caeruleo tingat; nec ab Hepate Sulphuris volatili, aut Aqua hepatica acidulata simplici, decoloretur et praecipitetur; a Tinctura Gallarum non nigrescat; in Alcohole Vini bulliente nihil Terrae solvatur; Charta solutione illius imbuta, ficcata et accensa, non urat flamma rubente.

Tinctura Absinthii.

Rec. Summitatum Absinthii vulgaris ficcatarum,
Libram dimidiam.

Minutim concisis affunde

Spiritus Vini rectificati, Libras tres.

Post sufficientem digestionem per triduum in cucurbita clausa, exprime et filtra.

Tinctura Aconiti.

Rec. Foliorum Aconiti pulveratorum, Unciam unam,

Liquoris anodyni mineralis, Uncias duas
cum dimidia.

Digere in loco frigido et vitro clauso, saepius agitando, per dies quatuor, dein filtra, et in vitro probe obturato serva.

Tinctura Aloes.

Rec. Aloes optimae, Uncias duas,

Spiritus Vini rectificati, Uncias decem.

Digere

Digere leni calore, vas subinde agitando; solutionem filtra et ferva.

Tinctura alcalina.

(*Loco Tincturae Antimonii acris.*)

Rec. Alkali caustici recenter parati, Uncias quatuor.

In mortario ferreo calefacto in pulverem tritas immitte in

Spiritus Vini rectificatissimi, in cucurbita leviter calefacti, Libras duas.

Agitentur bene; tunc imposito alembico digerantur balneo arenae per aliquot dies. Tinctura rubicunda fervetur.

Tinctura amara.

Rec. Summitatum Centaurii minoris,

Herbae Menthae crispae,

Trifolii fibrini,

Radici Gentianae, singularum Unciam unam,

Zedoariae, Drachmas sex.

Concisis et contusis affunde

Spiritus Vini rectificati, Uncias triginta,
et adde

Alkali vegetabilis aëratı depurati, Drachmas duas.

Post digestionem exprime, filtra et ferva.

**Tinctura antispastica, ꝑ. Valerianae
composita.**

**Rec. Radicis Valerianae silvestris recenter pulveras-
tae, Unciam unam,**

**Liquoris anodynii mineralis, Uncias quatuor.
Digere in phiala alta, vesica tecta, per dies qua-
tuordecim calore moderato, sub finem ad effervescentiam aucto. Liquorem, quum refrixerit, decantha,
et in vase clauso ferva,**

Tinctura aromatica.

**Rec. Corticis Cassiae cinnamomeae, Uncias duas,
Seminis Cardamomi minoris,
Caryophyllorum,
Radicis Galangae,
Zingiberis, singulorum Unciam di-
midiam.**

Contusa digerantur

**Spiritus Vini rectificati, Libris duabus.
Filtrata et ferva.**

Tinctura Asae foetidae.

**Rec. Asae foetidae, Uncias duas,
Spiritus Vini rectificatissimi, Libram unam.
Solve digerendo, et filtra.**

Eodem modo parantur:

**Tinctura Benzoes;
Myrrhae.**

Tinctus

Tinctura Cantharidum.

Rec. Cantharidum contusum, **Unciam** dimidiam,
Spiritus Vini rectificati, **Libram** unam.

Macera per triduum, filtra et serva.

Tinctura Caryophyllatae, s. Gei urbani.

Rec. Radicis Caryophyllatae, **Unciam** unam.

Minutim concisae affunde

Spiritus Vini rectificati, **Libram** dimidiam.

Digestione frigida in vitro clauso, saepius movendo, extrahatur **Tinctura**.

Tinctura Cascarillae.

Rec. Corticis Cascarillae contusi, **Uncias** quinque,
Spiritus Vini rectificati, **Libras** duas.

Digere, post sufficientem extractionem **exprime**,
et filtra.

Eodem modo parantur:

Tinctura Cinnamomi, e Cinnamomo vero;

Catechu;

Chinae;

Gentianae;

Ligni Guajaci;

Pimpinellae;

Quassiae.

Tinctu

Tinctura Castorei.

Rec. Castorei Russici, minutim concisi, Uncias
duas,
Spiritus Vini rectificatissimi, Libram unam.
Post digestionem per triduum filtra.

Tinctura Castorei aetherea.

Rec. Castorei Russici, minutim concisi, Unciam
unam,
Liquoris anodynii mineralis, Libram di-
midiam.

Macera in vitro clauso, per dies octo, saepius a-
gitando; filtra et ferva.

Tinctura Colocynthis.

Rec. Colocynthis, a Seminibus liberatae et mi-
nutim concisae, Unciam unam,
Seminis Anisi stellati, Drachmam unam,
Spiritus Vini rectificati, Libram unam.
Post macerationem per triduum per chartam cola.

Tinctura Corticum Aurantiorum.

Rec. Corticum Aurantiorum, ab interiori paren-
chymate albo mundatorum, Uncias
quinque.

Minutim concisis affunde

Spiritus Vini rectificati, Libras duas.
Peracta digestionem exprime et filtra.

Tinctu

Tinctura Digitalis.

Rec. Herbae Digitalis,
Liquoris anodyni mineralis,
Spiritus Vini rectificatissimi, singulorum
Unciam unam.

Digere in loco frigido et vitro clauso, saepius agitando, per quatuor dies, dein filtra, et in vitro probe obturato serva.

Tinctura Euphorbii.

Rec. Euphorbii, Unciam unam,
Spiritus Vini rectificati, Libram unam,
Post digestionem filtra.

Tinctura Guajaci volatilis.

(*Tinctura Guajaci ammoniata*).

Rec. Resinae Guajaci nativae tritae, Unciam
unam,
Spiritus Salis Ammoniaci vinosi, Libram
dimidiam.

Frigida digestionem in vitro clauso, saepius movendo, extrahatur Tinctura.

Tinctura Lignorum.

(*Tinctura Pini composita*).

Rec. Turionum Pini, Uncias tres,
Radice Caricis arenariae concisae,

Rasurae Ligni Guajaci, singularum Uncias
duas,

Sassafras,

Baccarum Juniperi contusarum, singularum
Unciam unam,

Spiritus Vini rectificati, Libras tres.

Tinctura digerendo extracta exprimatur, et per
chartam coletur.

Tinctura Mari.

Rec. Herbae Mari veri,

Liquoris anodynii mineralis, singulorum
Unciam unam,

Spiritus Vini rectificatissimi, Uncias tres.

Digere in vitro clauso, saepius movendo, per dies
quatuor loco frigido, dein filtra, et in vitro probe
obturato serva.

Eodem modo paratur

Tinctura Botryos Mexicanae, s. Che-
nopodii ambrosiaci.

Tinctura Martis pomata.

Rec. Extracti Martis pomati, Uncias duas,

Aquae Cinnamomi vinosae, Libram unam.

Solve et serva.

Tinctura Martis salita.

(*Tinctura Ferri muriatici*).

Rec.

Rec. Limaturae Martis purae, Uncias tres.

Solve in

Spiritus Salis acidi quantitate sufficiente.

Evapora donec supersint Unciae sex, quibus admisce

Spiritus Vini rectificati, Uncias octodecim.
Filtrata et serva.

Tinctura Rhabarbari aquosa.

Rec. Radicis Rhabarbari, in taleolas scissae, Unciam unam cum dimidia,

Alcali vegetabilis aëratı depurati, Drachmas tres,

Aquae communis fervidae, Libram unam.

Macera per duodecim horas. Colaturae Unciarum decem admisce

Aquae Cinnamomi vinosae, Uncias duas.
Serva.

Tinctura Rhabarbari amara.

Rec. Radicis Rhabarbari pulveratae, Uncias duas,
Flavedinis Corticum Aurantiorum, Unciam dimidiam,

Seminis Cardamomi minoris, Drachmas duas,

Vini Gallici albi, Libras duas,

Spiritus Vini rectificati, Uncias duas.

Digere per dies aliquot, cola et serva.

Tinctura Rosarum.

Rec. Florum Rosarum rubrarum ficcatorum, Un-
ciam unam cum dimidia,
Spiritus Vitrioli, Unciam dimidiam,
Aquae communis fervidae, Libram unam.
Macerare per horas duodecim, cola et ferva.

Tinctura Succini.

Rec. Succini pulverati, Uncias sex.
In sartagine ferrea leviter tostis affunde
Spiritus Vini rectificatissimi, Libras duas.
In cucurbita, alembico clausa, digerantur leni ca-
lore per aliquot dies, Tincturam bene saturatam fil-
tra et ferva.

Tinctura Thebaica.

(*Tinctura Opii simplex*).

Rec. Opii puri, Uncias duas,
Spiritus Vini rectificati,
Aquae Cinnamomi simplicis, singulorum Li-
bram dimidiam.
Post digestionem per triduum, cola et ferva.

Nota. Drachma continet Opii circiter Grana decem.

Trochisci beccici, *ſ.* Liquiritiae compositi.

Rec. Pulveris Radicis Iridis Florentinae,
Liquiritiae,

Semi-

Seminis Anisi vulgaris, singulorum
Unciam unam,

Succi Liquiritiae depurati, in Aqua Foeniculi quantum satis soluti,
Uncias quatuor,

Sacchari albi, Uncias sedecim.

Misce exacte, et redige cum

Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum satis

in Trochiscos.

Unguentum Aegyptiacum.

(*Oxymel Aeruginis*).

Rec. Viridis Aeris pulverati, Uncias tres,
Aceti crudi, Libras duas.

Coque donec Aceti tertia circiter pars supersit,
Filtrata et adde

Mellis despumati, Libras duas.

Evaporent ad Libras duas. Serva.

Unguentum album camphoratum.

(*Unguentum Cerussae camphoratum*).

Rec. Unguenti albi simplicis, Libram unam,
Camphorae subtilissime tritae, Unciam dimidiam.

Misce et serva.

Unguentum album simplex.

(*Unguentum Cerussae*).

Rec. Axungiae Porci lotae, Libras duas,
Sevi vervecini, Libram unam.
Colliquatis admisce
Cerussae, subtilissime tritae, Libras duas.
Serva.

Unguentum Altheae.

Rec. Radicis Altheae, Uncias quatuor,
Seminis Foeni Graeci, Libram unam.
Concisis et contusis affunde
Aquae communis fervidae, Libras quatuor.
Post unam alteramve ebullitionem adde
Axungiae Porci lotae, Libras octo,
Radicis Curcumae pulveratae, Uncias duas.
Coquantur lente ad consumptionem humiditatis,
Exprime et adde
Cerae flavae, Libram unam.
Liquefacta cola.

Unguentum de Arthanita, ꝑ. contra vermes.

Rec. Axungiae Porci lotae, Libram unam,
Fellis Tauri inspissati, Uncias duas,
Aloes hepaticae pulveratae,
Colocynthis praeparatae, singulorum Un-
ciam dimidiam,
Olei destillati Absinthii,
Tanaceti, singulorum Drach-
mam unam cum dimidia.
Fiat Unguentum.

Unguen

Unguentum basilicum.

Rec. Olei Olivarum, Libras tres,

Cerae flavae,

Colophonii,

Sevi vervecini, singulorum Libram unam,

Terebinthinae, Libram dimidiam.

Lento igne liquata colentur. Fiat Unguentum.

Unguentum Cantharidum.

(*Unguentum irritans*).

Rec. Cantharidum contusarum, Uncias duas,

Olei Olivarum, Uncias octo.

Digere in balneo aquae. Colaturae Librae dimidiae adde

Cerae flavae, Uncias quatuor.

Fiat Unguentum. Serva.

Unguentum cereum.

Rec. Olei Olivarum, Uncias decem,

Cerae albae, Uncias quatuor.

Liquata et ab igne remota agitentur, donec refrixerint.

Unguentum digestivum.

Rec. Terebinthinae, Libram dimidiam,

Vitellos Ovorum, Numero quatuor.

Tritis et exacte mixtis adde

Olei Hyperici, Unciam unam cum dimidia,

Pulveris Myrrhae electae,

Olibani, singulorum Drachmas tres,

Croci triti, in Spiritu Vini macerati et dilu-
ti, quantum satis ad colo-
rem subflavum.

Agitando misce exacte. Fiat Unguentum.

Unguentum exsicicans, *s.* ad ambusta.

Rec. Unguenti nutriti, Uncias triginta duo,

Lapidis calaminaris subtilissime pulverati, Un-
cias quatuor.

Misce exacte in Unguentum.

Unguentum Linariae.

Rec. Herbae recentis cum Floribus Linariae
contusae, Libram unam,

Axungiae Porci, Libras duas.

Coque leni igne ad aquosi exhalationem, expri-
me et ferva.

Unguentum Neapolitanum.

(*Unguentum Hydrargyri cinereum*).

Rec. Mercurii vivi puri, Libram unam,

Sevi vervecini, Uncias octo.

Tere in mortario lapideo ad perfectam Mercurii
extinctionem; tunc admisce

Axungiae Porci, Uncias sedecim.

Serva.

Unguentum

Unguentum nervinum.

(*Unguentum Roris marini compositum*).

Rec. Herbae recentis Roris marini, Libram unam,
Majoranae,
Rutae, singularum Libram
dimidiam,

Baccarum Lauri,
Radici Pyrethri, singularum Uncias quatuor.
Contufis adde

Axungiae Porci, Libras quatuor,

Sevi vervecini, Libras duas.

Coque lento igne, donec aquosum consumtum fit.
In colatura expressa lique scat

Cerae flavae Libra dimidia.

Ab igne remotis et refrigeratis immisce

Olei Roris marini,

Baccarum Juniperi, singulorum Uncias
tres.

Mixta ferventur.

Unguentum de Nihilo.

(*Unguentum Zinci*).

Rec. Florum Zinci, Unciam unam,

Unguenti cerei, Uncias octo.

Misce exactissime.

Unguentum nutritum.

(*Unguentum Lithargyri*).

Rec. Olei Olivarum, Libras quatuor,
Cerae albae, Libram dimidiam.

Liquefacta ab igne removeantur, et simulac lentescere incipiunt sensim, sub agitatione perpetua, addatur

Aceti Lithargyri, Libra una.
Misce in Unguentum.

Unguentum Pediculorum.

(Unguentum Sabadillae cum Mercurio).

Rec. Pulveris Seminis Sabadillae, Uncias duas,
Radiciis Hellebori nigri, Unciam
unam,

Axungiae Porci, Libras tres,
Olei laurini, Libram dimidiam,
Mercurii vivi puri, Uncias duas

cum

Terebinthinae Uncia una
subactas. Misce.

Unguentum pomadinum, s. rosatum.

Rec. Axungiae Porci, Libram unam,
Aquae Naphae,

Rosarum, singularum Uncias duas,
Olei de Cedro, Guttas viginti quatuor,
Lavendulae, Guttas quindecim,
Caryophyllorum, Guttas duodecim.

Misce.

Unguentum

Unguentum ad scabiem.

(*Unguentum sulphuratum*).

Rec. Florum Sulphuris,

Vitrioli Zinci, ficcati et pulverati, singulorum
Uncias duas,

Olei laurini,

Axungiae Porci lotae, singulorum Uncias qua-
tuor.

Misce et ferva.

Vinum antimoniatum.

Rec. Vitri Antimonii subtilissime pulverati, Unciam
unam.

Immitte in cucurbitam vitream, et affunde

Vini Malacensis, Libras quatuor.

Vas saepius agitando digere per dies decem, aut
duodecim, in loco moderate calido. Filtra et ferva.

Vinum emeticum, loco Aquae
benedictae.

Rec. Tartari emetici, Grana viginti quatuor,

Vini Gallici albi, Libram unam.

Solve leni digestionem et ferva.

Vinum martiatum.

Rec. Limaturae Martis purae, Uncias duas,

Corticis Cinnamomi, Unciam unam,

Vini Rhenani, Libras duas.

Digere

Digere per aliquot dies, vas subinde movendo.
Filtrare et servare.

Vitriolum de Cipro.

(*Cuprum sulphuricum*).

Rec. Ramentorum Cupri, quantum placet,
Olei Vitrioli, Triplum.

Misce, et ex retorta vitrea Acidum vitriolicum
destillando elice. Massam remanentem contritam dis-
solve in Aqua fervida, solutam filtra, et ad crystalli-
sandum seponere.

Vitriolum Martis.

(*Ferrum sulphuricum crystallisatum*).

Rec. Olei Vitrioli, Libram unam.

Misce in cucurbita vitrea cum

Aquae communis Quadruplo;
successive immitte

Limaturae Martis purae, Uncias octo.

Effervescentia cessante reponere per horam supra
arenam calidam; tunc filtra, et in crystallos redige.

Vitriolum Zinci.

(*Zincum sulphuricum*).

Rec. Zinci depurati, in frustula parva diffracti,
quantum placet.

Solve in

Spiritus Vitrioli quantitate sufficiente.

Solutionem filtra, et post idoneam evaporationem
in crystallos redige, quas ficcatas servare.

Vitrum

Vitrum Antimonii.

Calcis Antimonii Libra dimidia, in vas figulinum non vitreatum tectum immissa, furno anemio committatur, eoque retineatur, igne sensim aucto, usque dum vas, prunis circumdatum, candescat. Finito fumorum ascensu massa liquefacta tenuis, glabra, aequaliter pellucida, effundatur in laminam ferream frigidam. Lente frigefactum Vitrum Antimonii colorem referat pellucide hyacinthinum.

Zincum depuratum.

Zincum liquefiat in crucibulo igne tam moderato, ut maneat fluidum. Agitando virga ferrea injice per vices Sulphuris frustula. Si Sulphure formantur scoriae, Zincum heterogeneis metallis inquinatum est, ideoque depuretur scorias removendo, et denuo Sulphur injiciendo, idque continuando, donec tandem comburatur Sulphur immixtum, nullis omnino productis scoriis.

I N D E X.

A.

Acetum	-	3	Acidum sulphuricum, s.	
- aromaticum		104	vitriolicum dilutum	192
- bezoardicum		104	- tartaricum	179
- concentratum		103	Adeps suilla	8
- crudum		3	Aerugo	99
- destillatum		103	Aes	24
- Lithargyri		104	Aether aceticus	161
- prophylacticum		104	- sulphuricus	162
- Rosarum		105	Aethiops antimonialis	106
- Rubi Idaei		105	- martialis	107
- Rutae		105	- mineralis	107
- saturninum		142	Agaricum	3
- scilliticum		105	Agaricus albus	3
Acidum aceticum		108	- Chirurgorum	4
- benzoicum		142	- quercinus	4
- muriaticum		188	Alcali causticum	107
- nitricum		113	- minerale	108
- phosphoricum		105	- vegetabile aëratum	
- succinicum		180	depuratum	181
- sulphuricum s. vitrioli-			- volatile ficcum	108
cum concentratum	63		Alcohol Aceti	108

Alcoz

Alcohol Vini	192	Aqua Cinnam. vinosa	112
Aloe	4	- destillata simplex	112
- hepatica	4	- Embryonum	110
- Socoterina, <i>f.</i> Succo-		- <i>Florum Aurantii</i>	114
trina	4	- Foeniculi	113
Alumen crudum	5	- fortis	113
- ustum	109	- Hyssopi	113
Ambra grisea	5	- Lauro - Cerasi	114
- liquida	96	- laxativa Viennensis	145
Ammoniacum	6	- Melissae	114
- depuratum	109	- Menthae crispae	114
<i>Ammonium carbonicum</i>	108	- - piperitae	114
- - - pyro-oleo-		- - - vinosa	114
sum	182	- Naphae	114
- muriaticum	85	- Petroselinii	115
- - depuratum	178	- phagedaenica	115
- - martiatum	143	- Rosarum	115
Amygdalae	6	- Rubi Idaei	115
- amarae	6	- Salviae	114
- dulces	7	- Sambuci	112
Amylum	7	- <i>saturnina</i>	116
Antimonium crudum	7	- Tiliae	112
- - praepa-		- vegeto - mineralis	116
ratum	109	- vulneraria	116
- diaphoreticum ablu-		- - vinosa	116
tum	109	Arcanum duplicatum	201
- - non ablutum	110	Argentum cupellatum	7
Aqua aromatica	110	- nitricum, <i>f.</i> nitratum	117
- benedicta	219	- <i>nitricum fusum</i>	148
- <i>Calcariae ustae</i>	111	- vivum	57
- Calcis	110	Arsenicum album	7
- cephalica	110	Asa dulcis	10
- Ceraforum	111	- foetida	8
- Chamomillae	112	- - depurata	109
- Cinnamomi simplex, <i>f.</i>		Afelli	58
<i>sine Vi-</i>		Asphaltum	8
no	112	Axungia Porci	8

B.

Baccae Berberum	9	Balsamus vitae	119
- Juniperi	9	<i>Baryta depurata</i>	203
- Lauri	9	- <i>muriatica</i>	203
- Sambuci (<i>Pag. penult.</i>)		- <i>sulphurica nativa</i>	94
Bacilli Liquiritiae	150	Benzoë, <i>f. Benzoïn</i>	10
Badian	88	Bismuthum	11
Balsamus Arcaeï	117	- <i>oxydatum album</i>	153
- Copaivae	9	Bitumen judaicum	8
- Indicus niger	10	<i>Boletus Salicis</i>	35
- mercurialis	117	Bolus rubra	11
- ophthalmicus ruber	118	Borax Veneta	11
- Opodeldoc	118	Butyrum Antimonii	120
- Peruvianus niger	10	- Cacao	120
- Sulphuris simplex	119	- Majoranae	120
- Sulph. terebinthinatus	119		

C.

Cacao	11	Castoreum	14
Cadmia fossilis	54	- Anglicum, <i>f. Canadense</i>	14
Calamita	96	fe	
<i>Calcaria</i>	12	- Moscoviticum, <i>f. Russicum, f. Sibiricum</i>	14
- <i>muriatica</i>	178	Catechu	15
- <i>sulphurata</i>	144	Cera alba	15
- <i>sulphurato-slibiata</i>	121	- flava	15
Calomelas	156	- viridis	121
Calx	12	Cerasa acida	15
- Antimonii	121	- nigra	15
- - cum Sulphure	121	<i>Ceratum Aeruginis</i>	121
Camphora depurata	12	- Saturni	122
Cantharides	13	Cerussa alba	16
Carbo purus	121	<i>Cetaceum</i>	95
- Spongiae	193	Cineres clavellati	16
Caricae	13	- depurati	181
Caryophylli aromatici	13	Cinnabaris factitia	122
Cassia cinnamomea	19		
- Fistula	14		

Gocci

Coccionella	16	Cortex Granatorum	21
Colla piscium	53	- Guajaci	21
Colocynthis	16	- Hippocastani	21
- praeparata	123	- Kina Kinae	19
Colophonium	17	- Mezerei	22
Conchae	17	- Peruvianus	19
- praeparata (Pag. ult.)	-	- Quassiae	22
Coni Lupuli	96	- Quercus, f. quercinus	22
Conserva Cochleariae	123	- Salicis fragilis	23
- Rosarum	123	- - laureae	23
Corni Cervi	17	- Simarubae	23
- raspatum	17	- Ulmi	23
Cortex Angusturae	17	Cremor Tartari	123
- Aurantiorum	18	- - boraxat. f. solub.	124
- - Curassaviensium	18	Creta alba	24
- Cascarillae, f. Chacarill.	18	Crocus	24
- Cassiae lignae	19	- Martis aperitivus	124
- Chinae flavus	20	- Metallorum	124
- - fuscus	19	Crytalli Tartari	98
- - officinalis	19	Cubebae	24
- - regius	20	Cuprum	24
- - ruber	20	- acetatum	99
- Chinchinae	19	- Ammoniacum, f. am-	
- Cinnamomi veri, f.		moniacale	125
acuti	20	- ammoniatum	125
- Citri	21	- sulphuricum	220
- - ficcatus	21		

D.

Diagrydium 88

E.

Elaeosaccharum Anisi	125	Electuarium lenitivum	126
- Cinnamomi	125	- mundificans	126
- Flavedinis Citri	126	- e Senna	126
- Foeniculi	125	- Theriaca	127
- Menthae piperitae	126	Elemi	25

Q

Elic

Elixir acidum	128	Extract. Absinth. vulgar.	136
- aperitivum	128	- Aconiti	137
- <i>Aurantiorum compos.</i>	129	- Aloes	137
- pectorale	128	- Angelicae	137
- roborans	129	- Arnicae	138
- <i>ex Succo Liquiritiae</i>	128	- Belladonnae	137
- viscerale	129	- Cardui benedicti	136
- Vitrioli	130	- Cascarillae	136
Emplastrum album coct.	130	- catholicum	138
- Ammoniaci	130	- Centaurii minoris	136
- aromaticum	135	- Chamomillae vulgaris	136
- <i>Cantharidum ordinar.</i>	135	- Chelidonii majoris	137
- - <i>perpetuum</i>	135	- Chinae aquosum	136
- cephalicum	131	- - - frigide parat.	138
- <i>Cerussae</i>	130	- Cicutae	137
- <i>Cetacei</i>	134	- Colocynthidis	138
- Cicutae	131	- - <i>compositum</i>	140
- citrinum	132	- Columbae	138
- <i>Conii</i>	131	- Corticum Aurantior.	138
- Diachylon compos.	132	- Dauci Carotae	139
- - simplex	132	- Dulcamarae	136
- flavum	133	- Enulae	138
- foetidum	134	- <i>Ferri pomatum</i>	140
- <i>Hydrargyri</i>	183	- Fumariae	136
- Hyoscyami	132	- Gentianae	136
- <i>Lithargyri compositum</i>	132	- Graminis liquidum	139
- - <i>simplex</i>	132	- Gratiolae	137
- Meliloti	133	- Hellebori nigri	138
- mercuriale	133	- Hyoscyami	137
- miraculosum	134	- Levistici	138
- opiatum	131	- Ligni Quassiae	140
- resolvens	134	- Marrubii	136
- saponato - camphorat.	134	- Martis pomatum	140
- Spermatidis Ceti	134	- Millefolii	136
- stomachicum	135	- Myrrhae	137
- vesicatorium ordinar.	135	- Opii	137
- - <i>perpetuum</i>	135	- panchymagogum	140
Euphorbium	25	- Rhabarbari	136
Extractum Absinthii ma-		- <i>Rhei compositum</i>	138
ritimi	136	- Salicis fragilis	136

Extra:

Extractum Saturni	142	Extractum Trifolii	136
- Taraxaci liquidum	139	- Valerianae	138

F.

Fel Tauri	25	Flores Rosarum rubrar.	29
- - inspissatum	142	- Salis Ammoniaci mar-	
Ferrum	25	tiales	143
- oxydatum fuscum	124	- Sambuci	29
- oxydulatum nigrum	107	- Sulphuris	143
- pulveratum	149	- Tanaceti	30
- sulphuricum crystallif.	220	- Tiliae	30
Ficus pasiae	13	- Verbasci	30
Flavedo Cort. Aurant.	18	- Violarum, f. Violae	
Flores Arnicae	26	martiae	30
- Aurantiorum	26	- Zinci	144
- Balaustiorum	26	Folia Afari	31
- Benzoës	142	- Aurantiorum	31
- Chamomillae Romanae	26	- Illicis Aquifolii	31
- - vulgaris	27	- Lauro - Cerasi	32
- Granati	26	- Quercus	32
- Lavendulae	27	- Sedi majoris	32
- Liliorum convallium	27	- Sennae	33
- Malvae arboreae, f. hor-		- Uvae Ursi	33
tenfis, f. roseae	27	Formicae	33
- - vulgaris	28	Fructus Mororum	33
- Meliloti citrini	28	- Prunorum	34
- Millefolii	28	- Quercus	36
- Naphae	26	- Ribium rubrorum	34
- Papaveris erratici, f.		- Rubi Idaei	34
Rhoeados	29	- Tamarindorum	34
- Rosarum incarnatarum	29	Fungus Salicis	35

G.

Galbanum	35	Glandes Quercus	36
- depuratum	109	Globuli martiales	144
Gallae Turcicae	35	- Tartari martiati	144

Gummi Ammoniacum	6	Gummi Guttæ	37
- Arabicum	36	- Kino	53
- Benzoës	10	- <i>Mimosæ</i>	36
- Elemi	25	- Opoponax	64
- Galbanum	35	- Sagapenum	84
- Gambiense	53	- Tragacanthæ	36
- Guajaci	83	Gutti	37

H.

Helminthochortos	37	Herba Hyoscyami	43
Hepar Sulph. calcareum	144	- Hyperici	43
- - falinum	145	- Hyssopi	44
Herba Abrotani maris, <i>f.</i>		- Jaceæ	44
hortensis	37	- Ledi palustris	49
- Absinthii maritimi	38	- Lichenis Islandici	44
- - vulgaris	38	- Linariæ	45
- Aconiti	38	- Majoranæ	45
- Altheæ	38	- Malvæ	45
- Anagallidis	39	- Mari veri	45
- Anthos	49	- Marrubii albi	46
- Arnicæ	39	- Matricariæ	46
- Basilici	39	- Meliloti	46
- Belladonnæ	39	- Melissæ citratæ	46
- Botryos Mexicanæ	40	- Menthæ crispæ	47
- Cardui benedicti	40	- - piperitæ	47
- Centaurii, <i>f.</i> Centaurei		- Millefolii	47
minoris	40	- Nicotianæ	47
- Chelidonii majoris	41	- Origani Cretici	48
- <i>Chenopodii ambrosiaci</i>	40	- - vulgaris	48
- Cicutæ maculatæ	41	- Pulegii	48
- Clematidis erectæ	42	- Roris marini	49
- Cochleariæ	41	- - silvestris	49
- Digitalis	42	- Rutæ hortensis	49
- Farfaræ	52	- Sabinae	49
- Flammulæ Jovis	42	- Salviæ	50
- Fumariæ	42	- Saponariæ	50
- Gratiolæ	43	- Scordii	50
- Hederæ terrestris	43	- Serpylli	50

Herba

Herba Tanacetii	51	Hydrargyrum	57
- Taraxaci	51	- muriaticum corrosivum	159
- Thymi	51	- - mite	156
- Trifolii fibrini	51	- - praecipitatum	157
- Tussilaginis	52	- oxydatum rubrum	158
- Verbasci	52	- oxydulatum nigrum	158
- Veronicae	52	- phosphoricum	157
- Violae tricoloris	44	- stibiato-sulphuratum	106
Hirudines vivae	53	- sulphuratum nigrum	107

I.

Ichthyocolla	53	Julapium e Camphora	145
Infusum laxativum	145	Jupiter	95
- Sennae compositum	145		

K.

Kali aceticum	202	Kali nitric. depuratum	162
- carbonicum crudum	16	- sulphuratum	145
- - depuratum	181	- sulphuricum	201
- causticum siccum	148	- tartaricum	201
- citratum	177	Kermes minerale	146
- nitricum crudum	59	Kino	53

L.

Lac Sulphuris	146	Lapis ophthalmicus	148
Lacca in ramulis, f. ba-		Laudanum liquidum	149
culis	53	Lignum Guajaci	54
Lapides Cancrorum	54	- Juniperi	55
- - praeparati	147	- Quassiae	55
Lapis Calaminaris	54	- sanctum	54
- - praeparatus	147	- Sassafras	55
- causticus	147	Limatura Martis praep.	149
- divinus	148	Linimentum ammoniat.	150
- infernalis	148	- saponato-camphoratum	118

Linimentum volatile	150	Liquor Hydrargyri mu-	
Liquamen Myrrhae	150	riatici cor-	
Liquidambar	96	rosivi	115
Liquiritia cocta	150	- - nitrici	156
Liquor Alkali vegetabilis	150	- Kali acetici	153
- - volatilis acetici	151	- - carbonici	150
- Ammonii acetici	151	- - caustici	153
- - anisatus	189	- Myrrhae	150
- - carbonici aquosus	189	- pyro - tartaricus	191
- - caustici	190	- Saponis sibiati	194
- - pyro - oleosi	187	- Stibii muriatici	120
- - succinici	152	- Terrae foliatae Tart.	153
- - vinosus	190	Lithargyrum, s. Lithar-	
- anodynus martialis	151	gyrium	55
- - mineralis	152	Lixivium causticum	153
- Cornu Cervi succinat.	152		

M.

Macis	56	Mel despumatum	155
Magisterium Bismuthi	153	- rosatum	155
Magnesia alba	154	Mellago Graminis	139
- calcinata	155	- Taraxaci	139
- carbonica	154	Mercurius dulcis	156
- nigra, s. vitriariorum	56	- nitrosus	156
- Salis amari	154	- phosphoratus	157
- sulphurica	85	- praecipitatus albus	157
- vitriolata	85	- - ruber	158
- usta	155	- solubilis	158
Malicorium	21	- sublimatus	159
Manganesium oxydatum		- vivus	57
nativum	56	- - depuratus	159
Manna Calabrina	56	Millepedes, s. Millepedae	58
- cannulata	56	Minium	58
- vulgaris	57	Mixtura camphorata	145
Marcalita	11	- oleoso - balsamica	119
Mastiche	57	- pyro - tartarica	160
Mel album, s. Virgineum	57	- simplex	160
- commune, s. crudum	57	- sulphurico - acido	128
		Mixtu-	

Mixtura vulneraria aci-		Moschus Tunquinenfis	59
da	116	Mucilago Radicis Alth.	160
Moschus artificialis	160	- Gummi Arabici	161
- Cabardinus, f. Tabbar-		- Seminum Cydonior.	161
gus	59	Myrrha rubra	59

N.

Naphtha Aceti	161	Nitrum crudum, f. com-	
- Vitrioli	162	mune, f.	
Natrum aceticum	202	vulgare	89
- carbonicum crystallif.	177	- depuratum	162
- muriaticum	86	Nuces Juglandis imma-	
- phosphoricum	184	turae	59
- sulphuric. crystallif.	86	- moschatae, f. myristi-	
- vitriolatum	86	cae	60
		- vomicae	60

O.

Oleum Absinth. aether.	163	Oleum Corticum Citri	61
- - per infusionem		- Florum Lavendulae	163
paratum	164	- Herbae Majoranae	163
- Amygdalarum	165	- - Menthae	163
- Animale aethereum	165	- - - per infus. parat.	165
- Anisi	164	- - - piperitae	163
- Baccarum Juniperi	163	- - Origani Cretici	163
- Bergamottae	60	- - Roris marini	163
- Cacao	120	- - Sabinae	164
- Cajeput	61	- - Tanaceti	164
- Caryophyllorum aro-		- Hyoscyami per infus.	
maticor.	61	paratum	165
- de Cedro	61	- Hyperici per inf. par.	165
- Cerae	166	- laurinum	62
- Chamomillae aether.	166	- Lini sulphuratum	119
- - per infusionem pa-		- Macis	62
ratum	165	- Nusticae, f. Nucis Mo-	
- Cinnamomi	61	schatae	62
- Corticum Aurantior.	60	- Olivarum	62

Oleum Ovorum	167	Oleum Terebinthinae	167
- Petrae	63	- - <i>sulphuratum</i>	119
- Radicis Valerianae fil-		- Vitrioli	63
vestris	164	- - depuratum	167
- Ricini	63	Olibanum	64
- Sassafras	63	Opium	64
- Seminis Anisi	164	Opoponax	64
- - Carvi	164	Ova gallinacea	65
- - Cumini	164	<i>Oxalium</i>	85
- - Foeniculi	164	<i>Oxymel Aeruginis</i>	121
- - Lini	165	- scilliticum	168
- Succini	167	- simplex	168
- Tartari per deliquium	150		

P.

Pasta Altheae	168	Pulvis analepticus	171
- Liquiritiae	169	- antispasmodicus	172
Petroleum	63	- Ari compositus	174
Phosphorus	170	- cordialis	171
Pilulae balsamicae	170	- dentifricius	172
- ecphracticae	170	- digestivus	172
- polychrestae	170	- Doweri	173
- purgantes cum Mer-		- eccoproticus	172
curio	170	- <i>gummosus</i>	185
Piper album	65	- infantum	172
- Jamaicense	88	- Ipecacuanhae compos.	173
Plumbum	65	- Lycopodii	92
- <i>acetatum</i>	84	- nobilis Cellensis	171
Poma acidula	66	- Nutricum	173
- Aurantia Curassavica	65	- refrigerans	173
- Aurantiorum imma-		- Sennae compositus	174
tura	65	- Sternutatorius	174
- Citri	66	- Stomachicus	174
Pulpa Cassiae	170	- temperans albus	174
- Prunorum	171	- - ruber	172
- Tamarindorum	171		

R.

Radix Acori veri	69	Radix Allii	66
- Alkannae rubrae	66	- Altheae	67

Radix

Radix Angelicae sativae,	Radix Ireos, f. Iridis Flo-
f. hortensis 67	rentinae 76
- Ari, f. Aronis 67	- Lapathi acuti 77
- Aristolochiae rotundae	- Levistici 76
f. verae 68	- Ligustici 76
- Armoraciae 68	- Liquiritiae 76
- Arnicae 68	- Melampodii 74
- Asari 68	- Oxylapathi 76
- Bardanae 68	- Pimpinellae albae, f.
- Belladonnae 69	nostratis 77
- Bryoniae 69	- Polygalae amarae 77
- Calami aromatici 69	- - Virginianae 81
- Caricis arenariae 70	- Polypodii 78
- Cardopatiæ 70	- Pyrethri 78
- Carlinae 70	- Raphani rustici 68
- Caryophyllatae 70	- Rhabarbari 78
- Chelidonii majoris 71	- Rhei 78
- Chinae ponderosae 71	- Rubiae tinctorum 79
- Cichorii filvestris 71	- Salap, f. Saleb, f. Salep 79
- Colombo, f. Columbæ 71	- Saponariae rubrae 79
- Contrajervae 72	- Sarsaparillae, f. Sassa-
- Curcumae 72	parillae 80
- Danci fativi 72	- Scillae, f. Squillae 80
- Dentis Leonis 82	- Scorzoneræ 80
- Dictamni albi 73	- Senegae, f. Senekae 81
- Enulae 73	- Serpentariae Virgini-
- Filicis 78	anae 81
- Filiculae dulcis 73	- Taraxaci 82
- Fraxinellae 73	- Tormentillae 82
- Galangae minoris 74	- Valerianae filvestris, f.
- Gentianae rubrae 74	minoris 82
- Gialappae 75	- Zedoariae longae 82
- Glycyrrhizae 76	- Zingiberis albae 83
- Graminis albi 74	Regulus Antimonii 175
- - rubri 70	Resina communis 83
- Helenii 73	- Guajaci nativa 83
- Hellebori nigri 74	- Jalappae 176
- Jalappae 75	- Juniperi 87
- Ipecacoanhae 75	- Ligni Guajaci 176

Refina Pini	176	Roob Jnniperi	176
- <i>Succini balsamica</i>	160	- Sambuci	176
Roob Dauci	139	Rotulae Menth. piperit.	177

S.

Saccharum album	84	Sapo jalappinus	183
- canthum	84	- medicatus	183
- clarificatum	198	- <i>stibiatus</i>	182
- Lactis	84	Saturnus	65
- Saturni	74	Scammonium Aleppense	88
Sagapenum	84	Semen Amomi	88
- depuratum	109	- Anisi stellati	88
Sal Absinthii citratum	177	- - vulgaris	88
- Acerosellae	85	- Cannabis	89
- Alkali minerale	177	- Cardamomi minoris	89
- Ammoniacum, <i>f. Ar-</i>		- Carvi	89
moniacum	85	- Cinae	90
- - depuratum	178	- Coriandri	90
- - fixum	178	- Cumini, <i>f. Cymini</i>	90
- Anglicum, <i>f. amarum,</i>		- Cydoniorum	90
<i>f. Ebshamenfe</i>	85	- Foeniculi	91
- - - depuratum	178	- - aquatici	93
- Brunsvicense	86	- Foeni Graeci	91
- commune, <i>f. culinare</i>	86	- Hordei excorticatum,	
- essentielle Tartari	179	<i>f. mundatum</i>	91
- mirabile	85	- Lini	91
- Saidschützenfe, <i>f. Sed-</i>		- Lycopodii	92
litzenfe	86	- Melonum	92
- Sal Saturni	84	- Papaveris albi	92
- Seignette	180	- Petrofelini	92
- Succini	180	- Phellandrii	93
- Tartari	181	- Pfyllii	93
- volatile Cornu Cervi	182	- Sabadillae, <i>f. Sabadilli</i>	93
Sandaraca	87	- Santonici	89
Sanguis Draconis	87	- Sinapeos nigrae	94
Sapo Alicantinus, <i>f. Hi-</i>		Sevum, <i>f. Sebum verve-</i>	
spanicus	87	cinum, <i>f. ovil-</i>	
- antimonialis	182	lum	94
- guajacinus	183		

Soda

Soda Alicantina, <i>f. Hispa-</i>		Spiritus Vini Vitrioli	192
nica	94	Spongia cerata	192
– Hungarica	94	– marina	95
– phosphorata	94	– nsta	193
– vitriolata	86	Stannum	95
Spathum ponderosum	94	– praeparat. granulat.	193
<i>Species ad Cataplasma</i>	185	<i>Stibium oxydatum album</i>	
– ad Decoctum Lignor.	184	ablutum	109
– Diatragacanthae frig.	185	– – – non ablutum	110
– emollientes	185	– oxydulatum fuscum	124
– pectorales	185	– purum	175
– resolventes	186	– sulphuratum nigrum	7
Sperma Ceti	95	– – – laevigatum	109
Spiritus Angelicae com-		Stipites Dulcamarae	95
positus	186	Storax liquidus	96
– Anthos	188	Strobuli Lupuli	96
– Cochleariae	186	Styrax in Granis	96
– Cornu Cervi rectific.	187	– liquidus	96
– Formicarum	187	Succinum	97
– Lavendulee	187	<i>Succus Dauci inspissatus</i>	139
– Mastiches compositus	188	– Glycyrrhizae	97
– Matricalis	188	– Juniperi inspissatus	176
– Mindereri	151	– Liquiritiae	97
– muriatico-aethereus	190	– Sambuci inspissatus	176
– Nitri acidus	113	Sulphur Antim. aurat.	193
– nitrico-aethereus	188	– auratum liquidum	194
– Nitri dulcis	188	– citrinum	97
– Roris marini	188	– depuratum	143
– Salis acidus	188	– Lycopodii	92
– – dulcis	190	– praecipitatum	146
– – Ammoniaci anifat.	189	– sibiutum aurantiac.	193
– – – aquosus	189	– – rubeum	146
– – – cum Calce	190	– vulgare	97
– – – vinosus	190	Syrupus Acetositis Ci-	
– saponatus	191	tri	195
– Tartari	191	– Altheae	194
– theriacalis	186	– Amygdalarum	196
– Vini camphoratus	191	– Berberum	194
– – rectificatissimus	192	– Ceraforum	195
– – rectificatus	192	– Chamomillae	195

Syrus

Syrupus Cichorii cum		Syrupus Naphae	197
Rhabarbaro	193	– Papaveris albi	196
– Cinnamomi	195	– – Rhoeados	198
– Corticum Aurantior.	196	– Rhabarbari	198
– Diacodii	196	– Rhei	198
– emulsivus	196	– Ribium	195
– Florum Aurantiorum	197	– Rubi Idaei	195
– Liquiritiae	197	– Sacchari simplex	198
– Mannae cum Senna	197	– saccharinus communis	97
– Mororum	195	– scilliticus	199
		– Violarum	199

T.

Tacamahaca vera	98	Tinctura alcalina	205
– vulgaris	98	– Antimonii acris	205
Tartarus ammoniacus	200	– amara	205
– boraxatus	124	– antispastica	206
– crudus	98	– aromatica	206
– depuratus	123	– – acida	130
– emeticus	199	– Asae foetidae	206
– natronatus	180	– Benzoës	206
– solubilis	200	– Botryos Mexicanae	200
– stibiatus	199	– Cantharidum	207
– tartarifatus	200	– Caryophyllatae	207
– vitriolatus	201	– Cascarillae	207
Terebinthina cocta	202	– Castorei	208
– communis	98	– – aetherea	208
– laricina	99	– Catechu	207
– Veneta	99	– Chenopodii ambros.	200
Terra foliata Tartari	202	– Chinae	207
– – – crystallifata	202	– – composita	129
– ponderosa depurata	203	– Cinnamomi	207
– – salita	203	– Colocynthidis	208
Theriaca	127	– Cortic. Aurantior.	208
Thus	64	– Digitalis	209
Tinctura Absinthii	204	– Euphorbii	209
– Aconiti	204	– Ferri muriatici	210
– Aloes	204	– Gei urbani	207

Tinctura

Tinctura Gentianae	207	Tinctura Pini composita	209
- Guajaci ammoniata	209	- Quassiae	207
- - volatilis	209	- Rhabarbari amara	211
- Ligni Guajaci	207	- - aquosa	211
- Lignorum	209	- Rosarum	212
- Mari	210	- Succini	212
- Martis pomata	210	- Thebaica	212
- - falita	210	- Valerianae compos.	206
- Myrrhae	206	Trochisci Alhandal	123
- Opii simplex	212	- beccici	212
- - composita	149	- Liquiritiae compositi	212
- Pimpinellae	207	Turiones Pini	99

U.

Unguentum Aegyptiac.	213	Unguentum Linariae	216
- album camphoratum	213	- Lithargyri	217
- - simplex	213	- Majoranae	120
- Altheae	214	- Neapolitanum	216
- ad ambusta	216	- nervinum	217
- de Arthanita	214	- de Nihilo	217
- basilicum	215	- nutritum	217
- Cantharidum	215	- Pediculorum	218
- cereum	215	- pomadinum	218
- Cerussae	213	- rosatum	218
- - camphoratum	213	- Roris marini compos.	217
- digestivum	215	- Sabadillae cum Mercurio	218
- Elemi	117	- saturninum	122
- exsicicans	216	- ad scabiem	219
- Hydrargyri cinereum	216	- sulphuratum	219
- - citrinum	117	- contra vermes	219
- - rubrum	118	- Zinci	217
- irritans	215		

V.

Vinum	99	Vinum emeticum	219
- antimoniatum	219	- martiatum	219
		Viride	

Viride Aeris	99	Vitriolum Martis	220
Viscus quernus	100	- Zinci	220
Vitriolum de Cypro	220	Vitrum Antimonii	221

Z.

Zincum	100	Zincum oxydat. album	141
- depuratum	221	- sulphuricum	220

R e g i s t e r.

A.

Aepfel, säuerliche	66	Amidam	7
Agtstein	97	Ammoniac = Gummi	8
Allantwurzel	73	Andorn, weißer	46
Allaun, weißer	5	Angelik = Wurzel	67
Alkannawurzel	66	Angustura = Rinde	17
Aloe	4	Anies	88
Althee = Kraut	38	Arons = Wurzel	67
— Wurzel	67	Arsenik, weißer	7
Amber, grauer	5	Asand, stinkender	8
Amber = Kraut	45	— wohlriechender	10
Ambra	5	Asphalt	8
Ameisen	33	Austerschalen	17

B.

Badeschwamm	95	Basilien = Kraut	39
Bärentrauben = Blätter	33	Baumöl	62
Bärlappen = Pulver	92	Belladonna = Blätter	39
Baldrian = Wurzel	82	— Wurzel	69
Balsam, Copaiva	9	Benedicten = Wurzel	70
— Peruvianischer, schwarzer	10	Benzoe	10

Berbe,

Verberis : Beeren, Bei berizen	9	Blenzlätte	55
Bergamottöl	60	Bleyfalz	84
Bergöl	63	Bleyweiß	16
Bernstein	97	Bleyzucker	84
Vertram : Wurzel	78	Blutegel, Blutigel	53
Vibergeil, Englisches	14	Bockshorn : Samen	91
— Russisches	14	Böhmisches Bittersalz	86
Vibernell : Wurzel	77	Bolus, rother	11
Bilsenkrant	43	Borax, Benedischer	11
Bisam	58	Braunschweigisches Salz	86
— Chinesischer	59	Braunstein	56
— Russischer	59	Brechwurzel	75
Bitterholz	55	Brennkrant	42
Bitterklee	51	Brachweiden : Rinde	23
Bittersalz	85	Brustkuchen	97
Bittersüß : Stengel	95	Brustwurzel	67
Bley	65	Buchmistel	100

C.

Cacao : Bohnen, Cacaonüsse	11	China : Wurzel	71
Cajeput : Del	61	Christwurz	74
Calabrische Manna	56	Eichorien : Wurzel	71
Calmus : Wurzel	69	Citronen	66
Campher, gereinigter	12	— Schale	21
Canel : Rinde	20	Citronen : Melisse	46
— Del	61	Cochenille	16
Cardamom, kleine	89	Clophoniam	17
Cardobenedicten : Kraut	40	Coloquinthe	16
Carotten	72	Columbo : Wurzel	71
Cascarill : Rinde	18	Contrajerva : Wurzel	72
Cassia : Rinde	19	Copaiva : Balsam	9
— Rohr	14	Coriander	90
Catechu	15	Corficcanisches Moos	37
Cedro : Del	61	Cubeben	24
China : Rinde, gewöhnliche	19	Curassao : Aepfel	65
— — gelbe	20	— Pomeranzen : Schale	18
— — rothe	20	Curcuma	72

D.

Damascener Rosen	29	Drachenblut	87
Deutscher Ingber	67	Dreyblatt	51
Diptam, weißer	73	Dreysaltigkeits: Blume	44
Dost, gemeiner	48		

E.

Eberraute	37	Engelsüß-Wurzel	78
Eberwurzel	70	Englisches Gewürz	88
Ehrenpreis	52	— Laxirsalz	85
Eibisch: Kraut	38	Enzian, rother	74
— Wurzel	67	Erdranch	42
Eicheln	36	Erdschierling	41
Eichen: Blätter	32	Eichen: Wurzel	72
— Rinde	22	Essig	3
— Schwamm	4	— Rosen	29
Eisen	25	Euphorbium	25
Eisenhütlein	38		

F.

Färberröthe	79	Fieberflee	51
Falkkraut	39	Fichten: Knospen	99
— — Blumen	26	Fingerhut, rother	42
— — Wurzel	68	Fischleim	53
Farnkraut: Wurzel	73	Flieder: Blumen	29
Feigen, getrocknete	13	Fliegen, Spanische	13
Fenchel: Holz	55	Flöh: Samen	93
— Samen	91	Florentinische Veilchenwurzel	76

G.

Galgant: Wurzel, kleine	74	Galmen: Stein	54
Gärsten, geschälter	91	Gauchheil, rother	39
— Graupe	91	Gegenharz	17
Galläpfel	35	Gelbwurzel	72

R

Gens

Genzian: Wurzel	74	Grind: Wurzel	76
Gewürz, Englisches	83	Grünspan	99
Gewürz: Nelken	13	Guajac: Harz	83
— — — Del	61	— Holz	54
Gichttrübe	69	— Rinde	21
Giftwurzel	72	Gummi, Arabisches	36
Gnadenkraut	43	— Gutt	37
Granatapfelschale	21	— Senegal	36
Granat: Blumen	26	— Tragacanth	36
Gras: Wurzel	74	Gundermann	43

H.

Hammeltalg	94	Hollunder: Beeren	248
Hanf: Samen	89	— Blumen	29
Harz, gemeines	83	Honig, gemeiner	57
Haselwurzel	68	— weißer	57
— — Blätter	31	Hopfen	96
Hausen: Blasen	53	— Spanischer	48
Hauslauch, großes	32	Huflattig	52
Hauswurzel: Kraut	32	Hühnerdarm, rother	39
Himbeeren, rothe	34	Hühner: Eyer, frische	65
Hirschhorn	17	Hülsen: Blätter	31
— geraspelt	17	Hutzucker	84
Holder: Blüthen	29		

J.

Jalappen: Wurzel	75	Jeländisches Moos	44
Jugber, deutscher	67	Jfop	44
— weißer	83	Judenpech	8
Johannis: Beeren, rothe	34	Jungfernhonig	57
— Kraut	43		

K.

Käse: Vappeln	45	Kellerwürmer	58
Kalkerde	12	Kiefer: Sprossen	99
Kamillen, gemeine	27	Kino: Gummi	53
— Römische	26	— Harz	53

Kirschen

Kirschen, saure	15	Krähenaugen	60
— schwarze	32	Kraftmehl	7
Kirschlorbeer = Blätter	32	Krapp	79
Klapperschlangen = Wurzel	81	Krause = Münze	47
Klapprosen, Klatschrosen	29	Krebs = Augen	54
Kletten = Wurzel	69	— Steine	54
Knoblauch	66	Kreide, weiße	24
Kochsalz	86	Kreuzblumenwurzel, bittere	77
Königskerze = Blumen	30	Kümmel	89
— — Kraut	52	— Römischer	90
Königsrinde	20	Kupfer	24

L.

Lachen = Knoblauch	80	Liebstöckel = Wurzel	76
Lärchen = Schwamm	3	Linden = Blumen	30
Läuse = Samen	93	Löffelkraut	41
Lakritzensaft	97	Löwenzahn = Kraut	51
Lavendelblumen	27	— — Wurzel	82
Laxirsalz, Englisches	85	Lorbeeren	9
Leber = Aloe	4	Lorbeer = Del; Loröl	62
Leinkraut	45	Lorbeerweiden = Rinde	23
— Samen	91		

M.

Märzviolen	30	Meerzwiebel	80
Majoran	45	Meliloten (Meloten-) Blu-	
Mandeln, bittere	6	men	28
— süße	7	— — Kraut	46
Manna, Calabrische	56	Melisse	46
Marcasit	11	Melonen = Körner	92
Mastix	57	Mennig	58
Maulbeeren, schwarze	33	Mexicanisches Traubenkraut	40
Mausohr = Blätter	31	Milch = Zucker	84
— — Wurzel	68	Mistel, weißer	100
Mayblumen	27	Mistelholz	100
Meerrettig	68	Möhren	72
Meerschwamm	95	Mohnsaft	64

Mohn : Samen, weißer	92	Muscatennuß : Del	62
Moos, Corsicanisches	37	Muscus	58
— Isländisches	44	Mutter : Harz	35
Muscaten : Blumen	56	— Kraut	46
— — — Del	62	— Kümmel	90
— — — Nüsse	60	Myrrhe	59

N.

Nachtschatten, tödlicher	69	Nelken = Pfeffer	88
Natter : Wurzel	80	— Wurzel	70
Nelken : Del	61	Niesewurzel, schwarze	74

O.

Ochsen-galle	25	Opoponax	64
Ochsenzungen-Wurzel, rothe	66	Orange : Blüthen	26
Delbaum = Harz	25	Osterlucy : Wurzel, runde	68
Oliven : Del	62		

P.

Panax : Gummi	64	Pocken : Wurzel	71
Pappelblumen, gemeine	28	Poley	48
Pappel : Kraut	45	Pomeranzen, unreife	65
— Rosen	27	— Blätter	31
Peru : Balsam	10	— Blumen	26
Petersilien : Samen	92	— Del	60
Pfeffer : Münze	47	— Schale	18
Pfeffer, weißer	65	Porsch	49
Pflaumen	34	Pottasche	16
Pimpinell-Wurzel, weiße	77		

Q.

Quassia : Holz	55	Quendel	50
— Rinde	22	Quitten : Körner	90
Quecksilber	5	— Samen	90
Quecken	74		

R.

R.

Rainfarn	51	Rohr : Storax	96
— — Blumen	30	Rosen, Damascener	29
Rasengift	7	— rothe	29
Raute	49	Rosmarin	49
Rhabarber = Wurzel	78	— wilder	49
Ricinus : Del	63	Roscastanienrinde	21
Römischer Kümmel	90	Rüster : Rinde	23
Rohr = Cassia	14	Ruhrwurzel	75

S.

Sadebaum	49	Schweinschmalz	8
Safran	24	Schwerspath	94
Sagapen-Gummi	84	Scordien : Kraut	50
Salap : Wurzel	79	Scorzonere, wilde	80
Salben	50	Scorzoner-Wurzel	80
Saleb = Wurzel	79	Sedlizer Salz	86
Salmiac	85	Seewermuth	38
Salpeter	59	Seidelbast	22
Sandbeeren : Blätter	33	Seife, Spanische	87
Sandriedgras : Wurzel	70	Seifenkraut	15
Sarsaparill : Wurzel	80	— — Wurzel	79
Sassafras : Holz	55	Seifen : Wurzel, rothe	79
— — Del	63	Senega : Wurzel	81
Sassaparille	80	Senf : Same, schwarzer	94
— Deutsche	70	Sennez : Blätter	33
Sauerklee : Salz	85	Sevenbaum	49
Scammonium von Aleppo	88	Silber, reines Capell	7
Schacarille	18	— Glätte	55
Schafgarben : Blumen	28	Simaruba-Rinde	23
— — Kraut	47	Socoterische Aloe	4
Schaftalg	94	Sode	94
Schierling, gefleckter	41	Sommergärsten	91
Schlangen-Wurzel, Virgin.	81	Spangrün	99
Schöllkraut, großes	41	Spanische Fliegen	13
— — Wurzel	71	— Seife	87
Schwefel	97	Spanischer Hopfen	48
— Säure, concentrirte	63	Speichel : Wurzel	78

Spiauter	100	Stein : Del	63
Spießglanz , Spießglas,		Stern : Anies	88
roher	7	Stiefmütterchen	44
Stabfrant	37	Stockrosen	27
Stärkmehl	7	Storax , flüssiger	96
Stangenlack	53	— in Körnern, Zähren	96
Stechpalmen : Blätter	31	Streupulver	92
Steinklee	46	Süßholz	76
— — Blumen , gelbe	28	Syrup , gemeiner	97

Z.

Zacamahac, gemeine	98	Zeyniam	51
— wahre	98	— wilber	50
— in Schalen	98	Zoback	47
Zamarinden	34	Zollfirschen : Blätter	39
Zausendgülden-Kraut	40	Zormentill : Wurzel	82
Zerpenthin , gemeiner	98	Zragacanth	36
— Benedischer	99	Zraubenkraut, Mexican.	40

U.

Ulmenrinde	23
------------	----

V.

Veilchen	30	Violen : Wurzel	76
— Wurzel, Florentinische	76	Vitriol : Säure, concentrirte	63
Venedischer Zerpenthin	99		

W.

Wachholder : Beeren	9	Waldrebe , aufrechte	42
— Holz	55	Wallnüsse , unreife	59
— Harz	87	Wallrath	95
Wachs , gelbes	15	Wasserfenchel : Samen	93
— weißes	15	Wegwart : Wurzel	71

Weis

Weibenschwamm	35	Wollkraut : Blumen	30
Weihrauch	64	Wolverleih : Blumen	26
Wein	99	— — Kraut	39
Weinraute	49	— — Wurzel	68
Welsche Nüsse, grüne	59	Wundersalz	86
Wermuth, gemeiner	38	Wurmfarn : Blumen	30
Winter : Gärsten	91	Wurm : Kraut	51
Wismuth	11	— Moos	37
Wohlgemuth	48	— Samen	90
Wollkraut	52	Wurzeln, gelbe	72

3.

Zaunrübe	69	Zinn	95
Zedoar : Wurzel	82	Zittwer, langer	82
Zehrwurzel	67	— Samen	90
Zimmet : Cassia	19	Zucker, weißer,	84
— Del	61	Zuckerant, weißer, gelber	84
— Rinde	20	Zunderschwamm	4
Zink	100	Zwetschen	34

E M E N D A N D A.

Pag. 9. ante Balsamum Copaivae addantur, casu
omissae:

Baccae Sambuci. Hollunder-Beeren.

Baccae maturae, globosae, nigrae, magnitudine
Pisi minoris, umbilicatae, calyce coronatae, unilocu-
lares, trispermae, succo scatentes obscure rubro, aut
violaceo, acidulo-dulci, nonnihil ingrato.

Oleum Corticum Aurantiorum,

sub *Simplicibus*, P. 60. descriptum, denuo sub *Prae-*
paratis, P. 163. errore receptum, sic ut

Oleum Nusticae,

P. 62. et 166., ignoscet lector benevolus.

Errores typographici potiores.

Pag.	3	Lin.	12	pro	hand	lege	haud.
—	8	—	7	—	efluens	l. effluens.	
—	13	—	14	—	carnosi	l. carnos.	
—	40	—	12	post	saporem	dele (,).	
—	41	—	23	pro	Cochlearia	lege Cochleariae.	
—	43	—	17 et 18	pro	Hyoscyami	l. Hyoscyami.	
—	46	—	5	pro	quodammodo	l. quodammodo.	
—	—	—	24	—	Melissa	l. Melissae.	
—	54	—	19	—	Zinci	l. Zinci.	
—	57	—	penult.	pro	diffiliens	l. diffiliens.	
—	59	—	10	pro	nondum	l. nondum.	
—	61	—	17	—	Cedroni	l. Cedroni.	
—	65	—	1	—	refina	l. refina.	
—	70	—	16	—	superficie	l. superficie.	
—	71	—	21	—	intus	l. intus.	
—	72	—	9	—	fibrosa	l. fibrosa.	
—	81	—	14	post	inferne	dele (,).	
—	94	—	11	pro	Pinguedo	lege Pinguedo	
—	98	—	14	—	gemeiner	l. gemeine.	

Pag.

Pag.	106	Lin.	12	post commissio adde Sal.
—	108	—	6	pro in lege in
—	—	—	20	post Tartari adde crySTALLISATAE.
—	109	—	3	pro ant lege aut.
—	118	—	3	— um l. tum.
—	147	post Lin.	16	inserirur
Eodem modo parentur				

Conchae praeparatae.


—	151	Lin.	1	post vegetabilis adde aërat.
—	152	—	17	— lenissimo adde usque ad odorem sulphuricum.
—	161	—	12	— Tartari adde crySTALLISATAE.
—	162	—	28	— nitricum adde depuratum.
—	179	—	antepen.	post igne adde (,)
—	181	—	13	post carbonicum adde depuratum.
—	183	—	19	— mineralis adde crySTALLISATI.
—	204	—	2	— ejus adde ab.
—	—	—	3	pro causticum lege caustico.
—	—	—	—	— turbet l. turbetur.
—	—	—	—	— tingat l. tingatur.
—	215	—	21	post digestivum adde:
(Unguentum Terebinthinae).				
—	—	—	22	— Terebinthinae adde laricinae.
—	217	—	10	et
—	218	—	13	et 20 post Porci adde lotae.
—	222	—	19	pro 13 lege 113.
—	—	—	—	— 108 l. 94.
—	—	—	—	— post minerale inseratur
— — crySTALLISATUM 177.				
—	224	—	4	pro Pag. penult. lege 248.
—	225	—	7	— Pag. ult. l. 249.
—	226	—	24	— 183 l. 133.
—	229	—	18	— 148 et 201 l. 147. 200.
—	230	—	ult.	— acido l. acida.
—	231	—	9	— 89 l. 59.
—	232	—	10	— 121 l. 213.
—	—	—	33	— 174 l. 175.
—	233	Col. 1. Lin.	9.	pro 68 69.
—	—	Col. 1. Lin.	27.	pro 78 l. 73.

- Pag. 233 Col. 1. Lin. 28. pro 73 l. 78.
 — — Col. 2. Lin. 4. — 77 l. 76.
 — 234 Lin. 1 pro 176 l. 83.
 — — — 9 — 74 l. 84.
 — — — 25 — 85 l. 86.
 — — — 34 — 89 l. 90.
 — 235 — 20 — Lavendulee l. Lavendulae.
 — 236 Col. 2 Lin. 21 et 28 pro 200 l. 210.
 — 237 Col. 2 Lin. 29 adde
 — — — Terebinthinae 215.
 — — Col. 2 Lin. 30 pro 219 lege 214
 — 240 Lin. 26 pro Clophonium lege Colophonium.





TYPIS GERARDI STALLING.


LIBRARY
OF THE
BIBLIOTHEQUE
NATIONALE
PARIS
1791




UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARIES




















Pharmacopoea Oldenburgica

Oldenburgum 1801

M.med. 826

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10288026-1